


# 黄色粘着トラップによるイチモンジセセリ (イネツトムシ)の誘殺消長 ＜令和4年(2022年)＞

- ・誘殺開始時期はほぼ平年並の7月第2半旬でした。
- ・第1世代成虫の発生最盛期は、平年よりやや早い7月第4半旬頃であったと推定されます。平年に比べてやや少ない誘殺頭数でした。
- ・第2世代成虫は、8月第5半旬頃から誘殺されたと推定されます。平年に比べて少ない誘殺頭数でした。

## 【千曲市における誘殺消長】



※トラップは令和4年7月1日から20cm四方の黄色粘着板を水田周囲に3箇所設置、その合計誘殺数を調査  
※平年は平成24年～令和3年の平均値

### 参考)

#### 1 イチモンジセセリ(イネツトムシ)の発生生態

- ・県内ではほとんど越冬できず、5月下旬以降、県外から越冬世代成虫が飛来します。
- ・第1世代成虫は7月から8月上旬にかけて発生します。晩植や直播など、生育の遅い場合は、第2世代幼虫により被害を受ける場合があります。

#### 2 防除方法

- ・防除適期は第1世代成虫の発生最盛期の7～10日後です。
- ・要防除水準は8月上旬に10株あたり幼虫3頭です。