


# スモモヒメシクイのフェロモントラップ誘殺消長（令和6年（2024年）調査）

長野県病害虫防除所


過去10年間の消長模式図（果樹試験場内 県予察ほ）



## 【発生生態と防除のポイント】

- ・年3～4回発生する。
- ・越冬世代成虫は4月下旬～5月上旬、第1世代成虫は6月下旬～7月上旬、第2世代成虫は7月下旬～8月上旬、第3世代成虫は9月上旬に発生する。
- ・日本すももは、第1世代、第2世代の卵及びふ化幼虫の防除を行う。  
防除適期はそれぞれ5月上旬～6月上旬、6月下旬～7月中旬であり、10～14日間隔で防除する。
- ・りんごは、第3世代の卵及びふ化幼虫を対象に、8月中旬頃から5～7日間隔で防除する。

## ○県予察ほ（須坂市 長野県果樹試験場内）




### 【調査地点】（標高約350m）

- ・須坂市 長野県果樹試験場（りんごほ場）
- ・平年は2014年～2023年の平均値

### 【コメント】

- ・誘殺頭数は、4月第6半月～5月第2半月は平年と比べ多く、5月第3半月～7月第6半月は平年並であった。8月第1半月～10月第1半月は平年と比べやや多かった。

## ○須坂市（病害虫防除所調査）




### 【調査地点】（標高約370m）

- ・須坂市（日本すももほ場）
- ・平年は2014年～2023年の平均値

### 【コメント】

- ・誘殺頭数は、4月～10月まで平年並であった。

## ○佐久市（※佐久農業農村支援センター調査協力）




### 【調査地点】（標高約730m）

- ・佐久市（プルーンほ場）
- ・平年は2014年～2023年の平均値

### 【コメント】

- ・誘殺頭数は平年並であった。

## ○中野市（※北信農業農村支援センター調査協力）



### 【調査地点】（標高約350m）

- ・中野市（日本すももほ場）
- ・2024年からほ場を変更したため、平年値はない。