

令和8年 アブラムシ類有翅虫飛来消長


農業試験場、野菜花き試験場で実施した黄色粘着トラップによる誘殺消長調査の結果です。


【コメント】

・塩尻市宗賀では、４月第３半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、７月第３半旬まで平年よりも多い誘殺数で推移し、６月第６半旬には大きなピークがみられた。
・塩尻市洗馬では、４月第２半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、以降は増減しつつ平年よりも多い誘殺数で推移し、６月第６半旬には大ピークがみられた。８月以降は、平年並みから少ない誘殺数で推移した。
・小諸市では、４月第２半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、以降は概ね平年並みの誘殺数で推移した。
・上田市では、５月第２半旬から誘殺され、平年よりも発生は遅く、６月第６半旬を除き、平年並みから少ない誘殺数で推移した。また、10月第２半旬から第４半旬にかけて誘殺数が増加した。
・富士見町では、５月第１半旬から誘殺され、以後は前年よりも少ない誘殺数で推移した。６月第４半旬で増加後は減少し、10月第４半旬で再び増加した（平年値無し）。
・長野市上ケ屋では、４月第４半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、６月第１半旬から７月第１半旬は平年よりも多い誘殺数で推移した。その後は、ほぼ平年並みに推移した後、８月第４半旬から平年よりも多くなり、９月第３半旬に小ピークがみられた。
・長野市松代では、４月第２半旬から誘殺され、発生時期は平年並み、誘殺数は６月以降は概ね平年並みであったが、８月第４半旬から９月第２半旬にかけては平年よりも多かった。











富士見町立沢(alt.1,160m)地区発生予察ほ（きく）




＊令和7年から調査　　*農業試験場病害虫防除部　調査

長野市上ケ屋（alt.1,070m）地区発生予察ほ（キャベツ）



＊平年値は過去9ヵ年平均値　　*農業試験場病害虫防除部　調査

長野市松代（alt.350m）防除適期決定ほ（きゅうり）



＊平年値は過去4ヵ年平均値　　*農業試験場病害虫防除部　調査