
令和８年フェロモントラップによるコナガ誘殺消長

農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによる誘殺消長調査の結果です。
（農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。）


【コメント】
・塩尻市では、４月第３半旬から誘殺がみられ、誘殺数は平年よりも少なく推移した。
・小諸市では、３月第２半旬から誘殺がみられ、平年よりも早かった。４月の誘殺数は平年よりも多かったが、５月以降は平年並み～少なく推移した。
・上田市では、４月第２半旬から誘殺がみられ、平年よりも早かった。７月第２半旬～８月第１半旬は平年よりも誘殺数が多かったが、８月第２半旬から９月第２半旬にかけては平年並み、以降は平年よりも少なく推移した。
・原村では、発生時期は平年よりも早かったと推察され、誘殺数は平年並みであったが、７月第２半旬以降は８月第５半旬を除き、少ない誘殺数で推移した。
・朝日村では、４月第４半旬の誘殺数が平年よりも多く、発生は早かった。５月以降は概ね平年並み～少ない誘殺数で推移した。
・大町市では、平年よりも少ない誘殺数で推移した。
・長野市では、４月第２半旬から誘殺がみられ、平年よりもやや早かった。５月以降は平年よりも少ない誘殺数で推移した。

塩尻市宗賀　野菜花き試験場（alt.750m）県発生予察ほ（キャベツ・はくさい）




*平年値は過去10ヶ年平均　　＊野菜花き試験場 調査

小諸市山浦　野菜花き試験場佐久支場（alt.812m）県発生予察ほ（キャベツ・はくさい）




*平年値は過去10ヵ年平均　　＊野菜花き試験場佐久支場 調査

上田市菅平高原（alt.1,260m）地区発生予察ほ（はくさい）





*平年値は過去10ヶ年平均　　＊農業試験場病害虫防除部 調査


原村判之木（alt.958m）防除適期決定ほ（ブロッコリー）



*平年値は過去10ヶ年平均　　＊農業試験場病害虫防除部 調査


朝日村古見（alt.776m）地区発生予察ほ（はくさい）
平年*
前年
本年
誘殺数（頭）
100
80
60
40
20
0
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
*平年値は過去7カ年平均
＊農業試験場病害虫防除部 調査


大町市八坂（alt.800m）
前年
本年
平年*
誘殺数（頭）
100
80
60
40
20
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
*平年値は過去4ケ年平均
＊北アルプス農業農村支援センター 調査


長野市上ヶ屋（alt.1,070m）地区発生予察ほ（キャベツ）
平年*
前年
本年
誘殺数（頭）
160
120
80
40
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
*平年値は過去10ケ年平均
＊農業試験場病害虫防除部 調査