
令和8年フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長（2）中南信

農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長調査の結果です。
（農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。）


【コメント】
・塩尻市では、平年よりも発生は早く、７月第１半旬の誘殺ピーク以降は平年よりも少ない誘殺数で推移したが、８月第１半旬で急増した。その後、増減しながらも９月第６半旬までは多かったが、以降は減少した。
・松川村では、６月第１半旬と７月第１半旬と第５半旬に誘殺ピークがみられ、８月第６半旬まで平年よりも多い誘殺数で推移した。その後、減少したが９月第４半旬から増加し、９月第６半旬にピークがみられ、10月は少なくなった。
・富士見町では、平年よりも発生は早く、６月第６半旬からの誘殺数は平年よりも少なかったが、７月第６半旬から急増し、８月第２半旬と８月第６半旬に誘殺ピークがみられた。以降は、平年よりも少なく推移したが、10月第４半旬は多くなった。
・茅野市では、平年よりも発生はやや早く、誘殺数は７月第３半旬から急増して平年よりも多くなったが、８月第１半旬以降は減少し、平年よりも少なくなった。
・伊那市では、５月第６半旬、７月第４半旬に誘殺ピークがあり、誘殺数は８月第１半旬以降、平年よりも少なく推移した。
・駒ケ根市では、６月第２半旬に誘殺ピークがあり、以降は平年並～やや少ない誘殺数で推移した。
・阿南町では、６月第４半旬から誘殺数が急増して第６半旬で誘殺ピークとなり、その後は減少して、８月以降は平年よりも少なく推移した。

塩尻市宗賀　野菜花き試験場内(alt.750m)




*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊野菜花き試験場調査

松川村




*平年値は過去6ヵ年平均値　　＊北アルプス農業農村支援センター調査

富士見町立沢（alt.1,160m）




*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊諏訪農業農村支援センター調査

茅野市豊平（alt.1,050m）



*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊諏訪農業農村支援センター調査


伊那市西箕輪（alt.826m）



*平年値は過去10ヵ年平均値

＊上伊那農業農村支援センター調査


駒ケ根市赤穂（alt.644m）



*平年値は過去10ヵ年平均値

＊上伊那農業農村支援センター調査

阿南町新野（alt.830m）



＊平年値は過去10か年平均値

＊南信州農業農村支援センター調査