






令和8年フェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長

農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長調査の結果です。
(農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)

◎ヨトウガ 【コメント】





- ・塩尻市では、5月第1半旬から誘殺がみられ、5月の誘殺数は平年よりもやや多かったが、6月以降は概ね平年並みに推移している。
- ・須坂市では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は概ね平年並み、誘殺数は5月第3半旬以降、平年よりもやや少なく推移している。
- ・茅野市では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は6月第2半旬まで平年よりもやや多く推移したが、以降は概ね平年並みとなっている。
- ・原村では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は5月第6半旬まで平年よりも少なく推移したが、以降は概ね平年並みとなっている。
- ・南箕輪村では、5月第1半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早いと推定され、誘殺数は平年よりも少なく推移したが、7月第5半旬で急増している。



◎ハスモンヨトウ

【コメント】

- ・塩尻市では、5月第4半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、以降、誘殺数は平年よりも概ね多く推移、7月第4半旬から急増している。
- ・須坂市では、5月第5半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、6月第1半旬の誘殺数が多かったが、以降は概ね平年並みで推移している。
- ・上田市では、5月第6半旬に誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、以降は概ね平年並みで推移している。
- ・南箕輪村では、5月第3半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は6月第5、6半旬が多かった以外は、概ね平年並みで推移している。



◎シロイチモジヨトウ

【コメント】

- ・塩尻市では、5月第5半旬に初誘殺がみられ、以降の誘殺数は概ね平年並みで推移したが、7月第6半旬で多くなっている。
- ・長野市では、7月第3半旬に初誘殺がみられ、誘殺数は平年並み。

