

3. だいず

・殺菌剤（参考農薬）

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	アミスター20フロアブル	無人航空機による散布	収穫7日前まで	2回以内	
1	トップジンMゾル	無人航空機による散布	収穫14日前まで	4回以内	

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
3	トレボンスカイMC	無人ヘリコプターによる散布	収穫14日前まで	2回以内	

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

対象病害虫	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
紫 斑 病	開 花 終 期 粒肥大初期 (米粒大)	[参考農薬] 1. トップジンMゾルの5倍液、 又はアミスター20フロアブルの16~24倍液を10a当り 800ml 散布する。	1. 地上防除の項を参照する。 2. アミスターは浸透性を高める展着剤の添加により薬害を生ずる場合があるので、添加しない。また、りんごの一部品種及び幼苗期の非結球レタスに対して薬害を生ずる恐れがあるので注意する。
マメシクイガ	幼 莢 期 ~ 子 実肥大中期	[参考農薬] 1. トレボンスカイMCの16倍液を10a当り1.6ℓ 散布する。	1. 蚕毒及び魚毒に特に注意する(特別指導事項参照)。

注) 乳剤類の散布は自動車の塗装を汚染することがあるので注意する。