

4. 野菜類

(1) トマト (ミニトマトは含まない)

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
センコル水和剤	畦間・株間散布	定植活着後～定植14日後まで(雑草発生前～2、3葉期)	1回(メトフゾリン1回)	トマト(露地栽培)
トレファノサイド粒剤2.5	全面土壌散布	定植前(植穴掘前)	1回(トリフルアリン1回)	トマト(露地栽培)
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布 畦間土壌散布	定植前(植穴掘前) 定植直後		
タッチダウン i Q	雑草茎葉散布	畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫前日まで	3回以内(グリホサート3回以内)	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
露地定植前(植穴掘前) 全面土壌散布	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルアリン 44.5%) 200～300ml	1. 水100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	
		トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルアリン 2.5%) 4～5kg	1. 散粒機で散布するか又は土で増量し均一に散布する。	
露地定植直後 畦間土壌散布	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルアリン 44.5%) 200～300ml	1. 水100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	
露地定植活着後～定植14日後まで (雑草発生前～2、3葉期) 畦間株間散布	一年生雑草	センコル水和剤 (メトフゾリン 50%) 60～100g	1. 水100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. 薬剤がトマトの茎葉及び他作物にかからないよう散布し、使用后散布機具をよく洗う。 2. 土壌が極端に乾燥している場合には効果が劣る。また散布後に多雨が予想される場合には使用を避ける。 3. 有機質含量の低い土壌や砂質土壌では使用を避ける。
生育期 畦間雑草茎葉散布 (雑草草丈30cm以下)	一年生雑草	タッチダウン i Q (グリホサート・カリウム塩 44.7%) 250～500ml	1. 水25～100ℓに溶かして散布する。少量散布の際には、専用ノズルを使用する。	1. 作物にかからないように散布する。

(2) ミニトマト

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド乳剤	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	定植前(植穴掘前)	200~300mℓ/10a	1回(トリフルリン1回)	B-s	ミニトマト(露地栽培)
		畦間土壌散布	定植直後				
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	300~500mℓ/10a	3回以内(ケルホシネット及びグルホシネットP3回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(3) なす

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前)	200~400mℓ/10a	1回(ブタミホス1回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(4) きゅうり

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマートU粒剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植前(雑草発生前)	4~6kg/10a	1回(ブタミホス1回)	B	
トレファノサイド乳剤	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	200~250mℓ/10a	1回(トリフルリン1回)	B-s	きゅうり(露地栽培)(直播栽培)
			定植前(植穴掘前)				きゅうり(露地栽培)(移植栽培)
		畦間土壌散布	定植直後				
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	300~500mℓ/10a	3回以内(ケルホシネット及びグルホシネットP3回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(5) すいか

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
クレマート乳剤	全面土壌散布	定植・マルチ前（雑草発生前）	1回（ブタホス1回）	
プリグロックスL	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生育期（但し、収穫3日前まで）	3回以内（ジクワット3回以内、パラコート3回以内）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植・マルチ（雑草発生前） 全面土壌散布	一年生雑草	クレマート乳剤 （ブタホス 50%） 300～400ml	1. 水 100～150ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. キク科雑草及びツユクサに効果が劣るので、これら雑草の優占ほ場では使用しない。
畦間処理 雑草生育期 雑草茎葉散布	一年生雑草	プリグロックスL （ジクワット7%、パラコート5%） 600～1,000ml	1. 水 100～150ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫前日まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500ml /10a	2回以内（ケルホシネート及びケルホシネートP2回以内）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(6) メロン

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植・マルチ前（雑草発生前）	200～400ml /10a	1回（ブタホス1回）	B	
トレファノサイド乳剤	一年生雑草（ツユクサ科、ヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	全面土壌散布 畦間土壌散布	定植前（植穴掘前）（マルチ前） 収穫45日前までの生育期（トンネル除去前）	150～200ml /10a 200～300ml /10a	2回以内（トリフルラン2回以内）	B-s	メロン（露地栽培）（トンネル・マルチ栽培）
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫30日前まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500ml /10a	2回以内（ケルホシネート及びケルホシネートP2回以内）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(7) かぼちゃ

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド 粒剤 2.5	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	定植前(植穴掘前)(マル前)	2kg/10a	2回以内(トリフルリン2回以内)	B-s	かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)
		畦間土壌散布	収穫45日前までの生育期(トンネル除去前)	4~5kg/10a			

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(8) ズッキーニ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
トレファノサイド乳剤	畦間土壌散布	定植直後	1回(トリフルリン1回)	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植直後 雑草発生前 畦間土壌散布	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤(トリフルリン 44.5%) 300ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	

(9) いちご

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布又は株間土壌散布	植付後又は定植後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	150~200ml/10a	2回以内(アラキロール2回以内)	B	いちご(本圃)いちご(親株床)
ワンサイドP乳剤	一年生イネ科雑草(スズメカサネを除く)	雑草茎葉散布	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫後~定植まで)	50~100ml/10a	1回(フルジホップ P1 回)	B	いちご(親株床)

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(10) さやいんげん

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド 乳剤	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	200～300ml /10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	さやいんげん(露地栽培)
			は種前(マルチ前)				さやいんげん(露地・マルチ栽培)
トレファノサイド 粒剤2.5	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種前(マルチ前)	4～6kg/10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	さやいんげん(露地・マルチ栽培)
			は種直後				さやいんげん(露地栽培)

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(11) さやえんどう

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド 乳剤	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	300ml /10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	さやえんどう(露地栽培)
バサグラン液剤 (ナトリウム塩)	一年生雑草(イネ科を除く)	雑草茎葉散布又は全面散布	3～6葉期 (但し、収穫40日前まで)	100～200ml /10a	1回(ペンタリン 1回)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(12) えだまめ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
クリアターン細粒剤F	全面土壌散布	は種直後（雑草発生前）	1回（ベンチカーブ [®] 1回、ペンテ [®] イメタリン 1回、リニuron 2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内））	
クリアターン乳剤	全面土壌散布	は種直後（雑草発生前）	1回（ベンチカーブ [®] 1回、ペンテ [®] イメタリン 1回、リニuron 2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内））	
セレクト乳剤	雑草茎葉散布 又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで）	1回（クルジム 1回）	
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	は種後出芽前	1回（トリフルリン 2回以内（但し、全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内））	
バスタ液剤	雑草茎葉散布	収穫14日前まで（畦間処理：雑草生育期）	3回以内（ケルボネット及びケルボネットP3 回以内）	
ポルトフロアブル	雑草茎葉散布 又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～8葉期）（但し、収穫14日前まで）	1回（キプロホップ [®] エチル 1回）	
ラクサー乳剤	全面土壌散布	は種後出芽前（雑草発生前）	1回（アラクロール 1回、リニuron 2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内））	
ラクサー粒剤	全面土壌散布	は種後出芽前（雑草発生前）	1回（アラクロール 1回、リニuron 2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内））	
ロロックス	全面土壌散布	は種直後～出芽前（雑草発生前～発生始期）	1回（リニuron 2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内））	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
は種直後 雑草発生前 全面土壌散布	一年生雑草	クリアターン細粒剤F (ベンチカーブ [®] 8%、 ペンテ [®] イメタリン 0.8%、 リニuron 1.2%) 4～5 kg	1. 散粒機又は土で増量し、均一に散布する。	
		クリアターン乳剤 (ベンチカーブ [®] 50%、 ペンテ [®] イメタリン 5%、 リニuron 7.5%) 500～800ml	1. 水 100l に溶かし噴霧機で均一に散布する。	
は種後発芽前 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ科、 カヤツリグサ科、キク科、 アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200～300ml	1. 水 100l に溶かし噴霧機で均一に散布する。	

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
は種後出芽前 雑草発生前 全面土壌散布	一年生雑草	ラクサー乳剤 (アラクロール 30%、 リニユロン 12%) 400～600ml	1. 水 100ℓ に溶かし 噴霧機で均一に 散布する。	1. 砂質土の保水力の小 さいほ場では使用し ない。
		ラクサー粒剤 (アラクロール 4%、 リニユロン 1.04%) 4～6 kg	1. 散粒機又は土で 増量し、均一に 散布する。	1. 砂質土の保水力の小 さいほ場では使用し ない。
は種直後～出芽前 雑草発生前～発 生始期 全面土壌散布	一年生雑草	ロロックス (リニユロン 50%) 100～200g	1. 水 70～150ℓ に溶 かし噴霧機で均 一に散布する。	
雑草生育期 イネ科雑草 3～ 5 葉期 収穫 14 日前ま で 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑 草 (スズメノカ タビラを除く)	セレクト乳剤 (クトゾム 24%) 35～50ml	1. 水 100ℓ に溶かし 噴霧機で均一に 散布する。	1. 雑草が大きくなりす ぎると効果が劣るの で、時機を逸しない よう散布する。 2. やや遅効性で、イネ 科雑草を完全に枯殺 するまでに通常 1 週 間から 2 週間前後を 要する。
雑草生育期 イネ科雑草 3～ 5 葉期 収穫 14 日前ま で 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑 草 (スズメノカ タビラを除く)	ポルトフロアブル (キザロップ エチル 7%) 200～300ml	1. 水 100ℓ に溶かし 噴霧機で均一に 散布する。	1. イネ科雑草を完全に 枯殺するまでに約 1 週間を要する。
雑草生育期 収穫 14 日前ま で 畦間雑草茎葉散 布	一年生雑草	バスタ液剤 (ゲルホソネット 18.5%) 300～500ml	1. 水 100～150ℓ に 溶かし噴霧機で 均一に散布す る。	1. 散布後 6 時間以内の 降雨は効果を減ず ることがあるので、天 候を良く見極めてか ら散布する。

(13) オクラ

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散 布	収穫前日ま で (雑草生 育期は種前 又は畦間処 理)	300～500ml /10a	3 回以内 (ゲル ホソネット及びゲ ルホソネット P3 回 以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(14) みょうが

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド粒剤 2.5	一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キコ科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	萌芽前 (雑草発生前)	6kg/10a	1回(トリフルリン1回)	B-s	みょうが (花穂)
ブリグロックスL	一年生雑草	雑草茎葉散布	萌芽前	600~1000ml/10a	2回以内 (ジクワット2回以内、パファート2回以内)	A	みょうが (花穂)
			畦間処理：雑草生育期 (但し、収穫30日前まで) 畦間処理：雑草生育期 (但し、みょうが (花穂) の収穫30日前まで、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで)				みょうが (茎葉)

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(15) キャベツ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
アグロマックス水和剤	全面土壌散布	定植直後雑草発生前	1回(プロピザミド1回)	
クレマート乳剤	全面土壌散布	定植前 (雑草発生前)	1回(ブタミホ1回)	
トレファノサイド粒剤 2.5	全面土壌散布	定植前 (植穴掘前)	1回(トリフルリン1回)	キャベツ (移植栽培)
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布 畦間土壌散布	定植前 (植穴掘前) 定植直後		
フィールドスターP乳剤	全面土壌散布	定植後 (雑草発生前) (但し、定植後10日まで)	1回(ジメナミド及びジメナミドP1回)	
ラウンドアップマックスロード	雑草茎葉散布	耕起前又は定植5日前まで (雑草生育期)	1回(グリホサート1回)	
ラッソー乳剤	全面土壌散布	定植8日後まで	1回(アラコール1回)	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
耕起前または定植5日前まで (雑草生育期) 雑草茎葉散布	一年生雑草	ラウンドアップマックスロード (グリホサート・カリウム塩 48%) 500ml	1. 通常散布では水50~100lに、少量散布 (専用ノズル使用) では水25~50lに溶かして、噴霧機で均一に散布する。	1. 飛散防止カバーを使用し、作物体にかからないように散布する。 2. 「東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ラウンドアップマックスロード」は長野県では使えない。
定植前 (雑草発生前) 全面土壌散布	一年生雑草	クレマート乳剤 (ブタミホ 50%) 200~400ml	1. 水100~150lに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. キク科雑草に対しては、やや効果が劣る。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植前（植穴掘前） 全面土壌散布	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド粒剤 2.5 (トリフルリン 2.5%) 4 kg	1. 散粒機又は土で増量し、均一に散布する。	
	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 250ml	1. 水 100ℓ に溶かし、噴霧機で均一に散布する。	
定植直後 畦間土壌散布	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 250ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	
定植 8 日後まで 全面土壌散布	一年生雑草	ラッソー乳剤 (アラクロール 43%) 150～200ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	1. 他作物への薬剤飛散に注意する。 2. タデ科、アカザ科雑草にやや効果が劣る。
定植後（雑草発生前） （定植後 10 日まで） 全面土壌散布	畑地一年生雑草（アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く）	フィールドスター P 乳剤 (ジメナミト P 64%) 50～75ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	1. レタスに飛散すると葉害が生じるので、かからないように注意する。
定植直後 雑草発生前 全面土壌散布	一年生雑草（キク科、カヤツリグサ科を除く）	アグロマックス水和剤 (プロピザミト 50%) 300 g	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	

(16) カリフラワー

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ゴーゴーサン乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植前（雑草発生前）	200～400ml /10a	1回（ハネデタイム列1回）	B	
ブリグロックSL	一年生雑草	雑草茎葉散布	畦間処理： 雑草生育期 （但し、収穫 30 日前まで）	600～1000 ml /10a	3 回以内（ジクワット 3 回以内、ハラコート 3 回以内）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(17) ブロccoli

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
アグロマックス水和剤	全面土壌散布	定植後雑草発生前（但し、定植14日後まで）	1回（プロピザミド 1回）	
トレファノサイド粒剤 2.5	全面土壌散布	定植前（植穴掘前）	1回（トリフルリン 1回）	ブロッコリー（移植栽培）
フィールドスターP乳剤	全面土壌散布	定植後（雑草発生前）但し収穫30日前まで	1回（ジメナミド及びジメナミド P1 回）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植前（植穴掘前） 全面土壌散布	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド粒剤 2.5 （トリフルリン 2.5%） 4～6 kg	1. 散粒機又は土で増量し、均一に散布する。	
定植後雑草発生前（定植後14日まで） 全面土壌散布	一年生雑草（キク科、カヤツリグサ科を除く）	アグロマックス水和剤 （プロピザミド 50%） 200～300g	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	
定植後（雑草発生前）但し収穫30日前まで 全面土壌散布	一年生雑草（アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く）	フィールドスターP乳剤 （ジメナミド P 64%） 50～75mℓ	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植前（雑草発生前）	200mℓ /10a	1回（フタホス 1回）	B	
ブリグロックSL	一年生雑草	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生育期（但し、収穫3日前まで）	600～1000 mℓ /10a	3回以内（シクワット 3回以内、パレット 3回以内）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(18) はくさい

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
トレファノサイド粒剤 2.5	全面土壌散布	は種直後	1回(トリフルリン1回)	はくさい(直播栽培)
		定植前(植穴掘前)		はくさい(移植栽培)
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	は種直後		はくさい(直播栽培)
		定植前(植穴掘前)		はくさい(移植栽培)
	畦間土壌散布	定植直後		

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
直まきは種直後 全面土壌散布	一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200~250ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に全面散布する。	1. ポリマルチ直まき栽培では、トレファノサイド乳剤の薬害がでやすいので使用しない。
		トレファノサイド粒剤 2.5 (トリフルリン 2.5%) 3~4kg	1. 散粒機又は土で増量し均一に散布する。	
定植前(植穴掘前) 全面土壌散布	一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200~250ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に全面散布する。	1. 粒剤は、苗床や直まきのマルチ栽培では薬害がでやすいので使用しない。
		トレファノサイド粒剤 2.5 (トリフルリン 2.5%) 4kg	1. 散粒機又は土で増量し均一に散布する。	
定植直後 畦間土壌散布	一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200~250ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫 45 日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	300~500ml /10a	2 回以内(ケルホソネット及びケルホソネット P2 回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(19) ほうれんそう

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
アージラン液剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後～子葉展開期	秋播き 600～800ml/10a 春～初夏播き 800～1000 ml /10a 但し、芽出し播きは 800ml/10a	1回(アシュラム 1回)	A	
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後	150ml /10a	1回(アークロール 1回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(20) レタス (玉レタス)

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
アグロマックス水和剤	全面土壌散布	定植後雑草発生前 (但し、定植 14 日後まで) 定植前	1回(プロピザミド 1回)	レタス(春播栽培)
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布 畦間土壌散布	定植前 (植穴掘前) 定植直後	1回(トリフルリン 1回)	レタス(露地栽培)

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び 10 a 当り使用量	使用法	注意事項
定植前(植穴掘前) 全面土壌散布 定植直後 畦間土壌表面散布	一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200～250ml	1. 水 100ℓ に溶かし、噴霧機で散布する。	1. 使用上の注意事項は、はくさいに準ずる。 2. 葉にかからないように散布する。
定植前 全面土壌散布 定植後雑草発生前 (定植 14 日後まで) 全面土壌散布	一年生雑草 (キク科、カヤツリグサ科を除く)	アグロマックス水和剤 (プロピザミド 50%) 200～300 g	1. 水 70～100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	1. 乾燥ぎみの天候や雑草発生前後処理では効果が劣る。 2. 高温時の処理は効果の持続期間が短い。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫 30 日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	300～500ml /10a	2 回以内(ケルホネット及びケルホネット P2 回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(21) 非結球レタス（リーフレタス、ロメインレタス）

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド乳剤	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブナ科を除く）	全面土壌散布	定植前（植穴掘前）	200～300mℓ /10a	1回（トリフルリン1回）	B-s	非結球レタス（露地栽培）
	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツクガサ科、キク科、アブナ科を除く）	畦間土壌散布	定植直後				
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫30日前まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500mℓ /10a	2回以内（ケルホソネット及びびケルホソネットP2回以内）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(22) セルリー

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
ナブ乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期（但し、収穫28日前まで）	2回以内（セトキシム2回以内）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
雑草生育期 雑草茎葉散布又は全面散布	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	ナブ乳剤（セトキシム20%） 150～200mℓ	1. 水100～150ℓに溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	1. 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布する。 2. 広葉雑草には効果がないのでイネ科雑草優占ほ場で使用する。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ロロックス	一年生雑草	畦間土壌散布	定植後（但し、定植7日後まで） （雑草発生前）	100～ 150g/10a	1回（リニuron1回）	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(23) パセリ

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後発芽前（雑草発生前）	200～400mℓ /10a	1回（フタホス1回）	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(24) アスパラガス

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
グラメックス水和剤	全面土壌散布	萌芽前又は収穫後（雑草発生前）	1回（シアジン1回）	
ゴーゴーサン細粒剤F	全面土壌散布	萌芽前（雑草発生前）	1回（ペンテメタリン1回）	
ゴーゴーサン乳剤	全面土壌散布	萌芽前（雑草発生前）	1回（ペンテメタリン1回）	
ザクサ液剤	雑草茎葉散布	収穫打ち切り後（雑草生育期）	2回以内（ケルソネット及びケルソネットP2回以内）	
センコル水和剤	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	萌芽前～萌芽始期	1回（トリブジン1回）	
		収穫打ち切り後（雑草発生前～4、5葉期）		
タッチダウンiQ	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生育期（但し、収穫前日まで）	3回以内（グリホサート3回以内）	
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	萌芽前又は収穫打切後（雑草発生前）	1回（トリフルリン1回）	
ナブ乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫前日まで）	1回（セトキシム1回）	
バスタ液剤	雑草茎葉散布	収穫前日まで（雑草生育期萌芽前又は畦間処理）	2回以内（ケルソネット及びケルソネットP2回以内）	
ブリグロックスL	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生育期（但し、収穫前日まで）	3回以内（ジクワット3回以内、パラコート3回以内）	
	雑草茎葉散布	萌芽前：雑草生育期（草丈20cm以下）		
ロロックス	全面土壌散布	萌芽前（雑草発生前～発生始期）	1回（リニロン2回以内（但し全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）	
ワンサイドP乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫前日まで）	2回以内（フルジホップ及びフルジホップP2回以内）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
萌芽前（雑草発生前） 全面土壌散布	一年生雑草	ゴーゴーサン細粒剤F （ペンテメタリン 2%） 4～6 kg	1. 散粒機を用いるなどして均一に散布する。	1. 有機質含量の低い土壌や砂質土壌では使用を避ける。 2. 土壌が極端に乾燥している場合には効果が劣る。また、散布後に多雨が予想される場合は使用を避ける。 3. 1～2年生株や高畦栽培など根群の浅い場合は薬害の恐れがあるので注意する。 4. マルチ、トンネル栽培では使用しない。ハウス栽培の高温期には使用を避ける。
萌芽前（雑草発生前～発生始期） 全面土壌散布	一年生雑草	ロロックス （リニロン 50%） 150～200 g	1. 水 100ℓ に溶かして噴霧機で均一に散布する。	
萌芽前（雑草発生前） 全面土壌散布		ゴーゴーサン乳剤 （ペンテメタリン 30%） 200～400ml		
萌芽前（雑草生育期） 雑草茎葉散布	一年生雑草	ブリグロックスL （ジクワット7%、パラコート5%） 600～1,000ml	1. 水 100～150ℓ に溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	5. ゴーゴーサン細粒剤Fおよびゴーゴーサン乳剤は、キク科雑草とツユクサに効果が劣るので、これら雑草の優先は場では使用を控える。 6. ロロックスは雑草発生始期まで効果がある。
		バスタ液剤 （ケルソネット 18.5%） 300～500ml		

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
萌芽前、収穫打ち切り後 (雑草発生前) 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 200～300ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	7. センコル水和剤は雑草 4～5 葉期まで、グラメックス水和剤は 2～3 葉期まで効果がある。 8. センコル水和剤とグラメックス水和剤は、付近の作物にかからないように散布する。
萌芽前～萌芽始期又は収穫打切後 (雑草発生前～4、5 葉期) 雑草茎葉散布又は全面土壌散布	一年生雑草	センコル水和剤 (メトリアジン 50%) 100～150g	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	9. 萌芽前と収穫打ち切り後 2 回処理する場合は、除草剤の種類をかえて使用する。
萌芽前又は収穫後 (雑草発生前) 全面土壌散布	一年生雑草	グラメックス水和剤 (シアナジン 50%) 100～200g	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で均一に散布する。	
雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	ナブ乳剤 (セトキシム 20%) 150～200ml	1. 水 100ℓ に溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	1. 広葉雑草には効果がないのでイネ科雑草優占ほ場で使用する。また広葉雑草が混在する場合は他の土壌処理剤との体系で使用する。 2. 展着剤を加用すると効果が高まる。 3. イネ科作物には薬害があるので飛散しないように注意する。
雑草生育期 畦間雑草茎葉散布	一年生雑草	バスタ液剤 (ガルホシネット 18.5%) 300～500ml	1. 水 100～150ℓ に溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	1. 萌芽直前の処理は薬害の恐れがあるので、早めに散布する。 2. 生育期処理では、アスパラガスの茎葉にかからないように注意する。 3. 散布後 6 時間以内に降雨があると効果が減ずるため、天候をよく見て散布する。
畦間処理 雑草生育期 雑草茎葉散布	一年生雑草	プリグロックス L (ジクワット 7%、パラコート 5%) 600～1,000ml	1. 水 100～150ℓ に溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	
畦間処理 雑草生育期 雑草茎葉散布	スギナ	タッチダウン i Q (グリホサート・カリウム塩 44.7%) 1,500～2,000ml	1. 水 25～50ℓ に溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. アスパラガス及び周囲の作物に飛散しないように注意する。 2. 少量散布用ノズルを使用する。 3. スギナ展葉前及び生育盛期以降、他雑草に埋没している時期の散布は効果が劣る。 4. 効果の最大時期は、散布後 2～3 週間である。 5. 「東日本大震災により津波被害を受けた農地専用タッチダウン iQ」は長野県では使えない。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	ワンサイドP乳剤(フルアジホップP 17.5%) 50～100ml	1. 70～100ℓに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. イネ科作物に飛散しないように注意する。
収穫打ち切り後 雑草生育期 雑草茎葉散布	一年生雑草及び多年生広葉雑草	ザクサ液剤(ケルボネートPナトリウム塩 11.5%) 500ml	1. 水 100～150ℓに溶かし噴霧機で雑草の茎葉全体に均一に散布する。	1. 収穫打ち切り後にうね上へ散布する場合、萌芽している若茎に薬剤が付着すると若茎全体が褐変、伸長停止、曲がりなどの薬害を生じるおそれがあるので、散布後新たに萌芽した若茎を用いて立茎する。

(25) うど

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植後出芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	200ml/10a	1回(アタミホス1回)	B	
ブリグロックスL	一年生雑草	雑草茎葉散布	畦間処理: 雑草生育期(根株養成期)(但し、収穫75日前まで)	600～1000ml/10a	2回以内(ジクワット2回以内、パラコート2回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(26) たまねぎ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
アクチノールB乳剤	雑草茎葉散布	秋播栽培の早春期(雑草生育初期)(但し、収穫30日前まで)	2回以内(アイクシール2回以内)	たまねぎ(秋播移植栽培)
アグロマックス水和剤	全面土壌散布	定植後雑草発生前(但し、収穫45日前まで)	2回以内(プロトザミト2回以内)	たまねぎ(秋播栽培)
クロロIPC	全面土壌散布	定植活着後又は中耕後(但し、収穫30日前まで)	2回以内(IPC2回以内)	
ゴーゴーサン乳剤	全面土壌散布	定植後(雑草発生前)(但し、収穫30日前まで)	1回(ペンテメタリン1回)	たまねぎ(移植栽培)
セレクト乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫21日前まで)	3回以内(クレトゾム3回以内)	
トレファノサイド粒剤2.5	全面土壌散布 畦間土壌散布	定植後(但し、収穫75日前まで) 生育期(春期)(但し、収穫75日前まで)	2回以内(トリフルリン2回以内)	たまねぎ(本畑)
ホーネスト乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫14日前まで)	2回以内(テトラキジウム2回以内)	
モーティブ乳剤	全面土壌散布	定植後(雑草発生前)(但し、定植45日後まで)	1回(ジメナミド及びジメナミドP1回、ペンテメタリン1回)	
ワンサイドP乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫30日前まで)	1回(フルアジホップP1回)	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植活着後又は 中耕後 全面土壌散布	一年生雑草	クロロ IPC (IPC 45.8%) 300ml	1. 水 70~100ℓ に溶かし噴霧機で散布する。	1. 春先はできるだけ早く散布する。
定植後 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド 粒剤 2.5 (トリフルリン 2.5%) 4~5kg	1. 散粒機で散布するか、又は土で増量し均一に散布する。	
生育期 (春期) 畦間土壌散布				
定植後 (雑草発生前) 全面土壌散布	一年生雑草	ゴーゴーサン乳剤 (ペンテメタリン 30%) 300~500ml	1. 水 70~100ℓ に溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. キク科雑草及びツユクサは効果が劣るので、これらの優占ほ場では使用しない。
定植後 雑草発生前 全面土壌散布	一年生雑草 (キク科、カヤツリグサ科を除く)	アグロマックス水和剤 (プロピザミド 50%) 200~300g	1. 水 100ℓに溶かし噴霧機で均一に散布する。	1. 露出した根にかかると葉害を生ずることがあるので、根の露出したほ場では使用を避ける。
定植後 (雑草発生前) 全面土壌散布	一年生雑草	モーティブ乳剤 (ジメチアト P 19.7%、ペンテメタリン 23.1%) 400ml	1. 水 100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	
秋播栽培の早春期 (雑草生育初期) 雑草茎葉散布	畑地一年生広葉雑草	アクチノール B 乳剤 (アイキシニル 30%) 150~160ml	1. 水 100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. 雑草によくかかるよう降雨期をさけて、均一に散布する。 2. 展着剤を加用しない。 3. 高温時処理は葉害をおこすので、処理時期は4月上旬までとする。 4. イネ科雑草には効果がないので、広葉雑草優占ほ場で使用する。 5. 茎葉処理剤であるため、他の土壌処理剤と併用する。 6. 魚毒性が強いので注意する。
雑草生育期 イネ科雑草 3~ 5葉期 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑草	セレクト乳剤 (クレジム 24%) 50~75ml	1. セレクトは水 100ℓ、ホーネストは 100~150ℓ、ワンサイド P は 70~100ℓに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. イネ科作物に飛散しないように注意する。 2. たまねぎに付着しても生育に影響はない。 3. ワンサイド P は、スズメノカタビラには効果が劣る。
		ホーネスト乳剤 (テトラロキシジム 10%) 75~100ml		
一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	ワンサイド P 乳剤 (フルアジホップ P 17.5%) 75~100ml			

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クレマートU粒剤	一年生雑草	全面土壌散布	春播栽培の定植後（雑草発生前）（但し、収穫60日前まで）	5～7kg/10a	1回（ブタミホス1回）	B	
	一年生雑草	全面土壌散布	秋播栽培の定植後又は春季の雑草発生前（但し、収穫60日前まで）	4～6kg/10a	1回（ブタミホス1回）	B	
グラメックス水和剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植活着後（雑草発生前）（但し、収穫90日前まで）	100～200g/10a	1回（シアジン1回）	A	
バサグラン液剤（ナトリウム塩）	一年生雑草（イ科を除く）	雑草茎葉散布又は全面散布	秋播栽培の移植後、生葉4葉期まで（但し、収穫30日前まで）	60～120mℓ/10a	1回（ベンタゾン1回）	A	

- 注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。
 注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。
 注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(27) ねぎ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
ゴーゴーサン細粒剤F	全面土壌散布	定植後（雑草発生前）（但し、定植10日後まで）	1回（ペンデイメタリン1回）	

- 注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。
 注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
定植後 雑草発生前 全面土壌散布	一年生雑草	ゴーゴーサン細粒剤F（ペンデイメタリン2.0%） 4～5kg	1. 散粒機を用いるなどして均一に散布する。	1. 定植10日後までに処理する。 2. キク科雑草及びツユクサには効果が劣るので、これらの優占ほ場では使用しない。 3. 適湿な土壌条件で処理する。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ナブ乳剤	一年生イ科雑草（スズメカビバを除く）	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで）	150～200mℓ/10a	1回（セトキシジム1回）	B	
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫前日まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500mℓ/10a	2回以内（ケルホネート及びケルホネートP2回以内）	A	
ロロックス	一年生雑草	畦間土壌散布	定植後（但し、収穫30日前まで）（雑草発生前）	100～150g/10a	1回（リニユロン1回）	A	ねぎ（露地栽培）

- 注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。
 注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。
 注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(28) ながいも (やまのいも)

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
コダールS水和剤	全面土壌散布	植付後萌芽前（雑草発生前）	1回（プロメトリン1回、メトラクロール及びS-メトラクロール1回）	
ゴーゴーサン乳剤	全面土壌散布	植付後萌芽前（雑草発生前）	1回（ペンテメタリン1回）	
デュアールゴールド	全面土壌散布	植付後萌芽前（雑草発生前）	1回（メトラクロール及びS-メトラクロール1回）	
トレファノサイド粒剤2.5	全面土壌散布	植付直後	1回（トリフルアリン1回）	
	畦間土壌散布	生育初期（但し、植付30日後まで）		
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	植付直後		
	畦間土壌散布	生育初期（但し、植付30日後まで）		
ホーネスト乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで）	1回（テフラロキシム1回）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
植付直後 全面土壌散布 生育初期 畦間土壌散布	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド粒剤2.5（トリフルアリン2.5%）5kg	1. 散粒機又は土で増量し均一に散布する。	1. 広葉雑草も対象になるが効果はやや劣る。 2. 生育初期処理は定植後30日以内とする。 3. 剤型は2種類あるが、いずれかで1作1回処理する。
		トレファノサイド乳剤（トリフルアリン44.5%）250ml	1. 水100ℓに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	
植付後萌芽前（雑草発生前） 全面土壌散布	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	ゴーゴーサン乳剤（ペンテメタリン30%）200～400ml	1. 水100ℓに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. キク科雑草及びツユクサには効果が劣るので、これらの優占ほ場では使用しない。 2. 適湿な土壌条件で処理する。
		コダールS水和剤（プロメトリン26.6%、S-メトラクロール24.8%）225～300g	1. 水100ℓに溶かし、噴霧機で均一に散布する。	
		デュアールゴールド（S-メトラクロール83.7%）70～130ml		1. 適湿な土壌条件で処理する。 2. 非イネ科雑草が優先するほ場では、範囲内の高薬量で使用する。 3. 砂土では使用しない。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 雑草茎葉散布	一年生イネ科雑草	ホーネスト乳剤 (テトラロキシム 10%) 75～100ml	1. 水 100ℓ に溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. イネ科作物に飛散しないように注意する。 2. やまのいもに付着しても、生育に影響はない。 3. 遅効性で完全枯死までにやや時間を要する。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	蚕毒	備考
ロロックス	一年生雑草	全面土壌散布	植付直後	100～200g/10a	2回以内(リニuron) 2回以内(但し、粒剤は1回以内)	A		
		畦間土壌散布	生育期(但し、収穫60日前まで) (雑草発生前～発生揃期)					

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(29) ばれいしょ

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
レグロックス	茎葉散布	開花後30日～黄変期(茎葉繁茂期)(但し、収穫14日前まで)	1回(ジクット2回以内(但し、茎葉枯凋は1回以内))	使用目的: 茎葉枯凋
		黄変期～枯凋期(但し、収穫14日前まで)		
	雑草茎葉散布	雑草生育期(黄変期～枯凋期)(但し、収穫14日前まで)	2回以内(ジクット2回以内(但し、茎葉枯凋は1回以内))	
ロロックス	全面土壌散布	植付直後～萌芽前	1回(リニuron 1回)	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
植付直後～萌芽前 全面土壌散布	一年生雑草	ロロックス (リニuron 50%) 150g	1. 水 100ℓ に溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. 覆土は丁寧に行い、土壌面はなるべく平滑にする。 2. 付近の作物にかからないように散布する。 3. 散布直後に多量の降雨が予想される場合は散布を延期する。 4. 培土は萌芽後25～30日位に実施する。
雑草生育期 (黄変期～枯凋期) 雑草茎葉散布	一年生雑草	レグロックス (ジクット 31.8%) 300ml	1. 水 100ℓ に溶かし、噴霧機で均一に散布する。	1. 茎葉、雑草によくかかるよう均一に散布する。 2. 腐食性があるので器具の取扱いに注意する。 3. 人畜には毒性は小さいが、劇物であるので、吸ったり、皮ふにつけないように注意する。

防除時期 及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び 10a 当り使用量	使用法	注意事項
雑草生育期 (黄変期～枯凋 期) 雑草茎葉散布				4. 散布後数時間、降雨の ない時に散布する。 5. 露出したものは被害を うけるので、培土を十分 する。 6. 付近の作物にかからない ように散布する。 7. 茎葉枯凋の目的で使用 する場合、展着剤は加用 しない。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚 毒	蚕 毒	備考
クリアターン 細粒剤F	一年生雑草	全面土壌散布	植付後～萌芽前 (雑草発生前)	4～ 5kg/10a	1回(ベンチオカブ 1回、ペンテイメタリ ン1回、リニロン1 回)	B		
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	雑草生育期植付前 又は植付後萌芽直 前	100～ 200ml /10a	1回(ケルホネート及 びケルホネートP3 回以内(但し、 萌芽前は1回以 内、萌芽後は2 回以内))	A		

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(30) さといも

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚 毒	蚕 毒	備考
コンボラル	一年生雑草(ツユ クサ、キ科を除く)	全面土壌散布	植付直後	4～ 6kg/10a	1回(トリフルリン1 回、ペンテイメタリ ン2回以内(但 し、土寄せ後の 処理は1回以 内))	B - s		
ナブ乳剤	一年生イネ科雑 草(スズメノカタビラ を除く)	雑草茎葉散布 又は全面散布	雑草生育期(イネ科 雑草3～5葉期) (但し、収穫30日 前まで)	150～200 ml /10a	1回(セトキシジム1 回)	B		
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫30日前まで (雑草生育期植付 前又は畦間処理)	300～500 ml /10a	3回以内(ケルホネ ート及びケルホネ ートP3回以内)	A		
ロロックス	一年生雑草	全面土壌散布	植付直後	100～ 200g/10a	1回(リニロン1回)	A		

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(31) こんにやく

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
ゴーゴーサン細粒剤F	全面土壌散布	植付後又は培土後 (雑草発生前) (但し、植付30日 後まで)	1回(ペンデイメタリン1回)	
ゴーゴーサン乳剤				
コンボラル	全面土壌散布	植付後、培土後 (萌芽前)	1回(トリフルアリン2回以内、ペンデイメタリン1回)	
トレファノサイド粒剤2.5	全面土壌散布	植付直後、中耕培 土直後(萌芽前)	2回以内(トリフルアリン2回以内)	
トレファノサイド乳剤				
プリグロックスL	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生 育期(但し、収穫 30日前まで)	3回以内(ジクワット3回以内、 ハラコート3回以内)	
		植付後～萌芽直前		

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。


注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 使用回数は栽培期間内での回数であり、掘り上げない栽培の場合は、年をまたいだ収穫までの総使用回数なので、間違えないように注意する。

防除時期 及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び 10a 当り使用量	使用法	注意事項
植付直後、中耕 培土直後(萌芽 前) 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ 科、カヤツ リグサ科、 キク科、ア ブラナ科を 除く)	トレファノサイド乳 剤 (トリフルアリン 44.5%) 250ml	1. 水 100ℓに溶 かし、噴霧機 で均一に散布 する。	1. 既に発生している雑草 には除草効果が劣るの で処理時期が遅れない ように散布する。 2. トレファノサイドは広 葉雑草に効果が劣るの で、イネ科一年生雑草 の優占するほ場で使用 する。
		トレファノサイド粒 剤2.5 (トリフルアリン 2.5%) 5kg	1. 手または散 粒機で均一 に散布す る。	
植付後又は培土 後(雑草発生前) (但し、植付 30 日後まで) 全面土壌散布	一年生雑草	ゴーゴーサン乳剤 (ペンデイメタリン 30%) 200～300ml	1. 水 100ℓに溶 かし、噴霧機 で均一に散布 する。	3. ゴーゴーサン、コンボ ラルはツユクサ、キク 科雑草に効果が劣るの で、これらの優占ほ場 では使用しない。 4. 除草効果を高めるため 砕土整地はていねいに 行う。 5. 激しい降雨が予想され る場合は散布しない。 6. 土壌が極端に乾いてい る場合は効果が劣るの で、適湿時または適当 に湿らせてから散布す る。 7. 重複散布すると薬害を 生じやすく、風によっ てまきむらを生じやす いので風の無い日を選 んで均一に散布する。
		ゴーゴーサン細粒 剤F (ペンデイメタリン 2%) 5～6kg	1. 手または散 粒機で均一 に散布す る。	
植付後、培土後 (萌芽前) 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユク サ、キク科 を除く)	コンボラル (トリフルアリン 1.2%、 ペンデイメタリン 1.2%) 4～6kg	1. 手または散 粒機で均一 に散布す る。	

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a 当り使用量	使用法	注意事項
植付後～萌芽直前 畦間処理：雑草生育期（但し、収穫 30 日前まで） 雑草茎葉散布	一年生雑草	プリグロックスL (ジクワット 7%、 パラコート 5%) 600～800ml	1. 水 100～150ℓに溶かし、噴霧機で雑草の茎葉に均一に散布する。	1. 脱苞後のこんにやくは、薬害が発生しやすいので、出芽前処理はこんにやくの出芽直前に行う。 2. 生育期処理はこんにやくの茎葉に薬液がかかると薬害が生じるので飛散防止カバーを使用するなど、注意して散布する。 3. こんにやくの倒伏期以降は球茎に薬害を生じるおそれがあるので使用しない。 4. 雑草が大きい時期は 10 a 当たり薬量を 800ml とする。 5. 散布後数時間、降雨のない時に散布する。 6. 除草剤用の展着剤を加用する。 7. 付近の作物にかからないように注意する。

こんにやく雑草防除体系



(32) だいこん

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	は種直後	1回(トリフルリン1回)	だいこん (露地栽培)

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
は種直後 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 150~200ml	1. 水 100ℓ に溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. 砂質土壌では薬害の恐れがあるので薬量を減らす。 2. マルチ・トンネル栽培では薬害が出やすいので使用しない。 3. キク科、アブラナ科に効果が劣るので、草種により使い分ける。 4. 過湿、過乾燥土壌での使用は避ける。

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫 45 日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	300~500mℓ /10a	2 回以内 (ケルホシネット及びケルホシネット P2 回以内)	A	
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後	150mℓ /10a	1 回(アラクロール 1 回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(33) かぶ

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
デュアール乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後 (雑草発生前)	100~200mℓ /10a	1 回(メトラクロール及び S-メトラクロール 1 回)	B	
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫 21 日前まで (畦間処理: 雑草生育期)	300~500mℓ /10a	2 回以内(ケルホシネット及びケルホシネット P2 回以内)	A	
	一年生雑草	雑草茎葉散布	は種前 (雑草生育期)	300~500mℓ /10a	2 回以内(ケルホシネット及びケルホシネット P2 回以内)	A	
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後	150mℓ /10a	1 回(アラクロール 1 回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(34) にんじん

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	は種直後	1回(トリフルリン1回)	
ロロックス	全面土壌散布	にんじん3~5葉期(但し、収穫30日前まで)(雑草発生始期) は種直後	1回(リニuron2回以内(但し、は種直後は1回以内、にんじん3~5葉期は1回以内))	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び10a当り使用量	使用法	注意事項
は種直後 全面土壌散布	一年生雑草	ロロックス (リニuron 50%) 100~200g	1. 水100ℓに溶かして噴霧機で均一に散布する。	1. 畑の湿っている時を選んで均一に散布する。 2. 生育期処理の場合は、にんじんの株元にもかかるように散布する。 3. にんじんの本葉1~2葉期に散布すると薬害を起こすので使わない。
にんじん本葉 3~5葉期 雑草発生始期 全面土壌散布		ロロックス (リニuron 50%) 100~150g		
は種直後 全面土壌散布	一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン 44.5%) 250~300mℓ		

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
クリアターン細粒剤F	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後(雑草発生前)	4~5kg/10a	1回(ベンチオカーブ1回、ペンテメタリン1回、リニuron2回以内(但し、は種直後は1回以内、にんじん3~5葉期は1回以内))	B	
クレマートU粒剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後発芽前(雑草発生前)	4~6kg/10a	1回(フタホス1回)	B	
コダール水和剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後発芽前(雑草発生前)	200g/10a	1回(プロメトリン2回以内、メトラコロール及びS-メトラコロール1回)	B	
ホーネスト乳剤	一年生イネ科雑草	雑草茎葉散布	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫30日前まで)	75~100mℓ/10a	1回(テフラロキシム1回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(35) ごぼう

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
アグロマックス水和剤	一年生雑草(キ科、カヅリグサ科を除く)	全面土壌散布	は種後発芽前(雑草発生前)	200～300g/10a	1回(プロピサミド 1回)	A	
トレファノサイド乳剤	一年生雑草(ユカサ科、カヅリグサ科、キ科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	200～300mℓ/10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	ごぼう(露地栽培)
ナブ乳剤	一年生イネ科雑草(スズメカビタを除く)	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫30日前まで)	150～200mℓ/10a	1回(セトキシジム 1回)	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(36) やまごぼう (もりあざみ)

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
アグロマックス水和剤	一年生雑草(キ科、カヅリグサ科を除く)	全面土壌散布	は種後発芽前(雑草発生前)	150～200g/10a	1回(プロピサミド 1回)	A	
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	収穫30日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	300～500mℓ/10a	3回以内(ケルホネト 3回以内)	A	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

(37) その他野菜

・参考農薬

品目	薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ゆうがお	トレファノサイド粒剤 2.5	一年生雑草(ユカサ科、カヅリグサ科、キ科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	定植キヤップ後(雑草発生前)(但し、収穫75日前まで)	4～6kg/10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	
はつかだいこん	トレファノサイド乳剤	一年生雑草(ユカサ科、カヅリグサ科、キ科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	150～200mℓ/10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	(露地栽培)
非結球あぶらな科葉菜類	トレファノサイド乳剤	一年生雑草(ユカサ科、カヅリグサ科、キ科、アブラナ科を除く)	全面土壌散布	は種直後	150～200mℓ/10a	1回(トリフルリン 1回)	B-s	
にんにく	コンボラル	一年生雑草(ユカサ科、キ科を除く)	全面土壌散布	植付前～植付後(但し、収穫90日前まで)	4～6kg/10a	1回(トリフルリン 2回以内、ベンデメタリン 1回)	B-s	
	ナブ乳剤	一年生イネ科雑草(スズメカビタを除く)	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫7日前まで)	150～200mℓ/10a	1回(セトキシジム 1回)	B	
	ロックス	一年生雑草	全面土壌散布	植付後～萌芽前(雑草発生前)	100～150g/10a	1回(リニエロン 1回)	A	

品目	薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
わけぎ	クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植活着後（雑草発生前）（但し、定植 10 日後まで）	200～400 mℓ/10a	1 回（ブタホス 1 回）	B	
あさつき	クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植活着後（雑草発生前）（但し、定植 10 日後まで）	200～400 mℓ/10a	1 回（ブタホス 1 回）	B	
らっきょう	トレファノサイド乳剤	一年生雑草（ユズメ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	全面土壌散布	植付後、春期雑草発生前（但し、収穫 120 日前まで）	200～300 mℓ/10a	2 回以内（トリフルリン 2 回以内）	B-s	（露地栽培）
にら	ナブ乳剤	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草 3～5 葉期）（但し、収穫前日まで）	150～200 mℓ/10a	1 回（セトキシム 1 回）	B	
	ロックス	一年生雑草	全面土壌散布	収穫 30 日前まで（雑草発生前）	100～150g /10a	1 回以内（リニロン 1 回）	A	
豆類（未成熟）	ナブ乳剤	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草茎葉散布又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草 3～5 葉期）（但し、収穫 14 日前まで）	150～200 mℓ/10a	1 回（セトキシム 1 回）	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

(38) しゃくやく（薬用）

薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
タッチダウン i Q	雑草茎葉散布	畦間処理：雑草生育期（但し収穫 7 日前まで）	3 回以内（グリホサート 3 回以内）	
トレファノサイド乳剤	全面土壌散布	萌芽前（雑草発生前）	5 回以内（但し、1 年間に 1 回以内）（トリフルリン 5 回以内）（但し、1 年間に 1 回以内）	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

防除時期及び処理法	対象雑草	除草剤の種類及び 10 a 当り使用量	使用法	注意事項
生育期 畦間雑草茎葉散布 （雑草生育期）	一年生雑草	タッチダウン i Q （グリホサート・カリウム塩 44.7%） 250～500mℓ	1. 水 25～100ℓ に溶かして均一に散布する。少量散布の際には、専用ノズルを使用する。	1. しゃくやく及び周囲の作物に飛散しないように注意する。
萌芽前 （雑草発生前） 全面土壌散布	一年生雑草 （ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	トレファノサイド乳剤 （トリフルリン 44.5%） 300mℓ	1. 水 100ℓ に溶かして均一に散布する。	

(39) とうき (薬用)

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
ゴーゴーサン乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	定植後（雑草発生前）（但し、収穫120日前まで）	300mℓ/10a	1回（ペンディメタリン1回）	B	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。

注3) キク科雑草とツユクサには効果が劣るので、これらの優占圃場では使用しない。

(40) かのこそう (薬用)

・参考農薬

薬剤名	対象雑草	使用方法	使用時期	使用量	使用回数	魚毒	備考
トレファノサイド乳剤	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	全面土壌散布	定植後萌芽前（雑草発生前）（但し、収穫120日前まで）	300mℓ/10a	1回（トリフルリン1回）	B-s	

注1) 使用回数の欄の記載は、収穫物への残留回避のため当該剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注2) 農薬のラベルに記載されている注意事項を必ず読む。