

## 2. 主要農薬の蚕児に対する中毒型の分類

- 印は該当する項目  
 ◎印はそのうちでも強い農薬  
 ※印は特に注意を必要とする農薬

### 殺菌剤

農薬名	基準分類 蚕児の症状		中毒型						殺虫力				残留毒性	
	急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3～7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		短期で消 失する。	
			強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱		急性
アミスタ						○				○			○	
アリエッティC						○				○				○
アントラコール			○				○				○			○
アンビル						○				○				○
イオウ						○				○				○
インダー						○			○					○
エムダイファー			◎※						◎※			◎※		○
オリゼメート						○				○				○
カスミン						○				○				○
カスラブサイド						○				○				○
カーゼートPZ		○				○				○				○
キタジンP		○						○						○
キノンドー			○						○			○		○
キンセツト					○				○			○		○
クブラビットホルテ					◎				◎			◎		○
ゲッタ						○				○				○
コラトツプ						○				○				○
コロナ						○				○				○
サプロール						○				○				○
サンヨール						○				○				○
ジマンダイセン			◎※						◎※			◎※		○
スコア						○				○				○
スターナー						○				○				○
ストロビー						○				○				○
スパットサイド						○				○				○
スミブレンド						○				○				○
スミレックス						○				○				○
Zボルドー					◎				◎			◎		○
ダコニール1000						○				○				○
ダコレックス						○				○				○
ダコレート		○				○				○				○
デラ		○						○						○
ドイツボルドーA					◎※				◎※			◎※		○
トップジンM						○				○				○
ネビジン						○				○				○
バシタック			◎				◎				◎※			○

基準分類 農薬名	中毒型						殺虫力				残留毒性		短期で消失する。
	急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3~7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
パ ス ポ ー ト						○				○			○
パ ス ワ ー ド						○				○			○
バ リ ダ シ ン						○				○			○
ビ ー ム						○				○			○
フ ェ ス テ ィ バ ル M					○					○		○	
フ ジ ワ ン						○				○			○
ブ ラ シ ン						○				○			○
フ ル ピ カ						○				○			○
フ ロ ン サ イ ド						○				○		○	
ベ フ ラ ン			◎							◎		◎	
ベ ル ク ー ト					◎					◎		◎	
ベ ン レ ー ト			○							○		○	
ベ ン レ ー ト T						○				○			○
ボ ル ド ー					○					○		○	
ホ ラ イ ズ ン										○		○	
ポ リ オ キ シ ン A L						○				○			○
ポ リ オ キ シ ン Z						○				○			○
マ ネ ー ジ						○				○			○
モ レ ス タ ン						○				○			○
モ ン カ ッ ト			◎							◎		◎	
モ ン セ レ ン						○				○			○
ラ ブ サ イ ド			○				○					○	
ラ ブ サ イ ド ベ フ ラ ン *						○				○		○	
ラ リ ー						○				○			○
リ ゾ レ ッ ク ス						○				○			○
ロ ブ ラ ー ル						○				○			○



農薬名	基準分類		中毒型						殺虫力				残留毒性			
	蚕児の症状		急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3～7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		短期で 消失する。	
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性				
ピラニカ フォース ベストガード ベジホーン マイトクリーン マイトコーネ マトリック マラソン マラバッサン ミクロデナポン	◎					○			◎			○		◎	○	
M R . ジョーカー モスピラン ランネート ロムダ	◎※							◎※						◎※		
	◎※							◎※						◎※		
	◎※	◎						◎						◎		
			◎※											◎※		
			○					○			○			○		
										○				○		

### 除草剤

農薬名	基準分類		中毒型						殺虫力				残留毒性			
	蚕児の症状		急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3～7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		短期で 消失する。	
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性				
ソルネット						○					○					○

### 【注意事項】

\*：既に登録は失効しているが、登録失効から1年以内の場合に限り、参考として掲載した。  
注) 残留性から推定される安全日数は、次項以降の表を参照する。