

7. そば

・殺菌剤（参考農薬）

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
14	リゾレックス粉剤	全面土壌混和	は種前	1回	

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	ゼンターリ顆粒水和剤	散布	発生初期(但し、収穫前日まで)	-	

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決めているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
立 枯 病	は 種 前	[参考農薬] 1. は種前にリゾレックス粉剤を 10 a 当り 20kg、全面に均一散布し、土壌とよく混和する。	
ハスモンヨトウ	幼虫発生初期	[参考農薬] 1. ゼンターリ顆粒水和剤の 2,000 倍液を 10 a 当り 1500散布する。	1. ゼンターリは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。

8. あわ、きび、ひえ、はとむぎ

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	トアロー水和剤CT	散布	発生初期(但し、収穫前日まで)	-	雑穀類(ひえを除く)
		散布	発生初期(但し、収穫前日まで)	-	ひえ

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決めているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 雑穀類(ひえを除く)は 1,000 倍、ひえは 500~1,000 倍の登録である。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
アワノメイガ	幼虫発生初期	[参考農薬] 1. トアロー水和剤CTの 1,000 倍液を 10 a 当り 60~1500/10a 散布する。	1. トアローは蚕毒に注意する。