

## 7. そば

・殺菌剤（参考農薬）

| FRAC<br>コード | 薬剤名      | 使用方法   | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|----------|--------|------|------|----|
| 14          | リゾレックス粉剤 | 全面土壌混和 | は種前  | 1回   |    |

・殺虫剤（参考農薬）

| IRAC<br>コード | 薬剤名        | 使用方法 | 使用時期            | 使用回数 | 備考 |
|-------------|------------|------|-----------------|------|----|
| 11          | ゼンターリ顆粒水和剤 | 散布   | 発生初期(但し、収穫前日まで) | -    |    |

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決めているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

| 病害虫名        | 防除時期   | 防除方法  | 注意事項                          |
|-------------|--------|---|-------------------------------|
| 立枯病         | は種前    | [参考農薬]<br>1. は種前にリゾレックス粉剤を 10 a 当り 20kg、全面に均一散布し、土壌とよく混和する。 |                               |
| ハスモン<br>ヨトウ | 幼虫発生初期 | [参考農薬]<br>1. ゼンターリ顆粒水和剤の 2,000 倍液を 10 a 当り 1500 散布する。       | 1. ゼンターリは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。 |