

25. タアサイ

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	トアロー水和剤CT	散布	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-	野菜類 (ハセリ、え ごま(葉) を除く)
11	バシレックス水和剤	散布	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-	野菜類

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

注4) 蚕毒・魚毒については、「56. 野菜類の総括注意」も参照する。

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
コナガ	生育期間	[参考農薬] 1. トアロー水和剤CT又はバシレックス水和剤の1,000倍液を散布する。	1. バシレックスは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。

26. ケール

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	チューンアップ顆粒水和剤	散布	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-	野菜類(ト マト、ミニト マトを除く)
11	トアロー水和剤CT	散布	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-	野菜類 (ハセリ、え ごま(葉) を除く)
11	バシレックス水和剤	散布	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-	野菜類

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

注4) 蚕毒・魚毒については、「56. 野菜類の総括注意」も参照する。

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
コナガ	生育期間	[参考農薬] 1. トアロー水和剤CT、バシレックス水和剤の1,000倍液、チューンアップ顆粒水和剤2,000倍液のいずれかを散布する。	1. バシレックス、チューンアップは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。