

28. モロヘイヤ

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
6	コロマイト乳剤	散布	収穫前日まで	1回	
1	スミチオン乳剤	散布	収穫14日前まで	2回以内	
21	ダニトロンフロアブル	散布	収穫7日前まで	1回	

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

病害虫名	防除時期	防除方法	注意事項
ハダニ類	生育期間	[参考農薬] 1. コロマイト乳剤1,500倍液、又はダニトロンフロアブル2,000倍液を散布する。	1. コロマイトは蚕毒及び魚毒に、ダニトロンは魚毒に特に注意する（特別指導事項参照）。 2. ダニトロンは蚕毒に注意する。
マメコガネ	生育期間	[参考農薬] 1. スミチオン乳剤1,000倍液を散布する。	