

41. さといも

・殺虫剤（参考農薬）

| IRAC コード | 薬剤名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------------|------|----|
| 3 | アディオオン乳剤 | 散布 | 収穫7日前まで | 5回以内 | |
| 1 | オンコル粒剤5 | 株元土壌混和 | 生育期（但し、収穫60日前まで） | 1回 | |
| 20 | マイトコーネフロアブル | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 | |

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

病害虫名（F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体）

| 病害虫名 | 防除時期 | 防 除 方 法 | 注 意 事 項 |
|--------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| 乾 腐 病 (F) | 植 付 前 | 1. 無病の種いもを用いる。 2. 土壌消毒する。薬剤で消毒する場合は、土壌消毒の項を参照し、登録薬剤を用いる。 | |
| アブラムシ類 (ウイルス媒介) | 生 育 期 間 | [参考農薬] 1. アディオオン乳剤3,000倍液を散布する。 | 1. アディオオンは蚕毒及び魚毒に特に注意する（特別指導事項参照）。 |
| コガネムシ類 幼虫 | 生 育 期 間 (土 寄 せ 時) | [参考農薬] 1. オンコル粒剤5を10a当り6～9kgの割合で土寄せ時に株元土壌混和する。 | |
| ハダニ類 | 生 育 期 間 | [参考農薬] 1. マイトコーネフロアブル1,000倍液を散布する。 | |