

### 13. アスター

・殺菌剤（参考農薬）

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
M3+1	ホーマイ水和剤	30分間種子浸漬	は種前	1回	
		種子粉衣			

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 蚕毒・魚毒については、「28. 花き類の総括注意」も参照する。

病害虫名（F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体）

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
萎凋病 (F)	生育期間	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 発病ほ場では、土壤消毒を徹底する。</li> <li>2. ほ場の排水性向上に努める。</li> <li>3. 多発ほ場では連作しない。</li> <li>4. 前作の発病株残渣は、ほ場外に埋却する。</li> <li>5. 本病に対しては耐病性の品種間差があるので、発病ほ場ではできるだけ耐病性を有する品種を用いる。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本病は土壤伝染性の難防除病害である。</li> <li>2. 小輪系品種は罹病しやすい傾向がある。</li> </ol>
苗立枯病 (F)	は種前	<p>[参考農薬]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ホーマイ水和剤 200 倍液に 30 分間種子浸漬処理するか種子重量の 1.0%を種子粉衣処理する。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消毒液の残液については、農薬廃液処理装置を用いて処理するか、産業廃棄物処理業者に処分を依頼する等適正に処理する（特別指導事項参照）。</li> </ol>