

20. プリムラ

・殺菌剤（参考農薬）

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
M1*	サンヨール	散布	開花前まで	8回以内	

・殺虫剤（参考農薬）

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
1	スプラサイド水和剤	散布	発生初期	6回以内	花き類・観葉植物

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

病害虫名（F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体）

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
灰色かび病 (F)	生 育 期 間	1. 施設内が過湿にならないよう換気を図り、密植を避ける。 2. 発病を見たら直ちに罹病葉を除去し、薬剤を散布する。 [参考農薬] 1. サンヨール 500 倍液を散布する。	1. 薬剤耐性菌の出現を避けるため、同一系統薬剤を連用しない。
オンシツ コナジラミ	生 育 期 間	1. 施設開口部を防虫ネット（0.4mm 目合い）で被覆する。 [参考農薬] 1. スプラサイド水和剤 1,000 倍液を散布する。	