

23. べにばな

・殺菌剤（参考農薬）

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
M3+1	ベンレートT水和剤20	24時間種子浸漬	は種前	1回	
		種子粉衣			
M3+1	ホーマイ水和剤	30分間種子浸漬	は種前	1回	
		種子粉衣			

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

病害虫名（F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体）

病害虫名	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
炭 疽 病 (F)	は 種 前	[参考農薬] 1. ベンレートT水和剤20の10倍液に24時間種子浸漬処理するか、乾燥種子重量の0.5%を種子粉衣処理する。	1. 消毒液の残液については、農薬廃液処理装置を用いて処理するか、産業廃棄物処理業者に処分を依頼する等適正に処理する（特別指導事項 参照）。
苗立枯病 (F)	は 種 前	[参考農薬] 1. ホーマイ水和剤200倍液に30分間種子浸漬処理するか、種子重量の1.0%を種子粉衣処理する。	