

身体状況調査・歩行数調査の結果

肥満とやせの状況(15歳以上)

(%)

性別	年齢区分	総数	肥満 (BMI \geq 25)		やせ (BMI<18.5)		普通
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合
男性	総数※1	542	26.1	2.2	3.9	1.0	70.0
	15-19歳	29	7.5	4.3	21.1	10.3	71.5
	20-29歳	38	31.3	9.5	6.0	5.6	62.8
	30-39歳	55	23.4	7.5	0.0	0.0	76.6
	40-49歳	86	26.0	6.7	2.0	1.2	72.0
	50-59歳	85	32.0	4.5	2.0	1.4	66.0
	60-69歳	115	24.2	5.0	2.7	1.9	73.1
	70歳以上	134	28.6	4.1	4.4	1.6	66.9
	(再掲)65-74歳	105	26.1	5.1	5.1	2.0	68.9
	(再掲)75歳以上	86	31.3	6.0	4.2	2.1	64.5
	(再掲)40-74歳※1	334	26.7	3.4	2.6	0.8	70.7
	(再掲)40-74歳※2	334	27.2	3.4	2.5	0.8	70.2
	(再掲)20歳以上※1	513	27.3	2.4	2.8	1.0	69.9
	(再掲)20歳以上※2	513	27.6	2.7	2.8	1.2	69.6
	(再掲)20-69歳※1	379	27.0	3.1	2.3	1.2	70.7
	(再掲)20-69歳※2	379	27.4	3.3	2.4	1.4	70.2
女性	総数※1	647	17.8	1.8	11.8	1.6	70.4
	15-19歳	36	2.9	2.7	12.3	6.2	84.8
	20-29歳	31	8.0	4.9	9.8	5.4	82.3
	30-39歳	63	10.9	4.0	20.8	6.1	68.3
	40-49歳	104	11.1	3.0	10.5	3.2	78.3
	50-59歳	126	22.2	3.7	8.2	2.6	69.6
	60-69歳	121	22.5	4.2	15.0	3.3	62.5
	70歳以上	166	25.5	3.2	8.6	2.5	65.8
	(再掲)65-74歳	117	24.7	4.0	5.8	2.8	69.5
	(再掲)75歳以上	110	28.1	4.0	11.8	3.6	60.2
	(再掲)40-74歳※1	407	19.0	2.1	9.9	1.7	71.1
	(再掲)40-74歳※2	407	19.0	2.1	10.1	1.7	70.8
	(再掲)20歳以上※1	611	18.6	1.8	11.8	1.6	69.6
	(再掲)20歳以上※2	611	17.0	1.8	12.2	1.7	70.9
	(再掲)20-39歳※1	94	9.7	2.9	16.4	4.1	73.9
	(再掲)20-39歳※2	94	9.6	2.9	15.7	3.9	74.7
(再掲)40-69歳※1	351	18.7	2.3	11.5	1.9	69.8	
(再掲)40-69歳※2	351	18.9	2.3	11.1	1.9	70.1	
総数	総数※1	1,189	21.8	1.7	8.0	1.0	70.2
	15-19歳	65	5.2	3.3	16.8	5.9	78.0
	20-29歳	69	19.9	5.5	7.8	3.6	72.3
	30-39歳	118	17.3	4.2	10.2	3.3	72.5
	40-49歳	190	18.7	3.7	6.2	1.8	75.1
	50-59歳	211	27.1	3.0	5.1	1.4	67.8
	60-69歳	236	23.3	3.2	9.0	2.2	67.7
	70歳以上	300	26.8	2.2	6.9	1.6	66.3
	(再掲)65-74歳	222	25.3	3.2	5.5	1.7	69.2
	(再掲)75歳以上	196	29.4	3.4	8.7	2.3	61.9
	(再掲)40-74歳※1	741	22.8	2.0	6.4	1.0	70.9
	(再掲)40-74歳※2	741	23.1	1.9	6.3	1.0	70.5
	(再掲)20歳以上※1	1,124	22.8	1.7	7.5	1.0	69.7
	(再掲)20歳以上※2	1,124	22.3	1.9	7.5	1.0	70.2

注)

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

児童・生徒（6～14歳）の肥満の状況(学校保健統計調査方式)

		(人)			
性別		総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
男性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超				
	-20%以下	0	0	0	0
	-20%超				
	+20%未満	46	16	13	17
	+20%以上				
	+30%未満	2	0	1	1
+30%以上	+50%未満	2	0	1	1
	+50%以上	1	1	0	0
	総数	51	52	52	52
女性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超				
	-20%以下	0	0	0	0
	-20%超				
	+20%未満	46	17	12	17
	+20%以上				
	+30%未満	2	1	0	1
+30%以上	+50%未満	1	0	1	0
	+50%以上	1	1	0	0
	総数	50	19	13	18
総数	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超				
	-20%以下	0	0	0	0
	-20%超				
	+20%未満	92	33	25	34
	+20%以上				
	+30%未満	4	1	1	2
+30%以上	+50%未満	3	0	2	1
	+50%以上	2	2	0	0
	総数	101	36	28	37

身長・体重の平均値（男性）

区分	人数	身長 (cm)						体重 (kg)					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
1-2歳	12	84.5	8.1	2.5	79.8	85.1	91.3	11.2	1.6	0.6	10.0	11.5	12.9
3-5歳	22	100.9	5.0	1.0	97.9	100.7	104.5	15.7	1.7	0.3	14.5	15.9	16.9
6-8歳	17	117.5	8.7	2.7	111.9	116.1	121.8	22.1	4.8	1.3	19.1	20.8	24.1
9-11歳	15	133.2	6.0	1.5	127.4	132.5	138.9	30.3	6.8	1.7	26.1	28.9	32.6
12-14歳	19	153.0	9.4	3.3	145.0	153.0	158.0	43.9	9.8	2.9	37.2	41.0	49.7
15-19歳	29	167.6	7.8	1.4	162.0	170.0	174.9	59.3	11.2	1.6	53.5	59.4	63.0
20-29歳	38	170.5	7.2	1.6	166.4	171.0	175.0	68.4	14.2	3.0	57.0	65.0	79.0
30-39歳	55	170.6	6.1	1.0	166.8	169.9	174.0	67.9	9.5	1.5	62.1	67.1	72.1
40-49歳	86	170.8	5.4	0.6	167.7	170.0	175.0	68.5	10.5	1.3	60.1	69.1	74.0
50-59歳	85	169.8	6.4	0.6	165.4	169.7	173.8	68.0	8.6	0.8	63.9	66.8	74.0
60-69歳	115	166.3	5.4	0.6	163.0	166.7	170.0	64.7	8.5	0.8	58.7	64.3	69.6
70歳以上	134	163.2	6.7	0.7	158.8	163.6	167.9	61.8	9.6	0.9	55.2	60.4	68.0
(再掲)40-74歳※1	334	168.3	6.2	0.4	164.6	168.2	172.1	66.3	9.5	0.6	60.0	65.9	72.0
(再掲)65-74歳	105	165.7	5.7	0.6	161.2	166.6	170.0	63.4	9.2	0.8	57.0	62.0	69.4
(再掲)75歳以上	86	162.5	6.8	0.9	158.0	163.0	166.4	61.5	9.8	1.3	54.9	60.0	68.0
(再掲)20歳以上※1	513	168.1	6.9	0.5	163.9	168.0	172.5	66.1	10.3	0.6	58.5	65.4	72.0
(再掲)20歳以上※2	513	168.5	6.8	0.5	164.2	168.5	173.0	66.5	10.5	0.7	58.7	65.8	72.0

注)

20歳以上の年齢階級の値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。（20歳未満は標本を単純に集計した値）

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口を基準にした重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準にした重み付けをして算出。

身長・体重の平均値（女性）

区分	人数	身長（cm）						体重（kg）					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
1-2歳	10	84.5	6.8	2.1	80.6	85.7	88.9	11.1	1.5	0.5	9.6	11.6	12.1
3-5歳	13	105.1	9.8	2.6	100.4	103.2	109.6	17.5	4.8	1.3	15.1	17.0	18.2
6-8歳	19	116.9	7.6	1.5	113.0	118.0	122.0	21.0	4.0	0.8	17.9	20.4	23.6
9-11歳	13	140.8	7.8	2.0	134.7	140.3	146.6	35.0	7.7	2.8	29.1	33.9	39.7
12-14歳	18	153.4	3.2	0.8	150.8	154.1	156.1	47.2	4.6	0.9	42.8	47.1	51.2
15-19歳	36	156.4	4.9	0.6	151.8	157.4	159.9	50.1	5.4	0.9	45.0	49.6	54.5
20-29歳	31	157.7	5.3	1.2	153.9	158.5	161.7	53.3	8.1	1.7	46.2	53.1	58.2
30-39歳	63	159.8	5.0	0.6	157.4	159.4	163.0	53.8	8.4	1.2	47.2	52.9	57.0
40-49歳	104	157.6	6.6	0.8	152.0	159.2	162.0	54.8	8.9	0.9	49.0	53.0	59.9
50-59歳	126	155.8	4.9	0.4	151.8	156.0	159.0	55.5	9.8	0.9	48.8	53.6	59.7
60-69歳	121	154.5	5.2	0.5	151.7	154.5	157.8	53.3	8.3	0.7	46.7	52.4	59.2
70歳以上	166	148.1	6.0	0.5	144.1	148.5	152.2	50.1	8.1	0.7	45.5	50.8	54.6
(再掲)40-74歳※1	407	154.9	6.0	0.4	151.0	154.5	159.3	54.0	8.7	0.5	48.1	53.0	58.0
(再掲)65-74歳	117	152.3	5.2	0.5	148.4	152.4	156.1	53.2	8.0	0.7	47.2	52.1	57.2
(再掲)75歳以上	110	147.1	6.2	0.7	142.8	147.8	150.6	49.2	8.7	1.0	44.8	49.5	54.3
(再掲)20歳以上※1	611	154.3	7.0	0.4	150.0	154.5	159.4	53.0	8.8	0.4	47.0	52.4	57.0
(再掲)20歳以上※2	611	155.5	6.7	0.4	151.4	155.8	160.0	53.5	8.8	0.4	47.3	52.8	57.4

注)

20歳以上の年齢階級の値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。（20歳未満は標本を単純に集計した値）

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口を基準にした重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準にした重み付けをして算出。

BMIの平均値（男性）

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
15-19歳	29	20.8	3.2	0.6	18.7	20.1	23.1
20-29歳	38	23.4	4.3	0.8	20.1	22.4	25.8
30-39歳	55	23.3	2.7	0.4	21.0	23.5	24.9
40-49歳	86	23.5	3.4	0.5	21.2	23.1	25.3
50-59歳	85	23.6	2.9	0.3	21.9	23.7	25.4
60-69歳	115	23.4	2.9	0.3	21.2	23.5	24.9
70歳以上	134	23.2	3.1	0.3	21.4	22.9	25.2
(再掲)65-74歳	105	23.1	2.9	0.3	20.9	22.9	25.1
(再掲)75歳以上	86	23.3	3.2	0.4	21.4	23.0	26.0
(再掲)20歳以上※1	513	23.4	3.2	0.2	21.2	23.2	25.2
(再掲)20歳以上※2	513	23.4	3.2	0.2	21.1	23.2	25.2
(再掲)40-74歳※1	334	23.4	3.1	0.2	21.2	23.4	25.1
(再掲)40-74歳※2	334	23.4	3.0	0.2	21.3	23.4	25.1
(再掲)20-69歳※1	379	23.4	3.2	0.2	21.0	23.4	25.2
(再掲)20-69歳※2	379	23.4	3.2	0.2	21.0	23.3	25.2

BMIの平均値（女性）

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
15-19歳	36	20.5	2.1	0.4	19.2	20.0	22.0
20-29歳	31	21.4	2.6	0.5	19.6	21.1	22.8
30-39歳	63	21.1	3.4	0.5	18.8	20.3	22.6
40-49歳	104	22.1	3.5	0.4	19.8	21.8	23.2
50-59歳	126	22.9	3.9	0.4	20.1	22.1	24.6
60-69歳	121	22.3	3.4	0.3	19.4	22.3	24.6
70歳以上	166	22.8	3.6	0.3	20.4	22.9	25.0
(再掲)65-74歳	117	23.0	3.4	0.3	20.6	22.5	24.9
(再掲)75歳以上	110	22.7	3.7	0.4	20.1	23.2	25.2
(再掲)20歳以上※1	611	22.3	3.5	0.2	19.8	21.8	24.2
(再掲)20歳以上※2	611	22.1	3.5	0.2	19.7	21.7	23.8
(再掲)40-74歳※1	407	22.5	3.6	0.2	20.2	22.1	24.2
(再掲)40-74歳※2	407	22.5	3.6	0.2	20.1	22.1	24.2
(再掲)20-39歳※1	94	21.2	3.1	0.3	19.3	20.6	22.7
(再掲)20-39歳※2	94	21.2	3.1	0.3	19.3	20.7	22.7
(再掲)40-69歳※1	351	22.4	3.6	0.2	19.9	22.0	24.2
(再掲)40-69歳※2	351	22.5	3.6	0.2	19.9	22.0	24.2

注)

値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

高血圧・正常高値の人の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	高血圧及び正常高値		高血圧		正常高値	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	22	31.2	12.8	22.4	11.2	8.8	8.4
	30-39歳	30	17.6	6.9	4.3	3.0	13.3	6.0
	40-49歳	38	45.2	13.1	18.7	6.6	26.4	8.9
	50-59歳	54	71.2	5.4	42.5	7.4	28.7	7.4
	60-69歳	77	76.2	6.2	62.3	8.2	13.9	4.5
	70歳以上	98	89.1	3.2	81.3	4.5	7.8	3.2
	(再掲)65-74歳	76	83.1	4.7	69.8	7.2	13.3	3.9
	(再掲)75歳以上	61	89.7	3.9	86.8	4.3	2.9	2.3
	(再掲)40-74歳※1	206	67.6	6.0	46.1	5.5	21.6	3.5
	(再掲)40-74歳※2	206	67.5	5.7	45.1	5.3	22.4	3.7
	(再掲)20歳以上※1	319	59.0	5.0	42.7	4.7	16.4	2.5
	(再掲)20歳以上※2	319	55.5	4.9	38.9	4.6	16.6	2.6
女性	20-29歳	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	45	1.6	1.7	1.6	1.7	0.0	0.0
	40-49歳	58	35.2	13.2	7.8	3.9	27.4	13.4
	50-59歳	97	37.0	6.4	30.6	5.7	6.3	2.5
	60-69歳	96	76.1	5.7	54.8	8.8	21.3	8.4
	70歳以上	118	79.5	8.3	65.8	7.3	13.7	3.3
	(再掲)65-74歳	86	87.1	4.0	71.4	5.4	15.7	4.6
	(再掲)75歳以上	77	73.3	10.8	60.6	9.5	12.8	3.6
	(再掲)40-74歳※1	292	57.5	4.8	39.2	4.4	18.3	5.2
	(再掲)40-74歳※2	292	53.0	5.1	35.6	4.3	17.4	5.1
	(再掲)20歳以上※1	433	47.8	4.7	34.9	4.4	13.0	2.9
	(再掲)20歳以上※2	433	38.3	4.4	27.3	3.9	11.1	2.8
総数	20-29歳	41	16.0	5.7	11.5	5.9	4.5	3.9
	30-39歳	75	9.8	4.1	3.0	2.2	6.8	3.1
	40-49歳	96	40.2	6.1	13.3	4.6	26.9	5.1
	50-59歳	151	54.1	5.0	36.6	4.7	17.5	4.3
	60-69歳	173	76.1	4.7	58.5	7.1	17.6	5.3
	70歳以上	216	83.5	5.3	72.2	5.0	11.3	2.4
	(再掲)65-74歳	162	85.0	3.5	70.6	5.2	14.4	3.3
	(再掲)75歳以上	138	79.5	7.4	70.5	7.0	9.1	2.6
	(再掲)40-74歳※1	498	62.5	3.6	42.6	4.4	20.0	2.6
	(再掲)40-74歳※2	498	60.4	3.6	40.4	4.2	19.9	2.6
	(再掲)20歳以上※1	752	53.2	3.9	38.6	3.8	14.6	1.6
	(再掲)20歳以上※2	752	46.9	3.8	33.1	3.6	13.8	1.6

注)

- ・高血圧、正常高値の判定は日本高血圧学会（2009年）による血圧の分類で判定。
- ・「高血圧有病者」は、収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者
- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血圧の平均値（20歳以上）

最低血圧（mmHg） ※血圧を下げる薬服用者を含む。

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	22	72.6	15.2	4.0	61.0	69.8	84.3	19	65.5	5.2	1.0	60.3	65.8	69.0
30-39歳	30	76.8	7.2	1.3	72.6	77.8	82.0	45	66.3	8.3	2.5	60.0	68.7	70.2
40-49歳	38	80.8	7.3	2.0	74.0	80.0	87.5	58	76.1	9.3	2.3	70.0	74.7	86.0
50-59歳	54	84.7	7.4	1.2	79.2	85.7	89.9	97	77.6	11.1	1.9	70.1	76.0	81.9
60-69歳	77	80.7	10.0	1.3	73.0	80.4	87.0	96	79.6	8.5	1.2	75.0	79.0	87.0
70歳以上	98	79.7	9.3	1.5	73.0	80.0	89.0	118	78.4	9.3	0.8	71.0	78.2	84.0
(再掲) 40-74歳※1	206	81.8	8.5	0.8	74.4	82.0	88.0	292	78.3	9.7	1.0	71.5	78.0	86.0
(再掲) 40-74歳※2	206	82.1	8.5	0.8	75.0	82.0	88.0	292	78.1	9.8	1.1	71.0	76.6	85.0
(再掲) 40-89歳※1	266	81.3	8.8	0.8	74.0	81.0	88.0	366	78.1	9.5	0.8	71.0	77.7	85.0
(再掲) 40-89歳※2	266	81.6	8.8	0.8	74.0	82.0	88.9	366	78.0	9.7	0.9	71.0	77.0	85.0
(再掲) 20歳以上※1	319	79.7	9.8	0.9	73.5	80.8	87.0	433	75.3	10.4	0.8	68.0	75.0	82.0
(再掲) 20歳以上※2	319	79.4	10.2	1.0	73.1	80.1	87.0	433	74.0	10.5	0.9	67.0	73.0	81.0

最高血圧（mmHg） ※血圧を下げる薬服用者を含む。

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	22	123.8	22.0	5.9	109.0	116.8	134.7	19	107.1	7.2	1.8	99.4	109.0	111.7
30-39歳	30	116.9	10.8	2.2	110.1	113.9	125.1	45	107.4	10.0	2.9	96.0	107.0	113.9
40-49歳	38	120.3	11.3	3.6	108.0	119.0	129.0	58	118.1	11.9	2.6	108.0	117.0	127.0
50-59歳	54	131.5	12.5	1.5	123.0	130.0	139.2	97	124.7	16.1	2.0	113.0	119.0	136.9
60-69歳	77	131.9	13.9	1.5	122.0	131.1	140.0	96	137.2	20.6	4.8	123.0	134.0	148.3
70歳以上	98	140.3	16.1	3.9	127.6	139.2	150.1	118	136.7	15.4	1.7	124.6	135.0	147.0
(再掲) 40-74歳※1	206	128.6	13.7	1.7	119.0	127.7	137.5	292	129.2	18.6	2.1	114.0	127.0	140.0
(再掲) 40-74歳※2	206	128.8	13.6	1.7	119.0	127.7	137.5	292	127.9	18.3	2.0	114.0	127.0	138.0
(再掲) 40-89歳※1	266	131.6	15.5	2.0	120.0	131.0	141.0	366	130.7	18.1	1.7	117.0	128.0	142.0
(再掲) 40-89歳※2	266	131.3	15.2	1.9	120.0	130.6	141.0	366	129.2	18.1	1.8	114.0	127.0	140.0
(再掲) 20歳以上※1	319	128.5	16.6	1.8	116.0	127.0	139.0	433	125.4	19.2	1.7	111.8	123.0	137.0
(再掲) 20歳以上※2	319	127.6	16.7	1.8	115.1	126.0	138.0	433	122.0	18.7	1.7	109.0	118.1	133.2

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血圧の平均値（20歳以上）

最低血圧（mmHg）	※血圧を下げる薬服用者を除外													
	男 性							女 性						
年齢階級	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	22	72.6	15.2	4.0	61.0	69.8	84.3	19	65.5	5.2	1.0	60.3	65.8	69.0
30-39歳	30	76.8	7.2	1.3	72.6	78.0	82.0	45	66.3	8.3	2.5	60.0	69.0	70.2
40-49歳	36	80.4	7.3	2.1	74.0	78.4	87.0	56	75.7	8.9	2.3	70.0	74.2	86.0
50-59歳	43	84.2	7.2	1.2	80.2	85.1	89.2	84	76.2	10.5	2.0	69.0	76.0	81.0
60-69歳	51	80.7	10.8	1.4	72.0	79.0	89.0	63	78.6	9.2	1.5	72.4	75.5	84.0
70歳以上	43	81.4	9.3	2.3	73.1	83.2	90.0	55	78.8	9.6	1.2	73.3	77.9	86.3
（再掲）40-74歳※1	152	81.6	8.6	1.0	74.0	82.0	88.4	221	77.2	9.8	1.1	70.0	76.0	84.0
（再掲）40-74歳※2	152	81.8	8.4	1.0	74.0	82.0	89.0	221	76.9	9.8	1.2	70.0	76.0	84.0
（再掲）40-89歳※1	173	81.7	8.6	1.0	74.0	82.0	89.0	256	77.3	9.6	1.0	70.0	76.0	84.0
（再掲）40-89歳※2	173	81.9	8.5	0.9	74.0	82.0	89.0	256	77.0	9.7	1.1	70.0	76.0	84.0
（再掲）20歳以上※1	225	79.4	10.0	1.0	74.0	79.0	87.1	322	73.8	10.3	0.8	67.0	73.0	80.0
（再掲）20歳以上※2	225	79.0	10.5	1.1	73.0	79.1	87.0	322	72.5	10.2	0.9	65.0	72.0	78.4

最高血圧（mmHg）	※血圧を下げる薬服用者を除外。													
	男 性							女 性						
年齢階級	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	22	123.8	22.0	5.9	109.0	116.8	134.7	19	107.1	7.2	1.8	99.4	109.1	111.7
30-39歳	30	116.9	10.8	2.2	110.4	113.9	125.1	45	107.4	10.0	2.9	96.0	107.0	113.9
40-49歳	36	119.5	10.6	3.5	107.9	119.0	129.0	56	118.0	12.0	2.7	108.0	116.5	127.0
50-59歳	43	129.7	12.0	1.8	122.8	127.0	136.6	84	122.1	15.5	2.0	112.6	115.1	130.0
60-69歳	51	130.5	15.1	2.1	118.5	128.6	138.0	63	129.1	15.4	2.1	120.0	133.0	137.0
70歳以上	43	143.9	18.3	6.3	129.9	141.3	163.2	55	134.9	16.9	2.9	123.0	130.6	146.0
（再掲）40-74歳※1	152	126.6	13.6	2.1	116.9	126.0	135.0	221	123.8	15.8	1.4	112.2	123.0	134.0
（再掲）40-74歳※2	152	126.8	13.5	2.0	117.0	126.0	135.0	221	123.0	15.4	1.4	112.0	121.0	133.0
（再掲）40-89歳※1	173	129.4	16.2	2.8	118.0	127.0	138.0	256	125.8	16.5	1.5	113.3	124.0	134.0
（再掲）40-89歳※2	173	129.1	15.8	2.5	118.0	127.0	137.5	256	124.4	16.0	1.4	112.7	123.0	133.6
（再掲）20歳以上※1	225	126.0	16.9	2.2	113.5	123.0	135.0	322	120.3	16.9	1.5	109.0	117.0	129.8
（再掲）20歳以上※2	225	125.3	16.9	2.1	113.1	123.0	135.0	322	117.6	16.0	1.4	107.0	114.0	127.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血圧の分布（20歳以上）

最低血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。 (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)
								20歳以上	40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	0	0	0	1	0
	50-59	3	0	0	0	1	4	8	1
	60-69	6	5	2	1	10	14	38	18
	70-79	3	13	13	10	22	37	98	57
	80-89	7	12	16	28	28	27	118	85
	90-99	1	0	6	13	14	14	48	39
	100-109	1	0	1	2	1	2	7	5
	110-119	0	0	0	0	1	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		22	30	38	54	77	98	319
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	2	4	2	0	1	0	9	3
	60-69	13	25	13	17	9	29	106	46
	70-79	4	14	25	37	37	34	151	110
	80-89	0	0	15	26	38	40	119	94
	90-99	0	2	3	11	9	12	37	30
	100-109	0	0	0	6	2	3	11	9
	110-119	0	0	0	0	0	0	0	0
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		19	45	58	97	96	118	433

最高血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。 (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)	
								20歳以上	40-74歳	
男性	90mmHg未満	1	0	0	0	0	0	1	0	
	90-99	1	0	0	0	0	1	2	0	
	100-109	5	6	5	2	5	2	25	12	
	110-119	7	13	11	7	12	7	57	34	
	120-129	3	8	11	16	18	15	71	51	
	130-139	2	1	7	14	17	25	66	50	
	140-149	1	2	4	6	15	28	56	33	
	150-159	0	0	0	7	6	13	26	19	
	160-169	2	0	0	2	2	4	10	5	
	170-179	0	0	0	0	2	3	5	2	
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数		22	30	38	54	77	98	319	206
	女性	90mmHg未満	0	0	0	0	1	0	1	1
90-99		6	12	3	3	0	1	25	7	
100-109		6	19	20	13	7	4	69	40	
110-119		7	7	14	24	15	6	73	55	
120-129		0	7	14	17	24	26	88	62	
130-139		0	0	4	16	26	33	79	57	
140-149		0	0	3	13	15	21	52	41	
150-159		0	0	0	9	2	16	27	18	
160-169		0	0	0	0	4	7	11	6	
170-179		0	0	0	2	1	4	7	4	
180mmHg以上		0	0	0	0	1	0	1	1	
総数			19	45	58	97	96	118	433	292

血圧の分布（20歳以上）

最低血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。 (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)
								20歳以上	40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	0	0	0	1	0
	50-59	3	0	0	0	0	1	4	0
	60-69	6	5	2	1	8	5	27	13
	70-79	3	13	13	9	18	18	74	49
	80-89	7	12	15	23	14	11	82	59
	90-99	1	0	5	9	10	7	32	28
	100-109	1	0	1	1	0	1	4	2
	110-119	0	0	0	0	1	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		22	30	36	43	51	43	225
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	2	4	2	0	1	0	9	3
	60-69	13	25	13	17	7	13	88	39
	70-79	4	14	25	34	26	14	117	89
	80-89	0	0	15	20	22	19	76	64
	90-99	0	2	1	9	5	8	25	19
	100-109	0	0	0	4	2	1	7	7
	110-119	0	0	0	0	0	0	0	0
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		19	45	56	84	63	55	322

最高血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。 (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)	
								20歳以上	40-74歳	
男性	90mmHg未満	1	0	0	0	0	0	1	0	
	90-99	1	0	0	0	0	1	2	0	
	100-109	5	6	5	2	4	1	23	11	
	110-119	7	13	10	7	9	5	51	30	
	120-129	3	8	11	14	12	7	55	39	
	130-139	2	1	7	10	13	10	43	38	
	140-149	1	2	3	5	6	12	29	18	
	150-159	0	0	0	3	5	4	12	11	
	160-169	2	0	0	2	1	2	7	4	
	170-179	0	0	0	0	1	1	2	1	
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数		22	30	36	43	51	43	225	152
	女性	90mmHg未満	0	0	0	0	1	0	1	1
90-99		6	12	3	3	0	1	25	7	
100-109		6	19	20	13	7	3	68	40	
110-119		7	7	14	24	12	4	68	51	
120-129		0	7	12	15	18	12	64	48	
130-139		0	0	4	11	16	16	47	37	
140-149		0	0	3	10	5	6	24	21	
150-159		0	0	0	6	1	7	14	9	
160-169		0	0	0	0	2	5	7	4	
170-179		0	0	0	2	1	1	4	3	
180mmHg以上		0	0	0	0	0	0	0	0	
総数			19	45	56	84	63	55	322	221

血圧の状況（各分類に該当する人）			※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。							(人)
性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧	
男性	20-29歳	22	12	5	4	0	1	0	2	
	30-39歳	30	16	8	5	1	0	0	2	
	40-49歳	38	10	9	13	6	0	0	1	
	50-59歳	54	4	11	23	15	1	0	6	
	60-69歳	77	16	13	29	16	3	0	14	
	70歳以上	98	10	15	32	38	3	0	34	
	(再掲)20歳以上	319	68	61	106	76	8	0	59	
	(再掲)40-74歳	206	34	39	80	48	5	0	30	
女性	20-29歳	19	19	0	0	0	0	0	0	
	30-39歳	45	37	6	0	2	0	0	0	
	40-49歳	58	34	10	10	4	0	0	2	
	50-59歳	97	40	13	22	20	2	0	11	
	60-69歳	96	18	24	36	15	2	1	18	
	70歳以上	118	10	23	44	34	7	0	37	
	(再掲)20歳以上	433	158	76	112	75	11	1	68	
	(再掲)40-74歳	292	95	52	82	56	6	1	46	
総数	20-29歳	41	31	5	4	0	1	0	2	
	30-39歳	75	53	14	5	3	0	0	2	
	40-49歳	96	44	19	23	10	1	0	3	
	50-59歳	151	44	24	45	35	3	0	17	
	60-69歳	173	34	37	65	31	5	1	32	
	70歳以上	216	20	38	76	72	10	0	71	
	(再掲)20歳以上	752	226	137	218	151	19	1	127	
	(再掲)40-74歳	498	129	91	162	104	11	1	76	

血圧の状況（各分類に該当する人）			※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。							(人)
性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧	
男性	20-29歳	22	12	5	4	0	1	0	2	
	30-39歳	30	16	8	5	1	0	0	2	
	40-49歳	36	10	8	13	5	0	0	1	
	50-59歳	43	4	10	18	10	1	0	4	
	60-69歳	51	13	8	19	10	1	0	7	
	70歳以上	43	7	7	13	14	2	0	12	
	(再掲)20歳以上	225	62	46	72	40	5	0	28	
	(再掲)40-74歳	152	31	28	60	30	3	0	17	
女性	20-29歳	19	19	0	0	0	0	0	0	
	30-39歳	45	37	6	0	2	0	0	0	
	40-49歳	56	34	10	10	2	0	0	2	
	50-59歳	84	40	13	15	14	2	0	8	
	60-69歳	63	16	18	20	8	1	0	6	
	70歳以上	55	8	8	23	14	2	0	13	
	(再掲)20歳以上	322	154	55	68	40	5	0	29	
	(再掲)40-74歳	221	92	42	53	30	4	0	20	
総数	20-29歳	41	31	5	4	0	1	0	2	
	30-39歳	75	53	14	5	3	0	0	2	
	40-49歳	92	44	18	23	7	0	0	3	
	50-59歳	127	44	23	33	24	3	0	12	
	60-69歳	114	29	26	39	18	2	0	13	
	70歳以上	98	15	15	36	28	4	0	25	
	(再掲)20歳以上	547	212	101	140	80	10	0	57	
	(再掲)40-74歳	373	123	70	113	80	7	0	37	

糖尿病が強く疑われる者及び可能性を否定できない者の割合

(可能性を否定できない者をHbA1c (JDS) 値が5.5%以上6.1%未満で判定)

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる者」及び 「可能性を否定できない者」		強く疑われる者※1		可能性を否定できない者※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	18	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2
	30-39歳	30	7.4	5.2	0.0	0.0	7.4	5.2
	40-49歳	35	12.8	6.0	1.9	2.0	10.8	5.6
	50-59歳	49	22.8	6.3	13.1	5.3	9.7	4.9
	60-69歳	75	43.3	10.3	35.6	11.1	7.7	3.0
	70歳以上	85	38.8	9.3	14.5	4.4	24.4	9.5
	(再掲)65-74歳	70	39.9	10.5	31.3	10.7	8.6	3.4
	(再掲)75歳以上	52	50.2	11.9	16.0	6.4	34.2	13.2
	(再掲)40-74歳※3	192	26.0	4.9	16.6	4.9	9.4	2.2
	(再掲)40-74歳※4	192	25.6	4.7	16.2	4.7	9.4	2.3
	(再掲)20歳以上※3	292	24.2	4.0	12.2	3.3	12.0	2.9
	(再掲)20歳以上※4	292	21.8	3.7	10.8	3.0	11.1	2.6
女性	20-29歳	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	56	5.6	3.7	2.6	2.6	2.9	2.7
	50-59歳	94	29.1	8.2	4.9	2.2	24.2	8.5
	60-69歳	91	21.9	5.3	3.3	1.7	18.6	4.9
	70歳以上	112	44.2	7.4	8.7	3.4	35.5	8.1
	(再掲)65-74歳	82	35.0	7.7	8.1	3.6	26.9	7.8
	(再掲)75歳以上	72	45.3	9.0	7.6	4.2	37.7	9.7
	(再掲)40-74歳※3	281	22.3	3.7	4.8	1.3	17.5	3.9
	(再掲)40-74歳※4	281	21.6	3.8	4.4	1.2	17.2	4.0
	(再掲)20歳以上※3	413	22.1	3.0	4.3	1.2	17.8	3.3
	(再掲)20歳以上※4	413	17.7	2.6	3.4	0.9	14.3	2.7
総数	20-29歳	34	2.8	2.9	0.0	0.0	2.8	2.9
	30-39歳	74	3.8	2.6	0.0	0.0	3.8	2.6
	40-49歳	91	9.2	4.2	2.3	1.6	6.9	3.1
	50-59歳	143	25.9	4.7	9.0	3.1	16.9	4.9
	60-69歳	166	32.4	5.2	19.2	6.0	13.2	2.8
	70歳以上	197	42.0	5.9	11.1	3.2	30.9	6.3
	(再掲)65-74歳	152	37.5	7.2	20.1	6.8	17.4	4.5
	(再掲)75歳以上	124	47.1	7.3	10.7	4.4	36.4	7.8
	(再掲)40-74歳※3	473	24.1	3.1	10.7	2.7	13.5	2.4
	(再掲)40-74歳※4	473	23.6	3.0	10.4	2.6	13.2	2.4
	(再掲)20歳以上※3	705	23.1	2.6	8.1	1.9	15.0	2.3
	(再掲)20歳以上※4	705	19.8	2.3	7.1	1.7	12.6	1.9

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる者: HbA1c (JDS) 値6.1%以上またはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用している人

※2 可能性を否定できない者: HbA1c (JDS) 値5.5%以上6.1%未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

糖尿病が強く疑われる者及び可能性を否定できない者の割合

(可能性を否定できない者をHbA1c (JDS) 値が5.6%以上6.1%未満で判定)

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる者」及び 「可能性を否定できない者」		強く疑われる者※1		可能性を否定できない者※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	18	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2
	30-39歳	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	35	10.8	5.6	1.9	2.0	8.8	5.2
	50-59歳	49	13.6	5.3	13.1	5.3	0.5	0.5
	60-69歳	75	42.2	10.3	35.6	11.1	6.6	2.8
	70歳以上	85	34.5	9.5	14.5	4.4	20.1	9.8
	(再掲)65-74歳	70	38.3	10.5	31.3	10.7	6.9	3.2
	(再掲)75歳以上	52	43.9	12.7	16.0	6.4	27.9	14.2
	(再掲)40-74歳※3	192	22.5	4.9	16.6	4.9	5.9	1.7
	(再掲)40-74歳※4	192	21.5	4.7	16.2	4.7	5.4	1.6
	(再掲)20歳以上※3	292	20.1	4.0	12.2	3.3	7.9	2.6
	(再掲)20歳以上※4	292	17.6	3.6	10.8	3.0	6.8	2.2
女性	20-29歳	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	56	5.3	3.6	2.6	2.6	2.6	2.7
	50-59歳	94	17.7	4.4	4.9	2.2	12.8	3.7
	60-69歳	91	15.7	3.9	3.3	1.7	12.4	3.4
	70歳以上	112	21.5	4.8	8.7	3.4	12.9	4.5
	(再掲)65-74歳	82	25.5	7.2	8.1	3.6	17.4	6.9
	(再掲)75歳以上	72	16.0	5.0	7.6	4.2	8.4	3.6
	(再掲)40-74歳※3	281	16.3	3.0	4.8	1.3	11.5	2.9
	(再掲)40-74歳※4	281	15.3	2.7	4.4	1.2	10.9	2.6
	(再掲)20歳以上※3	413	12.6	2.1	4.3	1.2	8.3	1.9
	(再掲)20歳以上※4	413	10.5	1.8	3.4	0.9	7.1	1.6
総数	20-29歳	34	2.8	2.9	0.0	0.0	2.8	2.9
	30-39歳	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	91	8.1	4.0	2.3	1.6	5.8	2.9
	50-59歳	143	15.7	3.0	9.0	3.1	6.6	1.7
	60-69歳	166	28.7	5.4	19.2	6.0	9.6	2.2
	70歳以上	197	26.9	5.2	11.1	3.2	15.8	4.9
	(再掲)65-74歳	152	32.1	7.3	20.1	6.8	12.0	3.9
	(再掲)75歳以上	124	26.5	7.2	10.7	4.4	15.8	6.4
	(再掲)40-74歳※3	473	19.4	2.9	10.7	2.7	8.7	1.6
	(再掲)40-74歳※4	473	18.5	2.7	10.4	2.6	8.1	1.4
	(再掲)20歳以上※3	705	16.2	2.4	8.1	1.9	8.1	1.6
	(再掲)20歳以上※4	705	14.0	2.2	7.1	1.7	6.9	1.4

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる者: HbA1c (JDS) 値6.1%以上またはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用している人

※2 可能性を否定できない者: HbA1c (JDS) 値5.6%以上6.1%未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

糖尿病が強く疑われる者及び可能性を否定できない者の割合

(H24国調判定基準)

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる者」及び 「可能性を否定できない者」		強く疑われる者※1		可能性を否定できない者※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	18	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2
	30-39歳	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	35	10.8	5.6	1.9	2.0	8.8	5.2
	50-59歳	49	13.6	5.3	13.1	5.3	0.5	0.5
	60-69歳	75	40.7	10.0	34.8	10.6	5.9	2.8
	70歳以上	85	33.5	9.3	13.4	3.6	20.1	9.8
	(再掲)65-74歳	70	36.2	10.9	29.3	11.0	6.9	3.2
	(再掲)75歳以上	52	42.1	12.5	14.2	4.8	27.9	14.2
	(再掲)40-74歳※3	192	22.0	4.7	16.4	4.7	5.7	1.7
	(再掲)40-74歳※4	192	21.1	4.5	15.9	4.4	5.2	1.6
	(再掲)20歳以上※3	292	19.5	3.9	11.8	3.1	7.7	2.6
	(再掲)20歳以上※4	292	17.2	3.5	10.5	2.8	6.7	2.2
女性	20-29歳	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	56	5.3	3.6	2.6	2.6	2.6	2.7
	50-59歳	94	17.7	4.4	3.6	1.8	14.1	3.7
	60-69歳	91	15.7	3.9	3.3	1.7	12.4	3.4
	70歳以上	112	21.5	4.8	7.3	3.3	14.3	4.5
	(再掲)65-74歳	82	25.5	7.2	8.1	3.6	17.4	6.9
	(再掲)75歳以上	72	16.0	5.0	5.6	3.9	10.4	3.6
	(再掲)40-74歳※3	281	16.3	3.0	4.4	1.3	11.9	2.9
	(再掲)40-74歳※4	281	15.3	2.7	4.0	1.2	11.3	2.6
	(再掲)20歳以上※3	413	12.6	2.1	3.7	1.1	8.9	1.9
	(再掲)20歳以上※4	413	10.5	1.8	2.9	0.8	7.6	1.6
総数	20-29歳	34	2.8	2.9	0.0	0.0	2.8	2.9
	30-39歳	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	91	8.1	4.0	2.3	1.6	5.8	2.9
	50-59歳	143	15.7	3.0	8.4	2.7	7.3	1.7
	60-69歳	166	28.0	5.2	18.8	5.8	9.2	2.2
	70歳以上	197	26.5	5.1	9.8	2.8	16.6	4.9
	(再掲)65-74歳	152	31.1	7.3	19.1	6.6	12.0	3.9
	(再掲)75歳以上	124	25.8	7.0	8.8	3.5	17.0	6.4
	(再掲)40-74歳※3	473	19.1	2.8	10.4	2.6	8.8	1.6
	(再掲)40-74歳※4	473	18.2	2.6	10.0	2.4	8.2	1.4
	(再掲)20歳以上※3	705	15.9	2.3	7.6	1.8	8.3	1.6
	(再掲)20歳以上※4	705	13.8	2.1	6.7	1.6	7.1	1.3

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる者: HbA1c (NGSP) 値6.5%以上または「糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者

※2 可能性を否定できない者: HbA1c (NGSP) 6.0%以上6.5%未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

脂質異常症が疑われる人の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	脂質異常症が疑われる人※1	標準誤差
男性	20-29歳	18	3.3	3.2
	30-39歳	30	8.2	3.4
	40-49歳	35	7.5	4.3
	50-59歳	49	15.0	4.9
	60-69歳	75	24.0	6.8
	70歳以上	86	23.5	4.9
	(再掲)65-74歳	70	24.9	5.8
	(再掲)75歳以上	53	24.0	6.9
	(再掲)40-74歳※2	192	16.7	2.9
	(再掲)40-74歳※3	192	16.4	2.8
	(再掲)20歳以上※2	293	15.0	2.4
	(再掲)20歳以上※3	293	13.8	2.2
	女性	20-29歳	18	0.0
30-39歳		44	0.8	0.8
40-49歳		56	4.8	3.1
50-59歳		94	14.5	5.4
60-69歳		91	18.0	4.2
70歳以上		112	34.7	5.6
(再掲)65-74歳		82	24.0	5.8
(再掲)75歳以上		72	37.2	8.3
(再掲)40-74歳※2		281	15.1	2.7
(再掲)40-74歳※3		281	14.1	2.6
(再掲)20歳以上※2		415	16.3	2.4
(再掲)20歳以上※3		415	12.5	1.9
総数		20-29歳	36	1.7
	30-39歳	74	4.6	2.2
	40-49歳	91	6.2	2.7
	50-59歳	143	14.8	2.9
	60-69歳	166	20.9	4.7
	70歳以上	198	30.1	4.0
	(再掲)65-74歳	152	24.5	4.4
	(再掲)75歳以上	125	32.2	6.1
	(再掲)40-74歳※2	473	15.9	2.1
	(再掲)40-74歳※3	473	15.3	2.0
	(再掲)20歳以上※2	708	15.7	1.7
	(再掲)20歳以上※3	708	13.1	1.5

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 HDLコレステロール40mg/d l 未満またはコレステロールを下げる薬を服用または中性脂肪を下げる薬を服用

※2 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口に合わせるための重み付けをした値。

※3 ※2 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

メタボリックシンドロームが強く疑われる者及び予備群と考えられる者の割合 (HbA1c (JDS)値5.5%以上で判定)

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる※1		予備群※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	18	29.1	13.3	3.3	3.2	25.9	13.3
	30-39歳	30	20.0	7.1	2.1	2.0	17.9	7.1
	40-49歳	35	28.1	10.3	8.5	4.9	19.6	6.7
	50-59歳	49	50.7	8.1	16.0	5.1	34.7	9.1
	60-69歳	75	37.3	7.5	19.9	5.7	17.4	4.8
	70歳以上	85	62.9	7.7	35.2	9.3	27.7	9.7
	(再掲)65-74歳	70	48.6	10.6	22.9	6.3	25.6	10.6
	(再掲)75歳以上	52	62.4	9.4	42.6	12.4	19.7	7.7
	(再掲)40-74歳※3	192	42.0	5.6	16.2	3.1	25.8	4.8
	(再掲)40-74歳※4	192	42.5	5.5	16.0	3.1	26.5	4.7
	(再掲)20歳以上※3	292	40.0	4.3	16.2	3.1	23.8	3.5
	(再掲)20歳以上※4	292	38.6	4.2	14.4	2.8	24.1	3.5
女性	20-29歳	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	44	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8
	40-49歳	56	6.6	5.2	2.6	2.6	3.9	2.8
	50-59歳	94	10.5	3.6	4.0	2.2	6.6	3.1
	60-69歳	89	17.0	5.2	10.6	3.9	6.4	2.5
	70歳以上	112	23.6	4.4	21.8	4.3	1.8	1.3
	(再掲)65-74歳	81	25.5	5.1	20.8	5.1	4.7	2.2
	(再掲)75歳以上	72	21.0	5.3	19.5	5.1	1.5	1.5
	(再掲)40-74歳※3	279	14.4	2.3	9.3	1.6	5.2	1.3
	(再掲)40-74歳※4	279	13.1	2.2	7.7	1.4	5.4	1.4
	(再掲)20歳以上※3	411	12.7	1.9	9.3	1.6	3.3	0.8
	(再掲)20歳以上※4	411	10.0	1.5	6.7	1.2	3.3	0.8
総数	20-29歳	34	15.6	7.4	1.8	1.8	13.9	7.3
	30-39歳	74	10.6	3.9	1.1	1.1	9.5	3.9
	40-49歳	91	17.5	7.0	5.6	3.5	11.9	4.1
	50-59歳	143	30.6	5.1	10.0	2.9	20.6	5.1
	60-69歳	164	27.1	4.7	15.3	3.4	11.9	2.7
	70歳以上	197	39.8	5.9	27.3	5.0	12.5	4.7
	(再掲)65-74歳	151	37.6	5.1	21.9	4.3	15.6	5.3
	(再掲)75歳以上	124	36.5	6.9	28.2	6.8	8.3	3.0
	(再掲)40-74歳※3	471	28.2	3.3	12.7	1.8	15.5	2.5
	(再掲)40-74歳※4	471	28.1	3.3	11.9	1.7	16.1	2.5
	(再掲)20歳以上※3	703	25.9	2.6	12.7	1.8	13.2	1.9
	(再掲)20歳以上※4	703	24.4	2.6	10.6	1.6	13.8	2.0

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

メタボリックシンドロームの疑い判定基準 (H22県民健康・栄養調査及びH21国民健康・栄養調査と同様の判定基準)

※1メタボリックシンドロームが強く疑われる者

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

- ①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用
- ③HbA1c (JDS)値5.5%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用

※2予備群と考えられる者

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記の3項目のうち1項目以上に該当する人

メタボリックシンドロームが強く疑われる者及び予備群と考えられる者の割合 (HbA1c (NGSP)値6.0%以上で判定)

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる※1		予備群※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	18	29.1	13.3	3.3	3.2	25.9	13.3
	30-39歳	30	20.0	7.1	2.1	2.0	17.9	7.1
	40-49歳	35	28.1	10.3	8.5	4.9	19.6	6.7
	50-59歳	49	46.5	8.1	12.2	5.0	34.3	9.4
	60-69歳	75	37.3	7.5	18.8	5.2	18.6	4.9
	70歳以上	85	62.9	7.7	34.7	9.3	28.2	9.7
	(再掲)65-74歳	70	48.6	10.6	21.3	6.0	27.3	10.5
	(再掲)75歳以上	52	62.4	9.4	42.6	12.4	19.7	7.7
	(再掲)40-74歳※3	192	40.9	5.6	14.7	3.0	26.2	4.8
	(再掲)40-74歳※4	192	41.1	5.4	14.3	3.0	26.8	4.7
	(再掲)20歳以上※3	292	39.3	4.3	15.3	3.1	24.0	3.5
	(再掲)20歳以上※4	292	37.8	4.2	13.5	2.7	24.3	3.5
女性	20-29歳	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	44	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8
	40-49歳	56	6.6	5.2	2.6	2.6	3.9	2.8
	50-59歳	94	10.5	3.6	4.0	2.2	6.6	3.1
	60-69歳	89	17.0	5.2	7.2	3.0	9.8	3.6
	70歳以上	112	23.6	4.4	18.4	3.8	5.2	2.4
	(再掲)65-74歳	81	25.5	5.1	16.2	4.8	9.3	3.5
	(再掲)75歳以上	72	21.0	5.3	15.5	4.7	5.4	3.2
	(再掲)40-74歳※3	279	14.4	2.3	7.9	1.6	6.5	1.5
	(再掲)40-74歳※4	279	13.1	2.2	6.5	1.4	6.5	1.5
	(再掲)20歳以上※3	411	12.7	1.9	7.7	1.4	4.9	1.1
	(再掲)20歳以上※4	411	10.0	1.5	5.6	1.1	4.4	1.0
総数	20-29歳	34	15.6	7.4	1.8	1.8	13.9	7.3
	30-39歳	74	10.6	3.9	1.1	1.1	9.5	3.9
	40-49歳	91	17.5	7.0	5.6	3.5	11.9	4.1
	50-59歳	143	28.5	4.9	8.1	2.8	20.4	5.4
	60-69歳	164	27.1	4.7	13.0	3.0	14.2	3.0
	70歳以上	197	39.8	5.9	25.1	5.0	14.7	4.8
	(再掲)65-74歳	151	37.6	5.1	18.9	4.2	18.7	5.1
	(再掲)75歳以上	124	36.5	6.9	25.7	7.0	10.8	3.8
	(再掲)40-74歳※3	471	27.6	3.3	11.3	1.8	16.4	2.6
	(再掲)40-74歳※4	471	27.4	3.3	10.5	1.8	16.9	2.7
	(再掲)20歳以上※3	703	25.5	2.7	11.4	1.7	14.2	2.0
	(再掲)20歳以上※4	703	24.0	2.6	9.5	1.5	14.5	2.1

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

メタボリックシンドロームの疑い判定基準 (H24国民健康・栄養調査と同様の判定基準)

※1メタボリックシンドロームが強く疑われる者

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用

②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用

③HbA1c (NGSP)値6.0%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用

※2予備群と考えられる者

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記の3項目のうち1項目以上に該当する人

血液検査結果

血色素量 (g/d l)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	15.9	1.1	0.3	15.8	15.0	16.6	16	13.0	0.9	0.2	13.3	12.4	13.7
30-39歳	30	15.6	1.0	0.2	15.5	15.0	16.4	44	13.3	1.0	0.1	13.0	13.0	13.8
40-49歳	35	14.9	1.2	0.4	15.2	13.4	15.7	56	12.4	1.9	0.5	12.8	10.4	13.4
50-59歳	49	14.9	1.0	0.2	15.0	14.2	15.5	94	13.4	1.0	0.1	13.4	13.0	14.1
60-69歳	75	14.5	1.1	0.2	14.7	13.5	15.2	91	13.3	0.8	0.1	13.3	12.8	13.8
70歳以上	85	14.1	1.7	0.3	14.4	13.0	15.3	112	13.0	1.2	0.1	13.3	12.3	13.8
(再掲)20歳以上※1	292	14.9	1.4	0.1	15.0	14.0	15.8	413	13.1	1.3	0.1	13.2	12.7	13.8
(再掲)20歳以上※2	292	15.0	1.4	0.1	15.1	14.1	15.9	413	13.1	1.2	0.1	13.2	12.7	13.8
(再掲)40-74歳※1	192	14.7	1.2	0.2	14.9	13.9	15.4	281	13.1	1.4	0.2	13.2	12.6	13.9
(再掲)40-74歳※2	192	14.7	1.2	0.1	14.9	13.9	15.5	281	13.1	1.4	0.2	13.2	12.6	13.9

赤血球数 (万個/ μ l)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	524.5	48.8	15.2	522.1	497.3	539.0	16	452.2	24.8	4.4	448.0	428.0	467.6
30-39歳	30	513.1	29.0	4.4	509.1	489.4	541.1	44	446.7	30.0	5.6	433.9	430.9	469.2
40-49歳	35	492.8	30.4	6.2	484.2	476.1	512.3	56	446.5	32.5	4.5	449.4	424.0	461.0
50-59歳	49	477.4	34.6	5.8	474.1	456.3	497.0	94	448.5	35.0	5.1	445.8	420.9	472.3
60-69歳	75	464.8	32.2	4.5	462.0	443.5	481.4	91	441.4	33.2	4.1	437.5	423.0	465.5
70歳以上	85	450.0	60.1	12.8	459.0	413.3	483.5	112	427.2	43.2	4.1	435.8	411.0	455.8
(再掲)20歳以上※1	292	482.1	48.5	3.9	480.0	458.6	513.0	413	440.6	36.6	1.8	439.0	423.0	463.0
(再掲)20歳以上※2	292	486.5	48.1	4.1	485.5	462.0	518.7	413	443.4	34.6	1.8	439.0	426.0	464.6
(再掲)40-74歳※1	192	474.3	37.8	3.6	476.1	456.5	495.7	281	444.0	34.4	2.2	443.0	422.4	464.7
(再掲)40-74歳※2	192	475.0	37.3	3.5	476.1	457.0	496.9	281	444.9	34.2	2.4	444.0	423.0	464.9

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

ヘマトクリット値 (%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	47.2	3.3	1.0	46.6	45.1	48.4	16	39.5	2.1	0.4	40.2	38.4	41.1
30-39歳	30	45.8	2.5	0.5	46.2	43.9	48.0	44	41.0	2.6	0.4	41.3	39.8	42.0
40-49歳	35	44.9	2.8	0.9	44.8	41.6	46.7	56	38.3	4.0	0.8	39.0	34.4	40.5
50-59歳	49	44.5	2.8	0.4	44.5	42.9	45.9	94	41.4	2.8	0.5	41.5	39.8	43.2
60-69歳	75	43.7	3.0	0.4	43.6	41.8	45.6	91	41.1	2.4	0.3	41.0	39.5	43.0
70歳以上	85	43.0	5.5	1.1	43.4	39.0	47.3	112	40.1	3.7	0.5	40.7	38.0	43.1
(再掲)20歳以上※1	292	44.6	3.8	0.3	44.9	42.1	46.9	413	40.3	3.3	0.3	40.7	38.8	42.3
(再掲)20歳以上※2	292	44.8	3.7	0.3	45.1	42.4	47.2	413	40.3	3.2	0.3	40.7	38.8	42.1
(再掲)40-74歳※1	192	44.2	3.3	0.3	44.4	41.9	46.6	281	40.3	3.4	0.4	40.3	38.8	42.9
(再掲)40-74歳※2	192	44.2	3.2	0.3	44.4	42.1	46.6	281	40.3	3.4	0.4	40.4	38.9	42.9

平均赤血球容積 (MCV) (f1)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	90.1	4.5	1.2	89.6	87.1	92.9	16	87.6	5.1	1.0	88.9	86.9	90.3
30-39歳	30	89.5	4.0	0.8	89.5	86.9	91.0	44	92.0	5.3	1.4	93.9	88.1	95.7
40-49歳	35	91.1	4.3	1.2	91.1	87.2	93.6	56	85.9	8.6	2.3	88.4	78.1	92.6
50-59歳	49	93.3	4.0	0.7	92.3	91.0	95.9	94	92.6	6.6	1.3	92.8	89.1	98.6
60-69歳	75	94.0	3.3	0.5	94.2	92.3	95.3	91	93.3	4.0	0.6	93.0	90.7	96.1
70歳以上	85	95.6	4.6	0.7	95.9	93.1	97.8	112	94.2	5.1	0.6	94.3	91.4	97.1
(再掲)20歳以上※1	292	92.6	4.6	0.4	92.7	89.6	95.5	413	91.7	6.6	0.7	92.6	89.1	96.0
(再掲)20歳以上※2	292	92.3	4.6	0.4	92.3	89.2	95.1	413	91.2	6.6	0.7	91.7	88.7	95.6
(再掲)40-74歳※1	192	93.3	4.2	0.6	93.2	90.7	95.9	281	91.0	7.0	1.0	91.9	88.8	95.8
(再掲)40-74歳※2	192	93.2	4.2	0.6	93.0	90.7	95.8	281	90.9	7.2	1.0	91.9	88.7	95.9

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

平均赤血球血色素量 (MCH) (pg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	30.4	1.5	0.4	30.5	29.3	31.1	16	28.8	2.0	0.3	29.1	28.6	29.7
30-39歳	30	30.3	1.7	0.3	30.0	29.4	31.3	44	29.8	1.7	0.2	30.0	29.2	30.3
40-49歳	35	30.2	2.0	0.6	30.3	27.9	31.7	56	27.8	4.1	1.2	29.3	24.1	30.5
50-59歳	49	31.2	1.4	0.2	30.9	30.2	32.2	94	30.0	2.3	0.3	30.3	29.4	31.2
60-69歳	75	31.3	1.3	0.3	31.0	30.2	32.3	91	30.2	1.5	0.3	30.2	29.4	31.2
70歳以上	85	31.4	2.0	0.3	31.2	30.1	32.4	112	30.6	1.7	0.2	30.8	29.9	31.5
(再掲)20歳以上※1	292	30.9	1.7	0.2	30.7	29.7	31.9	413	29.7	2.5	0.3	30.2	29.2	31.0
(再掲)20歳以上※2	292	30.8	1.7	0.2	30.7	29.7	31.9	413	29.6	2.5	0.2	30.0	29.1	30.9
(再掲)40-74歳※1	192	31.0	1.7	0.3	30.9	29.9	32.1	281	29.5	2.8	0.4	30.1	29.1	31.1
(再掲)40-74歳※2	192	31.0	1.7	0.3	30.9	29.9	32.1	281	29.5	2.9	0.4	30.1	29.1	31.1

平均赤血球血色素濃度 (MCHC) (%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	33.8	0.8	0.2	33.5	33.1	34.4	16	32.8	0.8	0.2	32.8	32.6	33.3
30-39歳	30	33.9	1.0	0.2	33.8	33.1	34.8	44	32.3	1.1	0.3	32.3	31.5	33.3
40-49歳	35	33.2	0.9	0.3	33.2	32.1	34.0	56	32.2	1.9	0.6	32.7	30.7	33.3
50-59歳	49	33.5	0.7	0.1	33.4	32.9	34.1	94	32.4	1.0	0.2	32.2	31.9	33.1
60-69歳	75	33.3	1.1	0.3	33.5	32.6	34.1	91	32.4	1.0	0.2	32.5	31.6	33.1
70歳以上	85	32.8	1.1	0.2	32.8	31.7	33.5	112	32.5	0.8	0.2	32.6	31.9	33.0
(再掲)20歳以上※1	292	33.3	1.0	0.1	33.3	32.6	34.1	413	32.4	1.2	0.2	32.6	31.6	33.2
(再掲)20歳以上※2	292	33.4	1.0	0.1	33.4	32.8	34.1	413	32.4	1.2	0.2	32.6	31.7	33.2
(再掲)40-74歳※1	192	33.2	1.0	0.2	33.3	32.5	34.0	281	32.4	1.3	0.2	32.5	31.8	33.2
(再掲)40-74歳※2	192	33.3	1.0	0.2	33.3	32.5	34.0	281	32.4	1.3	0.2	32.5	31.8	33.2

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

総たんぱく質値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	7.6	0.5	0.1	7.5	7.2	8.0	18	7.5	0.3	0.1	7.4	7.3	7.7
30-39歳	30	7.4	0.3	0.0	7.4	7.2	7.6	44	7.3	0.4	0.1	7.3	7.0	7.5
40-49歳	35	7.2	0.3	0.1	7.2	7.0	7.4	56	7.3	0.3	0.0	7.2	7.1	7.4
50-59歳	49	7.2	0.4	0.1	7.1	6.9	7.4	94	7.3	0.4	0.1	7.2	7.0	7.6
60-69歳	75	7.3	0.3	0.1	7.3	7.1	7.6	91	7.2	0.3	0.1	7.3	7.0	7.4
70歳以上	86	7.2	0.4	0.0	7.2	7.0	7.4	112	7.3	0.4	0.0	7.3	7.1	7.5
(再掲)20歳以上※1	293	7.3	0.4	0.0	7.2	7.1	7.5	415	7.3	0.4	0.0	7.3	7.1	7.5
(再掲)20歳以上※2	293	7.3	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6	415	7.3	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6
(再掲)40-74歳※1	192	7.2	0.4	0.0	7.2	7.0	7.5	281	7.3	0.4	0.0	7.2	7.0	7.5
(再掲)40-74歳※2	192	7.2	0.4	0.0	7.2	7.0	7.5	281	7.3	0.4	0.0	7.2	7.0	7.5

アルブミン値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	4.9	0.3	0.1	4.8	4.6	5.2	18	4.6	0.2	0.1	4.5	4.5	4.9
30-39歳	30	4.8	0.2	0.0	4.8	4.6	5.0	44	4.4	0.3	0.1	4.4	4.2	4.7
40-49歳	35	4.7	0.3	0.1	4.7	4.4	4.9	56	4.4	0.2	0.0	4.3	4.3	4.6
50-59歳	49	4.5	0.3	0.0	4.5	4.4	4.7	94	4.5	0.3	0.0	4.4	4.3	4.6
60-69歳	75	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.8	91	4.4	0.3	0.1	4.4	4.2	4.6
70歳以上	86	4.3	0.3	0.1	4.3	4.1	4.5	112	4.3	0.3	0.0	4.3	4.2	4.5
(再掲)20歳以上※1	293	4.6	0.3	0.0	4.6	4.4	4.8	415	4.4	0.3	0.0	4.4	4.3	4.6
(再掲)20歳以上※2	293	4.6	0.3	0.0	4.6	4.4	4.8	415	4.4	0.3	0.0	4.4	4.3	4.6
(再掲)40-74歳※1	192	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.8	281	4.4	0.3	0.0	4.4	4.3	4.6
(再掲)40-74歳※2	192	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.8	281	4.4	0.3	0.0	4.4	4.3	4.6

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

ヘモグロビンA1c(NGSP値) (%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	5.4	0.3	0.1	5.4	5.2	5.6	16	5.2	0.2	0.0	5.2	5.1	5.3
30-39歳	30	5.4	0.3	0.0	5.5	5.3	5.5	44	5.3	0.2	0.0	5.4	5.2	5.5
40-49歳	35	5.4	0.4	0.1	5.3	5.1	5.6	56	5.4	0.4	0.1	5.4	5.2	5.6
50-59歳	49	5.6	0.8	0.1	5.5	5.3	5.7	94	5.7	0.7	0.1	5.6	5.5	5.8
60-69歳	75	6.1	1.1	0.2	5.7	5.4	7.1	91	5.7	0.4	0.0	5.7	5.6	5.8
70歳以上	85	5.8	0.6	0.1	5.7	5.5	6.0	112	5.8	0.5	0.1	5.7	5.5	5.9
(再掲)20歳以上※1	292	5.6	0.7	0.1	5.5	5.3	5.8	413	5.6	0.5	0.0	5.6	5.3	5.8
(再掲)20歳以上※2	292	5.6	0.7	0.1	5.5	5.3	5.7	413	5.5	0.5	0.0	5.5	5.3	5.7
(再掲)40-74歳※1	192	5.7	0.8	0.1	5.5	5.2	5.8	281	5.7	0.5	0.0	5.6	5.4	5.8
(再掲)40-74歳※2	192	5.7	0.8	0.1	5.5	5.2	5.8	281	5.7	0.5	0.0	5.6	5.4	5.8

ヘモグロビンA1c(NGSP値) (%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	5.4	0.3	0.1	5.4	5.2	5.6	16	5.2	0.2	0.0	5.2	5.0	5.3
30-39歳	30	5.4	0.3	0.0	5.5	5.3	5.5	44	5.3	0.2	0.0	5.4	5.2	5.5
40-49歳	35	5.4	0.4	0.1	5.3	5.1	5.6	56	5.4	0.4	0.1	5.4	5.2	5.6
50-59歳	45	5.5	0.5	0.1	5.5	5.3	5.7	92	5.7	0.7	0.1	5.6	5.5	5.9
60-69歳	63	5.7	1.0	0.1	5.6	5.3	5.8	89	5.7	0.4	0.0	5.7	5.6	5.8
70歳以上	70	5.6	0.4	0.1	5.6	5.4	5.9	106	5.7	0.4	0.0	5.7	5.5	5.9
(再掲)20歳以上※1	261	5.5	0.5	0.0	5.5	5.2	5.7	403	5.6	0.4	0.0	5.6	5.3	5.8
(再掲)20歳以上※2	261	5.5	0.5	0.0	5.5	5.2	5.6	403	5.5	0.5	0.0	5.5	5.3	5.7
(再掲)40-74歳※1	170	5.5	0.6	0.1	5.5	5.1	5.7	275	5.6	0.5	0.0	5.6	5.4	5.8
(再掲)40-74歳※2	170	5.5	0.6	0.1	5.5	5.1	5.7	275	5.6	0.5	0.0	5.6	5.4	5.8

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

ヘモグロビンA1c(JDS値) (%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	5.1	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2	16	4.9	0.1	0.0	4.9	4.7	4.9
30-39歳	30	5.0	0.2	0.0	5.1	4.9	5.1	44	5.0	0.2	0.0	5.0	4.9	5.1
40-49歳	35	5.0	0.4	0.1	4.9	4.7	5.2	56	5.0	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2
50-59歳	49	5.2	0.7	0.1	5.1	4.9	5.3	94	5.3	0.7	0.1	5.2	5.1	5.4
60-69歳	75	5.7	1.1	0.2	5.3	5.0	6.7	91	5.3	0.4	0.0	5.3	5.2	5.4
70歳以上	85	5.4	0.6	0.1	5.3	5.1	5.6	112	5.4	0.5	0.1	5.3	5.1	5.5
(再掲)20歳以上※1	292	5.3	0.7	0.1	5.1	4.9	5.4	413	5.2	0.5	0.0	5.2	4.9	5.4
(再掲)20歳以上※2	292	5.2	0.7	0.1	5.1	4.9	5.3	413	5.2	0.5	0.0	5.1	4.9	5.3
(再掲)40-74歳※1	192	5.3	0.8	0.1	5.1	4.9	5.4	281	5.3	0.5	0.0	5.2	5.0	5.4
(再掲)40-74歳※2	192	5.3	0.8	0.1	5.1	4.9	5.4	281	5.3	0.5	0.0	5.2	5.0	5.4

ヘモグロビンA1c(JDS値) (%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	5.1	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2	16	4.9	0.1	0.0	4.9	4.7	4.9
30-39歳	30	5.0	0.2	0.0	5.1	4.9	5.1	44	5.0	0.2	0.0	5.0	4.9	5.1
40-49歳	35	5.0	0.4	0.1	4.9	4.7	5.2	56	5.0	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2
50-59歳	45	5.1	0.4	0.1	5.0	4.9	5.3	92	5.3	0.7	0.1	5.2	5.1	5.4
60-69歳	63	5.3	1.0	0.1	5.2	4.9	5.4	89	5.3	0.3	0.0	5.3	5.2	5.4
70歳以上	70	5.2	0.3	0.1	5.2	5.0	5.5	106	5.3	0.3	0.0	5.3	5.1	5.5
(再掲)20歳以上※1	261	5.1	0.5	0.0	5.1	4.9	5.3	403	5.2	0.4	0.0	5.2	4.9	5.4
(再掲)20歳以上※2	261	5.1	0.5	0.0	5.1	4.9	5.2	403	5.1	0.4	0.0	5.1	4.9	5.3
(再掲)40-74歳※1	170	5.1	0.6	0.1	5.1	4.8	5.3	275	5.3	0.5	0.0	5.2	5.0	5.4
(再掲)40-74歳※2	170	5.1	0.6	0.1	5.1	4.8	5.3	275	5.2	0.5	0.0	5.2	5.0	5.4

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

血糖値 (mg/dl) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	17	94.6	13.4	3.9	92.0	85.8	103.4	16	94.6	14.2	3.5	90.2	86.8	106.6
30-39歳	30	91.6	10.9	1.8	89.5	85.0	96.0	44	97.4	17.1	5.9	94.0	87.3	103.0
40-49歳	35	97.4	16.8	4.3	92.3	86.8	106.7	56	97.3	13.3	1.8	96.0	88.0	101.9
50-59歳	49	104.3	29.6	4.1	94.2	88.4	103.0	93	112.0	30.8	5.0	101.0	94.0	118.9
60-69歳	74	109.0	57.6	8.2	96.4	85.7	116.0	90	106.5	18.3	2.7	99.5	94.0	120.2
70歳以上	84	118.1	33.7	4.7	106.0	95.0	130.2	112	108.5	23.6	2.8	101.0	94.8	114.5
(再掲)20歳以上※1	289	104.0	34.4	2.5	95.0	88.0	107.6	411	104.2	21.9	1.1	99.0	90.0	112.0
(再掲)20歳以上※2	289	102.6	32.6	2.3	94.0	88.0	106.7	411	103.2	21.9	1.4	98.0	90.0	112.0
(再掲)40-74歳※1	190	105.8	38.9	3.4	95.8	88.0	109.0	279	106.4	23.6	1.9	100.0	93.0	118.2
(再掲)40-74歳※2	190	105.5	38.0	3.3	95.0	88.0	108.7	279	106.4	24.1	2.2	100.0	93.0	118.2

血糖値 (mg/dl) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	17	94.6	13.4	3.9	92.0	85.8	103.4	16	94.6	14.2	3.5	90.2	86.8	106.6
30-39歳	30	91.6	10.9	1.8	89.5	85.0	96.0	44	97.4	17.1	5.9	94.0	87.3	103.0
40-49歳	35	97.4	16.8	4.3	92.3	86.8	106.7	56	97.3	13.3	1.8	96.0	88.0	101.9
50-59歳	45	101.4	23.2	4.1	94.1	88.0	101.6	91	112.1	31.0	5.1	101.0	93.1	119.0
60-69歳	62	112.2	64.3	8.1	99.9	90.0	116.5	88	105.8	16.8	2.6	99.0	94.0	120.2
70歳以上	69	111.9	28.8	4.8	100.0	95.0	129.0	106	105.9	19.6	2.4	100.0	94.0	111.1
(再掲)20歳以上※1	258	101.9	31.9	2.2	95.0	88.0	108.0	401	103.3	20.4	1.1	98.0	90.0	111.0
(再掲)20歳以上※2	258	100.7	29.9	2.1	94.0	88.0	105.0	401	102.6	20.9	1.4	98.0	90.0	112.0
(再掲)40-74歳※1	168	104.8	37.6	3.2	95.6	88.0	107.9	273	105.4	21.8	1.9	99.0	93.0	117.0
(再掲)40-74歳※2	168	104.2	36.3	3.1	95.0	88.0	107.6	273	105.8	23.0	2.3	99.0	92.0	118.1

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

総コレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	220.1	68.0	20.7	193.9	178.5	255.0	18	169.7	22.1	6.1	164.0	156.4	179.8
30-39歳	30	200.2	34.8	6.0	194.5	171.0	224.8	44	185.7	32.1	10.7	195.2	159.3	217.2
40-49歳	35	187.7	28.6	6.3	180.1	170.7	206.5	56	190.0	28.2	5.4	181.0	173.0	209.3
50-59歳	49	202.2	36.7	5.5	197.3	182.5	216.5	94	215.4	33.6	4.0	217.0	196.2	228.0
60-69歳	75	195.1	35.6	3.5	188.0	172.2	217.8	91	212.7	30.9	5.8	207.0	187.0	240.6
70歳以上	86	187.7	33.3	7.4	182.0	171.3	204.3	112	204.0	30.3	2.6	201.0	186.0	217.5
(再掲)20歳以上※1	293	196.4	38.9	3.3	191.0	175.0	216.3	415	199.4	33.1	3.2	197.0	175.0	219.0
(再掲)20歳以上※2	293	198.2	40.9	3.9	192.4	175.4	217.0	415	197.1	33.8	3.7	196.0	172.5	217.8
(再掲)40-74歳※1	192	192.7	33.5	2.9	185.6	175.8	212.0	281	204.7	31.6	2.8	201.0	180.0	226.0
(再掲)40-74歳※2	192	193.6	33.9	2.9	188.0	176.0	212.0	281	205.8	32.3	2.9	203.4	180.0	226.0

総コレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	220.1	68.0	20.7	193.9	178.5	255.0	18	169.7	22.1	6.1	164.0	156.4	179.8
30-39歳	30	200.2	34.8	6.0	194.5	171.0	224.8	44	185.7	32.1	10.7	195.2	159.3	217.2
40-49歳	35	187.7	28.6	6.3	180.1	170.7	206.5	55	190.1	28.2	5.4	181.0	173.0	209.4
50-59歳	45	200.7	37.0	6.0	196.3	182.0	216.2	81	216.9	33.8	4.6	222.1	196.5	230.6
60-69歳	58	197.8	34.6	4.3	188.2	181.0	220.3	71	214.1	30.6	6.6	209.1	196.3	240.8
70歳以上	73	188.8	33.2	8.0	182.0	171.6	204.8	79	207.2	32.2	3.6	207.9	187.0	219.3
(再掲)20歳以上※1	259	198.8	41.0	4.1	192.1	177.0	217.0	348	196.7	34.4	4.1	197.0	171.0	217.8
(再掲)20歳以上※2	259	197.1	38.9	3.5	191.0	175.9	217.0	348	199.5	34.0	3.7	198.0	174.5	220.0
(再掲)40-74歳※1	166	193.0	33.1	3.1	185.2	177.0	212.0	237	205.3	32.1	3.2	203.3	179.0	226.0
(再掲)40-74歳※2	166	193.8	33.5	3.1	188.0	177.4	212.0	237	206.3	32.7	3.2	204.3	180.0	226.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

中性脂肪 (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	145.5	79.3	22.3	118.4	75.3	230.1	18	75.7	35.0	6.8	62.7	45.9	104.7
30-39歳	30	158.9	113.5	18.4	120.1	92.5	159.6	44	81.2	42.3	7.5	68.7	57.6	93.0
40-49歳	35	166.8	97.5	14.0	147.6	111.6	182.0	56	107.5	82.2	11.2	89.0	67.0	106.6
50-59歳	49	185.5	159.7	21.0	133.4	88.9	206.5	94	121.9	68.0	9.7	103.0	73.3	166.2
60-69歳	75	129.3	120.5	16.8	99.2	55.5	155.0	91	125.9	63.4	6.3	109.6	90.8	142.0
70歳以上	86	159.2	86.2	11.9	127.0	100.3	215.3	112	128.5	70.7	10.3	116.8	84.0	158.9
(再掲)20歳以上※1	293	157.4	113.0	8.5	127.1	88.8	182.0	415	112.5	67.8	4.6	97.0	68.0	138.0
(再掲)20歳以上※2	293	158.3	114.5	8.9	127.5	87.6	182.0	415	107.4	65.6	4.2	93.5	64.0	128.0
(再掲)40-74歳※1	192	157.5	123.2	11.0	122.8	86.6	182.0	281	122.2	71.2	5.1	105.0	77.0	144.9
(再掲)40-74歳※2	192	160.2	127.0	11.2	127.0	87.0	182.0	281	120.9	71.3	5.3	103.0	73.8	145.5

中性脂肪 (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	145.5	79.3	22.3	118.4	75.3	230.1	18	75.7	35.0	6.8	62.7	45.9	104.7
30-39歳	30	158.9	113.5	18.4	120.1	92.5	159.6	44	81.2	42.3	7.5	68.7	57.6	90.8
40-49歳	35	166.8	97.5	14.0	147.6	111.6	180.4	55	107.4	82.3	11.2	89.0	67.0	106.3
50-59歳	45	179.3	156.8	21.6	133.6	87.8	203.7	81	118.6	69.7	10.5	100.0	71.3	166.1
60-69歳	58	134.5	132.4	20.7	103.6	53.0	173.1	71	124.1	58.9	6.8	109.8	92.1	141.4
70歳以上	73	154.7	80.0	14.2	127.0	100.0	215.2	79	124.3	69.5	13.0	118.0	77.0	153.4
(再掲)20歳以上※1	259	157.2	112.8	9.1	127.6	89.0	182.0	348	108.5	66.2	4.9	95.1	65.0	135.4
(再掲)20歳以上※2	259	157.8	113.9	9.5	127.6	88.1	182.0	348	103.8	64.1	4.4	89.0	62.0	124.7
(再掲)40-74歳※1	166	158.1	124.0	11.8	125.0	88.0	182.0	237	119.4	70.5	5.6	100.4	73.9	141.7
(再掲)40-74歳※2	166	160.3	127.3	12.0	127.0	88.1	182.0	237	118.2	71.0	5.8	97.0	73.4	143.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

HDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	52.8	9.2	2.3	51.1	46.4	61.0	18	64.8	11.5	2.8	64.1	56.3	71.9
30-39歳	30	54.7	10.4	1.6	56.0	48.0	62.8	44	71.9	16.1	5.0	67.0	63.0	90.5
40-49歳	35	57.8	11.9	2.4	56.9	51.7	64.4	56	64.1	13.9	1.9	66.3	57.0	70.0
50-59歳	49	54.7	12.3	1.8	57.3	44.0	61.0	94	65.9	14.5	1.3	66.0	57.0	74.9
60-69歳	75	59.7	15.3	2.6	57.1	47.6	72.0	91	66.1	14.3	2.4	69.1	55.0	74.0
70歳以上	86	51.6	11.6	1.4	49.9	45.8	57.0	112	60.2	14.3	2.7	58.0	49.8	71.0
(再掲)20歳以上※1	293	55.4	12.4	1.0	56.0	46.0	63.0	415	64.7	14.7	1.7	64.0	54.0	74.0
(再掲)20歳以上※2	293	55.2	12.1	1.0	56.0	46.0	63.0	415	65.6	14.6	1.7	64.0	56.0	74.0
(再掲)40-74歳※1	192	56.9	13.4	1.4	57.0	47.0	64.0	281	64.1	14.0	1.1	64.0	54.0	72.0
(再掲)40-74歳※2	192	56.8	13.3	1.3	57.0	47.0	64.0	281	64.6	14.1	1.1	65.0	55.0	72.0

HDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	52.8	9.2	2.3	51.1	46.4	61.0	18	64.8	11.5	2.8	64.1	56.3	71.9
30-39歳	30	54.7	10.4	1.6	56.0	47.4	62.8	44	71.9	16.1	5.0	67.0	63.0	90.8
40-49歳	35	57.8	11.9	2.4	56.9	51.7	64.4	55	64.1	14.0	1.9	66.7	57.1	70.0
50-59歳	45	54.9	11.8	1.8	57.8	44.0	61.0	81	67.3	14.4	1.2	68.0	60.2	75.0
60-69歳	58	60.5	15.3	3.0	57.4	49.0	70.8	71	66.3	14.2	2.5	70.0	55.0	74.0
70歳以上	73	52.0	11.1	1.6	50.0	46.0	57.0	79	59.7	15.2	3.6	57.0	48.4	74.6
(再掲)20歳以上※1	259	55.5	12.1	1.1	56.0	47.0	62.8	348	65.2	14.9	1.8	64.0	55.0	74.0
(再掲)20歳以上※2	259	55.4	11.9	1.0	56.0	47.0	62.0	348	66.1	14.7	1.7	65.0	57.0	74.0
(再掲)40-74歳※1	166	57.2	13.1	1.5	57.2	47.4	64.0	237	64.6	14.1	1.1	66.0	55.0	73.0
(再掲)40-74歳※2	166	57.0	13.0	1.4	58.0	47.2	63.1	237	65.1	14.2	1.0	67.0	56.0	73.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

LDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	144.4	60.3	18.6	126.8	101.0	152.5	18	91.2	19.1	4.9	87.6	77.9	100.9
30-39歳	30	122.0	28.6	4.6	119.5	97.3	144.2	44	97.4	27.0	8.4	100.0	78.0	109.1
40-49歳	35	106.8	24.9	5.1	100.8	92.3	122.2	56	108.7	27.9	5.0	98.0	88.5	130.0
50-59歳	47	117.1	29.9	4.5	114.8	102.9	124.0	93	129.0	30.8	3.2	129.4	112.0	144.9
60-69歳	68	121.1	32.9	4.1	123.0	101.7	138.9	88	117.9	27.8	4.9	113.0	98.0	137.0
70歳以上	79	110.6	31.1	7.9	104.0	92.4	126.0	108	119.9	29.6	2.6	118.6	101.7	132.0
(再掲)20歳以上※1	277	118.0	34.8	3.2	113.0	100.0	136.0	407	113.4	30.2	2.7	110.0	92.0	132.0
(再掲)20歳以上※2	277	119.7	36.6	3.7	114.7	100.9	136.3	407	111.2	30.3	3.0	109.0	89.3	132.0
(再掲)40-74歳※1	180	113.0	29.2	2.9	107.0	100.9	132.8	276	117.7	29.0	2.4	117.0	95.0	134.0
(再掲)40-74歳※2	180	113.4	29.3	2.8	108.0	101.0	132.5	276	118.8	29.6	2.5	119.0	96.0	134.0

LDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	144.4	60.3	18.6	126.8	101.0	152.5	18	91.2	19.1	4.9	87.6	77.9	100.9
30-39歳	30	122.0	28.6	4.6	119.5	97.3	144.2	44	97.4	27.0	8.4	100.0	78.0	109.1
40-49歳	35	106.8	24.9	5.1	101.0	92.3	122.2	55	108.8	27.9	5.0	98.0	88.5	130.0
50-59歳	45	116.6	29.9	4.6	114.1	102.8	124.0	81	129.2	30.4	3.6	131.2	115.8	144.0
60-69歳	58	121.3	33.3	4.7	123.4	102.4	138.7	71	118.3	28.4	5.7	117.3	98.0	136.6
70歳以上	73	111.0	31.2	8.3	104.0	93.0	126.4	79	124.0	30.8	3.6	119.4	106.1	135.8
(再掲)20歳以上※1	259	118.1	35.0	3.3	112.9	100.0	136.0	348	113.4	30.8	3.0	110.0	91.0	132.5
(再掲)20歳以上※2	259	119.8	36.8	3.8	114.9	100.4	136.2	348	110.8	30.6	3.3	108.3	89.0	132.0
(再掲)40-74歳※1	166	112.9	29.0	2.9	106.2	100.6	132.5	237	118.0	29.4	2.7	119.0	95.0	134.0
(再掲)40-74歳※2	166	113.3	29.1	2.8	107.0	101.0	132.2	237	118.9	29.8	2.8	119.0	96.3	134.2

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

クレアチニン (mg/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	0.9	0.1	0.0	0.8	0.8	1.0	18	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.6
30-39歳	30	0.9	0.1	0.0	0.9	0.8	0.9	44	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.6
40-49歳	35	0.9	0.1	0.0	0.9	0.8	0.9	56	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
50-59歳	49	0.8	0.1	0.0	0.8	0.8	0.9	94	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
60-69歳	75	1.1	0.6	0.1	0.9	0.8	1.1	91	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
70歳以上	86	0.9	0.2	0.0	0.9	0.8	1.0	112	0.7	0.2	0.0	0.6	0.6	0.7
(再掲)20歳以上※1	293	0.9	0.3	0.0	0.9	0.8	0.9	415	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
(再掲)20歳以上※2	293	0.9	0.3	0.0	0.9	0.8	0.9	415	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
(再掲)40-74歳※1	192	0.9	0.4	0.0	0.9	0.8	0.9	281	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
(再掲)40-74歳※2	192	0.9	0.4	0.0	0.9	0.8	0.9	281	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7

推算GFR (ml/min/1.73m²)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	92.7	14.6	4.0	97.0	77.5	104.3	18	104.0	14.0	4.3	102.1	92.8	116.1
30-39歳	30	84.0	11.2	2.2	81.7	76.5	91.7	44	96.4	19.1	6.5	92.7	83.4	105.3
40-49歳	35	79.6	10.6	1.9	74.6	73.7	86.3	56	82.8	12.6	1.6	84.6	74.1	87.9
50-59歳	49	77.5	11.8	1.6	75.7	69.9	83.3	94	77.0	14.9	2.3	76.7	66.8	83.3
60-69歳	75	63.8	20.1	5.2	67.2	54.7	76.6	91	77.3	14.4	2.5	77.4	67.9	83.1
70歳以上	86	65.7	13.7	1.6	64.8	58.6	72.5	112	66.8	13.3	1.4	66.6	59.3	74.9
(再掲)20歳以上※1	293	75.1	17.0	1.8	74.9	66.6	83.4	415	80.1	18.8	1.9	77.8	66.7	88.7
(再掲)20歳以上※2	293	76.8	16.9	1.8	75.6	68.3	86.3	415	83.6	19.3	2.2	81.5	68.8	92.7
(再掲)40-74歳※1	192	72.2	16.3	2.4	74.2	64.8	79.7	281	77.2	14.5	1.3	77.4	67.8	85.3
(再掲)40-74歳※2	192	72.8	16.0	2.3	74.3	65.4	79.9	281	77.8	14.5	1.4	77.4	67.8	85.4

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

血清鉄

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	77.3	20.8	5.1	70.4	65.3	81.9	18	63.0	26.4	8.5	69.3	32.1	85.6
30-39歳	30	77.2	26.2	5.5	73.0	58.5	96.6	44	60.3	36.2	10.8	65.2	38.7	72.7
40-49歳	35	84.5	26.1	5.8	87.9	68.0	96.0	56	61.0	33.8	7.2	61.0	27.4	79.1
50-59歳	49	96.1	31.3	5.3	92.0	73.9	121.8	94	75.5	24.3	3.5	76.0	56.9	90.3
60-69歳	75	90.4	27.5	4.7	84.1	69.0	105.3	91	72.2	25.7	3.0	65.0	52.5	86.4
70歳以上	86	80.9	23.6	3.1	76.0	66.6	94.0	112	71.2	22.1	1.9	73.0	54.0	83.0
(再掲)20歳以上※1	293	84.7	26.8	2.3	79.0	68.0	99.0	415	68.1	28.1	2.9	69.0	52.0	84.0
(再掲)20歳以上※2	293	84.5	26.9	2.3	79.0	68.0	99.0	415	67.4	28.9	3.4	68.0	51.0	86.0
(再掲)40-74歳※1	192	89.0	28.3	3.1	85.0	68.4	102.6	281	69.5	28.2	2.6	66.0	51.0	88.4
(再掲)40-74歳※2	192	89.6	28.6	3.2	86.0	68.5	103.0	281	69.9	28.2	2.7	67.0	51.6	88.7

TIBC

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	332.1	42.8	11.3	333.0	286.0	371.8	18	368.9	37.5	8.0	368.7	349.7	396.0
30-39歳	30	338.6	53.0	10.6	332.0	296.7	378.7	44	347.1	46.5	11.1	336.9	313.7	367.2
40-49歳	35	339.0	37.8	8.8	343.1	313.4	363.9	56	362.5	41.2	8.7	365.6	325.3	400.4
50-59歳	49	333.4	38.7	5.9	327.5	303.2	350.7	94	330.5	44.7	7.3	330.4	301.4	351.0
60-69歳	75	342.0	53.1	14.8	319.2	300.8	377.1	91	327.6	40.7	4.7	327.0	302.0	337.0
70歳以上	86	296.9	60.3	10.9	301.5	277.9	330.1	112	323.4	55.4	7.6	317.5	288.0	353.7
(再掲)20歳以上※1	293	328.4	52.0	4.9	327.0	297.0	365.0	415	338.7	49.3	4.2	333.0	306.0	367.0
(再掲)20歳以上※2	293	329.9	50.5	4.4	329.0	297.0	365.0	415	342.5	47.9	4.1	337.0	309.0	369.1
(再掲)40-74歳※1	192	333.2	45.0	6.0	327.0	303.0	362.5	281	338.5	44.5	4.3	333.0	309.0	364.5
(再掲)40-74歳※2	192	333.6	44.3	5.6	327.3	303.0	362.0	281	338.7	44.8	4.6	333.0	309.0	365.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

GOT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	26.8	12.8	3.6	23.0	18.0	28.7	18	17.9	3.6	0.6	18.0	15.5	19.7
30-39歳	30	22.7	8.8	1.8	20.0	18.0	26.0	44	16.5	3.7	1.1	16.0	14.2	19.0
40-49歳	35	24.8	11.0	1.5	23.2	18.0	27.4	56	18.8	4.8	0.9	17.0	16.0	21.0
50-59歳	49	22.8	9.2	1.0	22.0	19.8	24.0	94	21.7	4.1	0.4	22.0	19.0	23.0
60-69歳	75	24.6	8.2	1.0	23.0	20.0	26.7	91	24.1	6.7	1.2	22.0	20.0	27.0
70歳以上	86	26.8	22.0	2.1	24.3	19.0	30.2	112	24.3	5.6	0.7	24.0	20.0	26.0
(再掲)20歳以上※1	293	24.8	13.6	0.8	23.0	19.0	27.0	415	21.4	5.9	0.5	20.0	17.0	24.0
(再掲)20歳以上※2	293	24.7	13.0	0.9	22.0	19.0	26.0	415	20.6	5.7	0.5	20.0	17.0	23.0
(再掲)40-74歳※1	192	25.0	15.5	1.0	23.0	20.0	26.0	281	21.7	5.6	0.6	21.0	18.0	24.0
(再掲)40-74歳※2	192	24.8	14.7	0.9	23.0	20.0	26.0	281	21.6	5.5	0.5	21.0	18.0	24.0

GPT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	40.9	40.1	12.2	25.2	14.0	48.0	18	13.4	5.2	1.2	12.0	10.0	14.9
30-39歳	30	32.4	28.7	5.2	21.2	15.7	48.0	44	13.3	5.7	1.3	10.6	9.0	15.0
40-49歳	35	28.4	18.0	4.8	25.0	18.0	27.4	56	16.5	8.8	1.6	14.0	11.0	18.0
50-59歳	49	22.8	10.4	1.6	21.5	18.0	26.0	94	19.9	7.4	0.8	19.0	15.0	22.0
60-69歳	75	21.8	11.0	1.6	19.0	17.0	24.0	91	21.0	10.4	1.7	18.0	14.0	27.0
70歳以上	86	22.3	11.1	1.5	21.0	16.0	28.0	112	18.8	7.6	0.9	17.0	14.0	21.0
(再掲)20歳以上※1	293	26.9	21.1	2.0	21.2	17.0	28.0	415	17.7	8.4	0.7	16.0	12.0	21.0
(再掲)20歳以上※2	293	27.9	23.0	2.5	21.8	16.0	28.0	415	17.2	8.2	0.7	15.0	12.0	20.0
(再掲)40-74歳※1	192	24.4	14.0	1.8	22.0	17.0	26.0	281	19.0	8.9	0.9	17.0	13.0	22.8
(再掲)40-74歳※2	192	24.3	13.8	1.7	22.0	17.0	26.0	281	19.1	8.9	0.8	17.0	13.0	22.6

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

γGTP

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	38.6	33.2	10.0	24.3	14.6	56.2	18	15.7	7.1	1.2	16.0	12.0	18.8
30-39歳	30	36.6	30.1	5.3	24.2	19.0	49.1	44	18.7	11.2	2.1	14.0	12.7	20.5
40-49歳	35	49.4	57.5	8.7	28.6	20.0	69.6	56	19.7	13.1	1.6	15.5	13.5	22.4
50-59歳	49	39.8	76.6	7.1	28.0	19.8	37.1	94	31.0	32.8	3.8	19.0	15.0	35.6
60-69歳	75	36.7	25.0	2.7	33.1	22.0	38.6	91	24.8	17.2	2.3	20.0	13.0	31.8
70歳以上	86	42.7	101.0	9.1	29.1	18.0	39.7	112	18.8	9.0	1.1	15.0	13.0	22.0
(再掲)20歳以上※1	293	40.9	64.2	3.4	27.0	20.0	41.0	415	21.4	17.3	1.0	16.0	13.0	23.0
(再掲)20歳以上※2	293	40.6	61.5	3.4	26.0	19.0	40.6	415	21.6	18.4	1.1	16.0	13.0	22.8
(再掲)40-74歳※1	192	43.8	79.2	4.8	29.0	20.0	40.0	281	24.0	21.1	1.4	18.0	14.0	26.0
(再掲)40-74歳※2	192	43.4	77.7	4.6	29.0	20.0	40.0	281	24.9	22.9	1.6	19.0	14.0	26.0

尿酸

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	18	7.2	1.5	0.4	7.2	6.1	7.9	18	4.1	0.7	0.2	4.1	3.5	4.5
30-39歳	30	6.0	1.2	0.2	6.2	5.0	7.0	44	4.1	0.8	0.1	3.9	3.6	4.5
40-49歳	35	6.1	0.7	0.2	6.3	5.6	6.5	56	4.1	0.9	0.2	4.2	3.5	4.6
50-59歳	49	5.8	1.1	0.2	5.8	5.1	6.5	94	4.9	1.0	0.2	4.7	4.3	5.5
60-69歳	75	6.1	1.6	0.4	6.0	5.0	7.3	91	4.5	1.0	0.2	4.4	3.4	5.1
70歳以上	86	6.0	1.2	0.2	5.8	5.3	7.1	112	4.7	1.1	0.1	4.8	3.9	5.3
(再掲)20歳以上※1	293	6.1	1.3	0.1	6.1	5.3	7.1	415	4.5	1.0	0.1	4.4	3.7	5.1
(再掲)20歳以上※2	293	6.2	1.3	0.1	6.1	5.3	7.1	415	4.4	1.0	0.1	4.3	3.7	5.0
(再掲)40-74歳※1	192	6.0	1.2	0.1	5.9	5.3	6.6	281	4.6	1.1	0.1	4.5	3.8	5.1
(再掲)40-74歳※2	192	6.0	1.2	0.1	5.9	5.3	6.5	281	4.6	1.1	0.1	4.5	3.8	5.1

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

服薬の状況

血圧を下げる薬の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	323	95	228
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	2	37
	50-59歳	55	12	43
	60-69歳	78	26	52
	70歳以上	99	55	44
女性	総数	432	112	320
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	2	56
	50-59歳	98	13	85
	60-69歳	97	34	63
	70歳以上	118	63	55

脈の乱れを治す薬の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	322	13	309
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	0	39
	50-59歳	55	1	54
	60-69歳	78	3	75
	70歳以上	98	9	89
女性	総数	432	12	420
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	0	58
	50-59歳	98	1	97
	60-69歳	97	2	95
	70歳以上	118	9	109

インスリン注射または血糖を下げる薬の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	322	34	288
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	1	38
	50-59歳	55	4	51
	60-69歳	78	12	66
	70歳以上	98	17	81
女性	総数	432	14	418
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	0	58
	50-59歳	98	2	96
	60-69歳	97	3	94
	70歳以上	118	9	109

コレステロールを下げる薬の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	321	34	287
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	0	39
	50-59歳	55	5	50
	60-69歳	78	15	63
	70歳以上	97	14	83
女性	総数	432	66	366
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	1	57
	50-59歳	98	13	85
	60-69歳	97	20	77
	70歳以上	118	32	86

中性脂肪を下げる薬の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	321	18	303
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	0	39
	50-59歳	55	4	51
	60-69歳	78	7	71
	70歳以上	97	7	90
女性	総数	432	9	423
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	0	58
	50-59歳	98	1	97
	60-69歳	97	4	93
	70歳以上	118	4	114

貧血治療のための薬（鉄剤）の服用状況（人）

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	321	4	317
	20-29歳	22	0	22
	30-39歳	30	0	30
	40-49歳	39	1	38
	50-59歳	55	0	55
	60-69歳	78	1	77
	70歳以上	97	2	95
女性	総数	432	5	427
	20-29歳	20	0	20
	30-39歳	41	0	41
	40-49歳	58	1	57
	50-59歳	98	2	96
	60-69歳	97	0	97
	70歳以上	118	2	116

注) 妊婦除外

開眼片足立ち時間20秒以上可能な人の割合

(%)

年齢	年齢	人数	割合	標準誤差
男性	40-49歳	38	87.1	7.0
	50-59歳	52	86.5	6.6
	60-69歳	78	85.3	5.7
	70歳以上	95	66.2	7.4
	(再掲)40歳以上※1	263	80.2	4.4
	(再掲)40歳以上※2	263	81.0	4.5
	(再掲)65-74歳	73	83.2	6.4
	(再掲)65-74歳※2	73	83.3	6.4
	(再掲)75歳以上	62	58.4	9.3
	(再掲)75歳以上※2	62	58.4	9.3
女性	40-49歳	55	97.3	2.0
	50-59歳	94	89.1	3.7
	60-69歳	92	88.6	4.4
	70歳以上	113	50.7	6.5
	(再掲)40歳以上※1	354	75.9	3.7
	(再掲)40歳以上※2	354	80.7	3.0
	(再掲)65-74歳	83	75.8	6.6
	(再掲)65-74歳※2	83	77.6	6.2
	(再掲)75歳以上	73	43.8	8.6
	(再掲)75歳以上※2	73	43.8	8.6
総数	40-49歳	93	92.1	4.0
	50-59歳	146	87.8	4.5
	60-69歳	170	87.0	4.2
	70歳以上	208	57.1	5.5
	(再掲)40歳以上※1	617	77.9	3.4
	(再掲)40歳以上※2	617	80.8	3.3
	(再掲)65-74歳	156	79.5	5.9
	(再掲)65-74歳※2	156	80.7	5.7
	(再掲)75歳以上	135	49.5	6.8
	(再掲)75歳以上※2	135	50.7	6.7

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

運動習慣のある人の割合

	年齢	人数	割合	標準誤差	
男性	20-29歳	20	8.6	6.2	
	30-39歳	28	11.2	5.8	
	40-49歳	37	35.8	7.4	
	50-59歳	52	23.0	8.5	
	60-69歳	76	28.9	8.2	
	70歳以上	90	39.8	9.5	
	(再掲)65-74歳	74	22.0	7.5	
	(再掲)75歳以上	55	54.5	10.6	
	(再掲)40-74歳※1	200	28.4	4.3	
	(再掲)40-74歳※2	200	28.1	4.3	
	(再掲)20歳以上※1	303	26.7	3.4	
	(再掲)20歳以上※2	303	24.6	3.2	
	(再掲)20-64歳※1	174	23.4	3.2	
	(再掲)20-64歳※2	174	21.4	3.1	
	(再掲)65歳以上※1	129	33.2	7.6	
	(再掲)65歳以上※2	129	32.9	7.6	
	(再掲)65-79歳※1	104	29.3	7.5	
	(再掲)65-79歳※2	104	29.1	7.5	
	女性	20-29歳	17	0.0	0.0
		30-39歳	46	31.0	21.3
40-49歳		55	16.5	5.6	
50-59歳		91	12.6	3.9	
60-69歳		95	18.7	5.3	
70歳以上		114	44.1	8.6	
(再掲)65-74歳		84	32.6	6.4	
(再掲)75歳以上		74	44.8	11.7	
(再掲)40-74歳※1		281	20.0	2.7	
(再掲)40-74歳※2		281	18.2	2.6	
(再掲)20歳以上※1		418	25.0	3.1	
(再掲)20歳以上※2		418	21.1	3.8	
(再掲)20-64歳※1		260	16.3	5.3	
(再掲)20-64歳※2		260	15.6	5.7	
(再掲)65歳以上※1		158	39.6	6.8	
(再掲)65歳以上※2		158	38.0	6.5	
(再掲)65-79歳※1		130	36.8	7.4	
(再掲)65-79歳※2		130	35.3	7.1	
総数		20-29歳	37	4.4	3.3
		30-39歳	74	20.9	12.4
	40-49歳	92	26.3	4.3	
	50-59歳	143	17.8	4.8	
	60-69歳	171	23.7	5.9	
	70歳以上	204	42.3	6.7	
	(再掲)65-74歳	158	26.6	6.7	
	(再掲)75歳以上	129	48.1	9.1	
	(再掲)40-74歳※1	481	24.3	2.8	
	(再掲)40-74歳※2	481	23.3	2.6	
	(再掲)20歳以上※1	721	25.8	2.6	
	(再掲)20歳以上※2	721	22.8	2.6	
	(再掲)20-64歳※1	434	19.8	3.0	
	(再掲)20-64歳※2	434	18.4	3.2	
	(再掲)65歳以上※1	287	36.7	5.9	
	(再掲)65歳以上※2	287	35.3	6.0	
	(再掲)65-79歳※1	234	33.4	6.1	
	(再掲)65-79歳※2	234	32.0	6.2	

注)

- ・運動習慣があるとは、現在、継続的に「実施頻度週2日以上」「持続時間30分以上」「継続期間1年以上」の3項目全てに該当する場合。
- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

歩行数

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	15 - 19歳	20	11,895	9,204	2,845	841	1,250	2,031	4,033	9,923	16,449	26,022	30,329	30,720
	20 - 29歳	35	8,032	5,190	996	276	1,645	2,606	3,306	7,734	11,457	17,904	19,880	20,405
	30 - 39歳	56	7,614	3,931	487	150	1,048	1,897	5,288	6,956	10,095	13,096	13,985	20,780
	40 - 49歳	83	7,124	3,817	535	430	1,868	2,295	4,012	6,877	9,604	12,816	13,582	17,303
	50 - 59歳	88	7,182	3,610	390	965	1,989	2,960	4,560	6,754	9,264	11,641	14,542	26,861
	60 - 69歳	112	6,268	4,263	501	476	850	1,471	3,211	5,462	7,752	13,132	15,719	17,861
	70歳以上	132	5,050	3,446	332	220	310	912	2,566	4,554	7,051	9,093	12,127	16,697
	(再掲)40 - 74歳※1	329	6,802	3,869	298	479	1,500	2,229	4,092	6,488	8,567	12,798	14,825	17,378
	(再掲)40 - 74歳※2	329	6,844	3,848	280	481	1,555	2,318	4,122	6,503	8,611	12,757	14,756	17,388
	(再掲)65歳以上※1	193	5,179	3,595	287	238	480	961	2,589	4,659	7,076	9,102	13,150	16,840
	(再掲)65歳以上※2	193	5,185	3,602	288	240	480	964	2,590	4,678	7,076	9,103	13,151	16,857
	(再掲)15歳以上※1	526	7,001	4,709	251	272	1,036	1,989	3,682	6,311	9,107	13,120	15,484	20,840
	(再掲)15歳以上※2	526	6,861	4,143	266	270	1,236	2,049	3,835	6,374	8,939	12,917	14,559	19,959
	(再掲)20歳以上※1	506	6,681	4,084	248	268	1,013	1,849	3,644	6,207	8,625	12,816	14,066	18,979
	(再掲)20歳以上※2	506	6,861	4,143	266	270	1,236	2,046	3,835	6,375	8,939	12,917	14,564	19,932
	(再掲)20 - 64歳※1	313	7,430	4,111	291	331	1,656	2,625	4,432	6,844	9,577	13,108	15,034	19,728
	(再掲)20 - 64歳※2	313	7,473	4,162	316	271	1,658	2,673	4,435	6,948	9,574	13,114	15,096	19,972
	(再掲)65-79歳※1	148	5,677	3,716	385	309	549	1,201	2,998	5,216	7,514	10,177	13,515	17,101
	(再掲)65 - 79歳※2	148	5,671	3,721	385	309	547	1,174	2,995	5,215	7,494	10,180	13,529	17,104
	女性	15 - 19歳	37	8,149	4,674	1,077	2,637	2,637	3,847	5,307	6,912	10,277	16,101	19,633
20 - 29歳		28	7,536	3,561	907	1,359	1,366	2,893	4,658	7,444	9,527	12,058	15,194	16,512
30 - 39歳		63	6,793	3,049	447	1,431	2,284	3,622	4,937	5,873	8,710	10,345	13,929	14,761
40 - 49歳		101	6,704	3,840	474	606	1,630	2,508	3,861	6,013	8,830	11,611	15,293	18,514
50 - 59歳		119	6,756	3,707	437	825	1,504	2,599	4,329	6,394	8,275	10,763	15,258	19,548
60 - 69歳		122	5,892	3,011	295	1,466	1,902	2,477	3,613	5,002	7,739	10,268	12,073	14,979
70歳以上		151	4,297	2,826	221	100	511	1,231	2,126	3,738	6,512	8,625	9,248	12,781
(再掲)40 - 74歳※1		400	6,234	3,440	207	1,131	1,803	2,396	3,682	5,729	8,080	10,450	12,610	18,393
(再掲)40 - 74歳※2		400	6,346	3,504	223	1,103	1,791	2,400	3,762	5,799	8,139	10,630	12,725	18,544
(再掲)65歳以上※1		212	4,730	2,959	206	161	686	1,275	2,392	4,381	6,614	8,882	10,295	12,803
(再掲)65歳以上※2		212	4,867	2,988	221	170	722	1,439	2,400	4,580	6,718	8,965	10,780	12,832
(再掲)15歳以上※1		621	6,068	3,556	173	325	1,359	2,092	3,546	5,490	8,113	10,249	12,764	18,178
(再掲)15歳以上※2		621	6,304	3,485	214	511	1,459	2,192	3,848	5,814	8,500	10,350	13,178	17,690
(再掲)20歳以上※1		584	5,949	3,448	183	321	1,355	1,985	3,396	5,427	8,003	10,036	12,386	16,953
(再掲)20歳以上※2		584	6,304	3,485	214	511	1,460	2,192	3,848	5,815	8,500	10,351	13,179	17,716
(再掲)20 - 64歳※1		372	6,731	3,515	252	1,240	2,008	2,628	4,419	6,158	8,737	10,836	14,005	18,375
(再掲)20 - 64歳※2		372	6,814	3,509	270	1,278	1,967	2,651	4,583	6,248	8,802	10,841	14,032	18,390
(再掲)65-79歳※1		168	5,354	2,925	221	105	1,466	1,994	3,119	4,937	7,190	9,269	11,360	12,868
(再掲)65 - 79歳※2		168	5,445	2,941	235	137	1,478	2,039	3,330	4,939	7,210	9,348	11,718	12,936

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
総数	15 - 19歳	57	10,069	7,494	1,452	841	2,018	2,457	5,063	7,914	13,218	20,671	26,177	30,720
	20 - 29歳	63	7,791	4,447	458	325	1,588	2,671	4,453	7,558	9,675	13,557	18,186	20,405
	30 - 39歳	119	7,212	3,537	405	150	1,605	2,990	5,000	6,497	9,235	12,917	13,994	18,773
	40 - 49歳	184	6,917	3,825	384	651	1,725	2,357	3,932	6,527	9,408	12,418	14,661	18,219
	50 - 59歳	209	6,969	3,657	316	1,006	1,824	2,737	4,521	6,561	8,546	11,330	14,561	19,191
	60 - 69歳	234	6,077	3,677	304	476	1,451	2,202	3,443	5,349	7,741	11,694	13,617	17,184
	70歳以上	283	4,608	3,114	215	187	502	975	2,169	4,154	6,575	8,649	10,081	14,435
	(再掲)40 - 74歳※1	729	6,510	3,663	211	768	1,625	2,361	3,805	5,930	8,482	11,534	13,498	17,732
	(再掲)40 - 74歳※2	729	6,595	3,687	211	796	1,636	2,385	3,971	6,052	8,499	11,694	13,548	18,373
	(再掲)65歳以上※1	405	4,927	3,258	193	214	667	1,223	2,400	4,563	6,725	8,888	11,236	15,822
	(再掲)65歳以上※2	405	5,027	3,313	201	216	668	1,220	2,476	4,615	6,790	8,976	11,725	16,183
	(再掲)15歳以上※1	1,149	6,517	4,176	176	308	1,287	2,007	3,587	5,808	8,520	11,967	14,062	19,902
	(再掲)15歳以上※2	1,149	6,583	3,837	193	309	1,369	2,129	3,840	5,999	8,625	11,969	13,906	18,608
	(再掲)20歳以上※1	1,092	6,300	3,782	182	299	1,247	1,908	3,523	5,743	8,417	11,180	13,496	18,377
	(再掲)20歳以上※2	1,092	6,583	3,837	193	309	1,369	2,129	3,840	5,999	8,624	11,970	13,916	18,616
	(再掲)20 - 64歳※1	687	7,082	3,839	232	830	1,716	2,628	4,435	6,525	9,221	12,531	14,094	18,871
	(再掲)20 - 64歳※2	687	7,142	3,860	232	844	1,690	2,658	4,526	6,554	9,229	12,672	14,144	19,166
	(再掲)65-79歳※1	316	5,496	3,296	235	308	986	1,571	3,031	5,082	7,293	9,345	12,081	16,552
(再掲)65 - 79歳※2	316	5,558	3,351	244	309	981	1,566	3,122	5,085	7,380	9,533	12,106	16,617	

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

習慣的歩行数の分布（15歳以上）

歩行数

性別	年齢区分	人数	平均	標準偏差	パーセンタイル									8,000歩 未満	10,000歩 以上
					1%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	99%		
男性	15-19歳	20	37	6,828	1,384	1,445	2,615	5,789	10,162	15,074	19,125	28,325	28,807	35.0%	50.0%
	20-29歳	35	28	4,847	617	1,702	2,653	4,552	8,209	10,724	17,410	19,018	19,281	45.7%	28.6%
	30-39歳	56	63	3,699	420	1,997	3,103	5,811	7,687	10,033	12,433	15,060	19,597	53.6%	25.0%
	40-49歳	83	101	3,536	510	1,895	2,561	4,675	7,157	9,465	12,186	14,112	16,364	59.0%	21.7%
	50-59歳	88	119	3,834	1,212	2,396	3,285	4,738	6,819	9,357	13,242	15,533	21,990	61.4%	15.9%
	60-69歳	112	122	3,858	791	1,292	1,922	3,733	5,929	8,048	12,333	15,182	17,374	—	—
	70歳以上	132	151	3,322	279	565	1,065	2,451	4,638	6,912	9,545	12,015	16,887	—	—
	総数	526	621	4,059	538	1,278	2,036	3,915	6,379	8,959	12,337	14,914	18,740	—	—
	(再掲)20-64歳	313	372	3,859	654	2,040	2,853	4,828	7,222	9,658	12,601	15,350	19,149	57.8%	22.2%
	(再掲)65歳以上	193	212	3,455	443	776	1,265	2,818	4,803	7,006	9,770	12,454	17,432	—	—
女性	15-19歳	37	7,950	3,495	3,105	3,881	4,800	5,675	7,051	9,453	13,073	16,194	20,132	64.9%	24.3%
	20-29歳	28	7,186	3,040	1,810	1,815	2,948	5,107	6,992	9,153	10,666	14,109	15,376	60.7%	14.3%
	30-39歳	63	6,805	2,715	1,861	2,735	3,607	5,003	6,260	9,042	9,894	13,001	13,834	69.8%	7.9%
	40-49歳	101	6,606	3,283	1,023	2,000	2,945	4,217	5,904	8,724	10,818	13,541	17,039	73.3%	13.9%
	50-59歳	121	6,977	3,269	1,323	2,273	3,045	5,162	6,576	8,648	10,566	14,109	17,898	66.4%	13.4%
	60-69歳	122	5,994	2,734	1,846	2,269	2,882	3,922	5,365	7,620	10,064	11,399	13,685	—	—
	70歳以上	151	4,339	2,522	362	717	1,293	2,325	3,875	5,939	8,026	8,554	11,746	—	—
	総数	623	6,132	3,106	683	1,787	2,489	3,875	5,734	7,927	9,921	11,949	15,735	—	—
	(再掲)20-64歳	374	6,708	3,090	1,608	2,421	3,057	4,591	6,279	8,559	10,448	12,752	16,627	70.2%	11.5%
	(再掲)65歳以上	212	4,806	2,661	439	954	1,697	2,663	4,689	6,414	8,438	9,923	11,920	—	—

男性: べき数0.5 個人内分散112.377191 個人間分散628.767406 個人内/個人間分散比0.178726

女性: べき数0.5 個人内分散101.022648 個人間分散412.192533 個人内/個人間分散比0.245086