

身体状況調査の結果

肥満とやせの状況(20歳以上)

(%)

性別	年齢区分	人数	肥満(BMI \geq 25)		やせ(BMI<18.5)		普通
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合
男性	20-29歳	18	29.3	13.0	26.3	14.9	44.3
	30-39歳	21	50.8	14.1	0.0	0.0	49.2
	40-49歳	34	32.0	9.9	0.0	0.0	68.0
	50-59歳	35	36.2	9.3	0.0	0.0	63.8
	60-69歳	47	33.8	8.4	0.0	0.0	66.2
	70歳以上	77	22.8	4.5	5.3	2.7	71.9
	(再掲)20歳以上※	232	32.7	3.1	4.1	1.7	63.2
	(再掲)65-74歳	63	34.3	4.7	2.7	2.2	63.0
	(再掲)75歳以上	45	20.1	7.0	5.5	3.5	74.5
	(再掲)40-74歳※	148	32.5	3.7	1.0	0.7	66.5
	(再掲)20-69歳※	155	36.2	4.3	3.7	2.4	60.1
女性	20-29歳	18	13.1	10.3	8.8	6.2	78.0
	30-39歳	29	12.7	6.7	22.9	7.8	64.5
	40-49歳	56	25.0	7.8	2.7	1.6	72.4
	50-59歳	50	10.6	4.9	12.6	5.8	76.8
	60-69歳	52	10.6	3.8	7.9	3.3	81.5
	70歳以上	100	17.4	4.5	9.7	4.3	72.9
	(再掲)20歳以上※	305	15.6	2.5	10.1	2.4	74.2
	(再掲)65-74歳	74	8.3	3.0	8.3	3.7	83.4
	(再掲)75歳以上	58	26.0	6.4	9.4	5.9	64.6
	(再掲)40-74歳※	200	13.1	2.7	8.2	2.6	78.7
	(再掲)20-39歳※	47	12.9	5.9	16.8	5.1	70.3
(再掲)40-69歳※	158	15.5	3.2	7.6	2.5	76.9	
総数	20-29歳	36	21.7	8.5	18.1	8.8	60.2
	30-39歳	50	32.2	9.7	11.2	3.7	56.7
	40-49歳	90	28.6	5.8	1.3	0.8	70.1
	50-59歳	85	23.4	5.5	6.3	3.0	70.3
	60-69歳	99	22.1	4.7	4.0	1.7	73.9
	70歳以上	177	19.7	3.2	7.9	2.5	72.5
	(再掲)20歳以上※	537	23.9	2.3	7.2	1.6	68.9
	(再掲)65-74歳	137	20.9	2.9	5.6	2.1	73.5
	(再掲)75歳以上	103	23.6	4.8	7.8	3.4	68.7
	(再掲)40-74歳※	348	22.6	2.3	4.7	1.3	72.7

低栄養傾向の状況

(%)

性別	年齢区分	人数	低栄養傾向(BMI \leq 20)	
			割合	標準誤差
男性	65歳以上	108	9.5	3.2
女性	65歳以上	132	26.4	5.5
総数	65歳以上	240	18.8	3.1

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ・妊婦を除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR1人口に合わせるための重み付けをした値。

児童・生徒(6～14歳)の肥満の状況(学校保健統計調査方式)

		(人)			
性別		総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
男性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	2	1	1	0
	-20%超 +20%未満	23	8	6	9
	+20%以上 +30%未満	1	1	0	0
	+30%以上 +50%未満	0	0	0	0
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	26	10	7	9
女性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	1	0	0	1
	-20%超 +20%未満	14	2	7	5
	+20%以上 +30%未満	0	0	0	0
	+30%以上 +50%未満	0	0	0	0
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	15	2	7	6
総数	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	3	1	1	1
	-20%超 +20%未満	37	10	13	14
	+20%以上 +30%未満	1	1	0	0
	+30%以上 +50%未満	0	0	0	0
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	41	12	14	15

身長・体重の平均値(男性)

区分	人数	身長(cm)				体重(kg)							
		平均	標準偏差	標準誤差	75%点	25%点	中央値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
1-2歳	6	83.0	7.1	2.8	76.0	83.5	90.5	10.8	2.3	0.9	9.6	10.6	13.1
3-5歳	10	105.6	6.3	1.8	101.1	105.7	109.6	16.1	2.0	0.6	14.6	15.9	18.0
6-8歳	10	122.7	5.5	1.3	118.4	121.7	127.3	23.0	3.5	1.1	20.7	22.0	25.9
9-11歳	7	140.8	7.0	2.5	135.0	140.3	145.2	35.0	9.4	3.4	27.6	30.8	43.0
12-14歳	9	155.3	9.6	2.4	146.5	153.7	164.0	43.1	7.6	1.5	37.0	40.6	50.0
15-19歳	15	170.4	6.4	1.7	163.2	170.3	176.5	60.1	7.3	1.5	53.5	59.5	65.0
20-29歳	18	171.0	4.1	0.8	168.5	170.5	172.6	62.7	12.5	3.4	52.5	57.9	72.6
30-39歳	21	171.8	4.5	1.1	167.7	172.5	174.7	75.5	14.8	3.4	63.1	74.9	84.2
40-49歳	34	171.3	5.4	0.9	167.4	170.9	173.8	68.9	10.6	2.1	61.2	66.2	75.4
50-59歳	35	168.8	6.3	0.9	166.0	168.5	170.8	71.1	11.1	2.2	62.1	66.8	80.7
60-69歳	47	166.7	7.9	1.3	163.7	168.2	171.0	65.9	9.6	2.2	56.4	66.8	73.3
70歳以上	77	164.1	6.2	0.8	159.9	163.0	167.3	62.4	7.5	0.7	56.9	61.8	67.3
(再掲)20歳以上※	232	168.3	6.7	0.5	165.0	168.7	172.5	67.2	11.5	0.9	59.2	65.3	74.7
(再掲)40-74歳※	148	168.4	6.9	0.5	165.7	168.8	172.0	67.8	10.2	1.1	60.7	66.2	73.7
(再掲)65-74歳	63	166.1	8.0	1.0	162.9	166.3	171.1	65.4	9.5	1.2	58.9	66.3	73.3
(再掲)75歳以上	45	162.6	5.4	0.8	159.6	162.1	165.4	60.9	7.4	0.9	56.3	60.8	66.7

注)

・20歳以上の年齢階級は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・20歳未満の年齢階級は単純に集計した値(重み付けなし)を参考として掲載

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のRI人口を基準にした重み付けをして算出した値

身長・体重の平均値(女性)

区分	人数	身長(cm)				体重(kg)							
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
1-2歳	2	79.5	0.7	0.4	79.0	79.5	80.0	9.9	0.6	0.3	9.5	9.9	10.3
3-5歳	8	100.5	5.3	1.8	97.6	102.0	103.9	15.5	1.4	0.5	14.3	16.0	16.7
6-8歳	2	118.8	6.8	3.5	114.0	118.8	123.6	21.1	4.4	2.2	18.0	21.1	24.2
9-11歳	7	136.9	11.3	4.1	130.3	139.0	142.5	30.6	7.0	2.4	26.2	29.2	35.1
12-14歳	6	154.8	4.4	1.6	150.0	155.5	158.2	43.3	6.2	2.1	38.5	44.5	48.5
15-19歳	16	158.1	6.1	1.5	154.4	158.2	161.0	52.2	5.5	1.4	49.3	51.7	57.3
20-29歳	18	158.0	6.2	1.3	154.5	158.5	160.4	53.3	7.9	2.1	47.3	53.7	58.0
30-39歳	31	158.9	4.6	0.8	154.7	158.6	161.8	53.6	10.6	2.1	46.9	51.3	56.4
40-49歳	56	158.2	5.7	0.8	154.2	157.6	161.5	58.2	8.6	1.1	52.6	58.7	62.6
50-59歳	50	158.0	5.4	0.9	154.0	157.8	161.7	53.8	7.7	1.3	47.5	53.6	58.5
60-69歳	52	155.4	5.6	1.1	151.0	156.6	158.6	52.1	7.8	1.1	48.0	51.7	56.3
70歳以上	100	149.3	6.0	0.7	145.1	148.4	154.1	49.1	7.4	1.0	45.0	49.0	52.7
(再掲)20歳以上※	307	154.9	6.9	0.5	149.9	155.7	159.6	52.6	8.6	0.6	47.2	51.9	57.6
(再掲)40-74歳※	200	155.9	5.9	0.4	151.9	156.5	160.0	53.5	8.3	0.6	48.0	52.7	58.0
(再掲)65-74歳	74	151.9	4.5	0.5	148.1	152.0	155.2	50.2	7.1	0.8	46.4	49.3	53.2
(再掲)75歳以上	58	147.7	6.5	1.1	143.2	146.6	151.3	49.2	8.1	1.6	44.6	48.2	53.5

注)

・20歳以上の年齢階級は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・20歳未満の年齢階級は単純に集計した値(重み付けなし)を参考として掲載

・妊婦は除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口を基準にした重み付けをして算出した値

BMIの平均値(男性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	18	21.4	4.0	1.1	18.3	20.2	25.3
30-39歳	21	25.6	4.8	1.2	21.3	24.7	29.4
40-49歳	34	23.4	2.9	0.6	20.9	22.4	25.5
50-59歳	35	24.9	3.5	0.7	22.3	23.8	28.2
60-69歳	47	23.7	3.1	0.6	20.5	23.9	25.8
70歳以上	77	23.2	2.5	0.3	21.6	23.0	24.8
(再掲)20歳以上※	232	23.7	3.5	0.3	21.1	23.3	25.7
(再掲)65-74歳	63	23.7	3.0	0.3	21.6	24.3	25.7
(再掲)75歳以上	45	23.0	2.4	0.4	21.6	23.0	24.3
(再掲)40-74歳※	148	23.9	3.1	0.3	21.4	23.5	25.7
(再掲)20-69歳※	155	23.9	3.8	0.4	20.9	23.5	25.9

BMIの平均値(女性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	18	21.3	2.5	0.8	18.9	21.4	21.8
30-39歳	29	21.1	3.9	0.8	18.6	20.3	22.3
40-49歳	56	23.2	3.1	0.4	20.8	23.4	25.0
50-59歳	50	21.5	2.9	0.5	19.5	20.8	23.1
60-69歳	52	21.6	3.3	0.5	19.2	21.1	22.8
70歳以上	100	22.1	3.4	0.5	19.7	21.5	24.2
(再掲)20歳以上※	305	21.9	3.3	0.3	19.6	21.4	23.7
(再掲)65-74歳	74	21.8	3.0	0.4	20.0	21.1	23.2
(再掲)75歳以上	58	22.6	3.7	0.8	20.0	22.0	25.2
(再掲)40-74歳※	200	22.0	3.1	0.2	19.9	21.5	23.7
(再掲)20-39歳※	47	21.2	3.3	0.5	18.9	20.8	21.8
(再掲)40-69歳※	158	22.2	3.2	0.3	19.9	21.8	23.8

注)

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値。

・妊婦は除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをして算出した値。

高血圧及び正常高値・高値血圧の者の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	高血圧有病者及び 正常高値・高値血圧		高血圧有病者		正常高値・高値血圧	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	18.8	9.6	5.3	5.4	13.5	7.8
	30-39歳	15	29.6	11.2	0.0	0.0	29.6	11.2
	40-49歳	20	56.6	12.3	12.2	8.4	44.4	12.6
	50-59歳	27	67.9	8.7	13.9	7.1	54.0	9.4
	60-69歳	42	81.7	6.3	42.2	4.9	39.6	5.1
	70歳以上	60	90.2	4.8	58.9	8.4	31.2	6.6
	(再掲)20歳以上※	178	63.8	5.5	27.1	4.1	36.7	4.8
	(再掲)65-74歳	55	82.1	7.3	49.2	6.8	32.9	6.8
	(再掲)75歳以上	34	99.3	0.8	63.6	10.1	35.6	10.0
	(再掲)40-74歳※	115	70.4	5.3	28.2	3.9	42.2	5.2
女性	20-29歳	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	25	9.7	6.3	6.9	6.0	2.9	2.7
	40-49歳	40	20.3	8.2	5.2	3.0	15.1	6.9
	50-59歳	36	50.5	8.4	15.9	6.0	34.5	7.1
	60-69歳	40	60.0	8.4	28.3	8.5	31.8	8.0
	70歳以上	75	74.4	6.3	63.1	5.6	11.3	4.1
	(再掲)20歳以上※	233	46.1	3.7	29.4	3.3	16.7	2.4
	(再掲)65-74歳	57	68.2	7.4	56.4	6.8	11.8	4.3
	(再掲)75歳以上	43	77.6	8.3	62.2	7.3	15.5	6.6
	(再掲)40-74歳※	148	49.4	4.1	27.3	3.5	22.1	3.2
総数	20-29歳	31	10.0	5.1	2.8	2.9	7.2	4.0
	30-39歳	40	19.9	5.9	3.3	2.9	16.6	5.9
	40-49歳	60	38.8	8.1	8.8	4.3	30.0	7.8
	50-59歳	63	59.2	7.1	14.9	4.4	44.3	6.4
	60-69歳	82	70.7	5.3	35.1	4.4	35.6	4.9
	70歳以上	135	80.9	4.3	61.4	4.2	19.5	3.4
	(再掲)20歳以上※	411	54.6	3.4	28.3	2.7	26.3	3.0
	(再掲)65-74歳	112	74.9	5.4	52.9	3.8	22.0	4.5
	(再掲)75歳以上	77	86.2	5.3	62.7	6.1	23.5	5.3
	(再掲)40-74歳※	263	59.6	3.1	27.8	2.1	31.9	3.4

注)

・問診項目「血圧を下げる薬の服薬状況」に回答している者を集計対象とした。

・「高血圧症」及び「正常高値・高値血圧」は、高血圧治療ガイドライン2019による血圧の分類で判定。

(正常高値血圧:収縮期血圧120-129mmHgかつ拡張期血圧80mmHg未満、高値血圧:拡張期血圧130-139mmHgまたは拡張期80-89mmHg)

・「高血圧症」は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、または血圧を下げる薬を服用している者とした。

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR1人口に合わせるための重み付けをした値。

(参考)高血圧及び正常高値の者の割合(「高血圧治療ガイドライン2014」による血圧の分類)

(%)

性別	年齢区分	総数	高血圧有病者及び 正常高値血圧		高血圧有病者		正常高値血圧	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	13.8	8.6	5.3	5.4	8.5	6.6
	30-39歳	15	14.4	9.7	0.0	0.0	14.4	9.7
	40-49歳	20	42.2	11.1	12.2	8.4	30.0	10.4
	50-59歳	27	38.2	10.4	13.9	7.1	24.3	8.8
	60-69歳	42	58.5	8.4	42.2	4.9	16.3	6.1
	70歳以上	60	82.5	5.0	58.9	8.4	23.5	6.4
	(再掲)20歳以上※	178	48.0	4.5	27.1	4.1	20.8	3.5
	(再掲)65-74歳	55	72.5	8.5	49.2	6.8	23.3	6.6
	(再掲)75歳以上	34	85.9	5.2	63.6	10.1	22.3	10.0
	(再掲)40-74歳※	115	52.2	4.4	28.2	3.9	23.9	4.3
女性	20-29歳	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	25	9.7	6.3	6.9	6.0	2.9	2.7
	40-49歳	40	18.1	7.5	5.2	3.0	12.9	6.7
	50-59歳	36	40.0	10.0	15.9	6.0	24.1	7.2
	60-69歳	40	43.6	10.5	28.3	8.5	15.3	6.2
	70歳以上	75	69.3	5.5	63.1	5.6	6.2	3.0
	(再掲)20歳以上※	233	39.9	3.5	29.4	3.3	10.5	1.9
	(再掲)65-74歳	57	66.6	7.4	56.4	6.8	10.1	4.2
	(再掲)75歳以上	43	70.1	7.5	62.2	7.3	8.0	4.7
	(再掲)40-74歳※	148	41.5	4.2	27.3	3.5	14.2	2.8
総数	20-29歳	31	7.3	4.5	2.8	2.9	4.5	3.4
	30-39歳	40	12.1	5.6	3.3	2.9	8.8	5.1
	40-49歳	60	30.4	5.9	8.8	4.3	21.6	5.5
	50-59歳	63	39.1	7.4	14.9	4.4	24.2	6.0
	60-69歳	82	50.9	5.4	35.1	4.4	15.8	4.3
	70歳以上	135	74.8	3.4	61.4	4.2	13.4	2.9
	(再掲)20歳以上※	411	43.8	2.8	28.3	2.7	15.5	2.3
	(再掲)65-74歳	112	69.4	5.4	52.9	3.8	16.5	3.8
	(再掲)75歳以上	77	76.4	4.4	62.7	6.1	13.7	4.6
	(再掲)40-74歳※	263	46.7	2.6	27.8	2.1	18.9	2.8

注)

・問診項目「血圧を下げる薬の服薬状況」に回答している者を集計対象とした。

・「高血圧症」及び「正常高値」は高血圧治療ガイドライン2014による血圧の分類で判定。

(正常高値血圧:収縮期血圧130-139mmHgまたは拡張期血圧85-89mmHg)

・「高血圧症」は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、または血圧を下げる薬を服用している者とした。

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR1人口に合わせるための重み付けをした値。

血圧の平均値(20歳以上)

年齢階級	男性					女性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	14	68.1	9.9	3.3	61.9	70.0	73.2	17	60.4	6.1	1.5	56.8	60.0	63.6
30-39歳	15	70.3	7.5	1.9	64.9	68.9	73.7	25	68.1	9.1	1.8	60.0	69.0	72.6
40-49歳	20	80.0	9.5	2.4	71.8	79.7	87.0	40	67.1	8.2	1.5	61.0	65.9	73.0
50-59歳	27	77.5	8.1	1.5	72.0	77.0	83.9	36	75.7	9.7	1.7	68.0	74.8	84.0
60-69歳	42	77.0	9.1	1.6	71.0	77.0	83.0	40	72.9	9.2	1.6	65.0	72.0	81.0
70歳以上	60	74.3	8.8	1.6	69.2	74.0	80.0	75	70.9	9.7	1.3	64.9	70.0	78.0
(再掲)20歳以上※	178	75.2	9.5	1.1	69.0	74.0	82.0	233	70.1	9.8	0.7	62.0	69.0	77.0
(再掲)40-74歳※	115	77.9	9.1	0.9	72.0	77.0	84.5	148	72.2	9.6	0.7	64.7	71.0	79.0
(再掲)40-89歳※	149	76.9	9.1	0.8	71.0	77.0	83.0	191	71.4	9.6	0.7	64.0	70.0	78.3

最高血圧(血圧を下げる薬服用者を含む)

年齢階級	男性					女性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	14	113.1	13.0	3.5	101.9	115.6	119.0	17	97.5	6.4	1.7	91.5	98.0	99.9
30-39歳	15	112.1	8.7	2.3	105.1	111.1	118.1	25	106.4	15.1	3.3	96.1	103.6	111.1
40-49歳	20	118.2	12.8	2.9	109.1	119.0	124.9	40	109.4	13.5	2.8	100.0	108.6	117.0
50-59歳	27	122.3	14.2	2.8	110.7	120.5	131.8	36	121.1	18.4	3.2	108.5	117.6	137.2
60-69歳	42	124.6	13.1	2.5	113.0	124.9	136.0	40	121.3	14.5	2.4	110.4	120.2	132.4
70歳以上	60	134.8	15.0	2.2	126.6	134.5	143.0	75	131.4	20.4	2.8	117.0	131.0	143.0
(再掲)20歳以上※	178	122.9	15.4	1.6	111.0	122.0	133.0	233	119.0	20.0	1.6	103.0	115.0	134.0
(再掲)40-74歳※	115	123.9	14.7	1.7	114.0	124.0	135.0	148	120.5	17.9	1.4	108.0	117.0	134.0
(再掲)40-89歳※	149	126.0	15.3	1.5	118.0	126.0	136.0	191	123.0	19.4	1.5	108.3	120.0	138.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

最低血圧(血圧を下げる薬服用者を除外)

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	14	68.1	9.9	3.3	61.9	70.0	73.2	17	60.4	6.1	1.5	56.8	60.0	63.6
30-39歳	15	70.3	7.5	1.9	64.9	68.9	73.7	25	68.1	9.1	1.8	60.0	69.0	72.6
40-49歳	20	80.0	9.5	2.4	71.8	79.7	87.0	38	66.9	8.2	1.6	61.0	65.1	72.6
50-59歳	23	77.1	8.0	1.5	71.2	77.0	83.1	34	75.4	9.7	1.7	68.0	74.0	83.9
60-69歳	28	75.1	8.8	2.2	69.9	77.0	83.0	29	71.6	9.5	1.8	63.0	71.0	76.8
70歳以上	30	74.1	8.5	2.4	68.6	73.1	81.4	35	69.9	9.4	1.4	61.5	70.0	78.0
(再掲)20歳以上※	130	74.7	9.5	1.3	68.0	73.8	81.0	178	69.3	9.7	0.7	61.0	68.0	76.0
(再掲)40-74歳※	85	77.5	9.0	1.1	71.0	77.0	84.1	119	71.4	9.4	0.8	64.0	70.0	77.0
(再掲)40-89歳※	101	76.9	8.9	1.1	70.1	77.0	83.0	136	70.8	9.6	0.8	63.8	70.0	77.0

最高血圧(血圧を下げる薬服用者を除外)

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	14	113.1	13.0	3.5	101.9	115.6	119.0	17	97.5	6.4	1.7	91.5	97.9	99.9
30-39歳	15	112.1	8.7	2.3	105.1	111.1	118.1	25	106.4	15.1	3.3	96.1	103.6	111.1
40-49歳	20	118.2	12.8	2.9	109.1	119.0	124.9	38	109.2	13.5	2.9	100.0	108.2	117.0
50-59歳	23	119.6	11.9	2.2	109.5	119.4	129.2	34	120.5	18.5	3.1	108.4	116.7	134.6
60-69歳	28	123.3	13.7	3.3	111.0	123.0	137.1	29	118.6	13.3	2.4	107.7	115.4	129.1
70歳以上	30	130.7	13.0	2.8	123.9	132.0	139.0	35	125.2	20.2	3.6	112.0	123.5	141.6
(再掲)20歳以上※	130	119.6	13.5	1.6	109.0	119.0	130.0	178	114.6	18.0	1.4	100.0	111.0	127.0
(再掲)40-74歳※	85	121.0	13.0	1.7	111.0	122.0	131.0	119	117.7	16.5	1.4	106.0	115.0	130.0
(再掲)40-89歳※	101	122.5	13.6	1.5	113.0	123.0	132.8	136	118.6	17.7	1.6	106.0	115.4	130.1

注)

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出して値

・問診において「血圧を下げる薬の服用状況」を回答した者を集計対象とした

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

血圧の分布

最低血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	1	1	0	0	1	4	7	2
	60-69	3	7	4	3	7	14	38	18
	70-79	7	4	7	11	17	27	73	46
	80-89	3	3	7	13	12	13	51	41
	90-99	0	0	2	0	5	2	9	8
	100-109	0	0	0	0	0	0	0	0
	110mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	14	15	20	27	42	60	178	115
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	0	0	1	2	0
	50-59	5	4	5	1	1	5	21	8
	60-69	10	10	21	8	11	23	83	49
	70-79	1	8	11	11	18	30	79	52
	80-89	0	2	3	13	9	13	40	33
	90-99	0	0	0	3	1	3	7	6
	100-109	0	1	0	0	0	0	1	0
	110mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	17	25	40	36	40	75	233	148

最高血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	90mmHg未満	0	0	1	0	0	0	1	1
	90-99	1	0	1	1	1	0	4	3
	100-109	4	7	2	3	4	3	23	10
	110-119	5	6	7	6	10	4	38	27
	120-129	1	1	6	7	11	14	40	27
	130-139	2	1	3	8	13	20	47	32
	140-149	1	0	0	0	2	14	17	11
	150-159	0	0	0	2	1	2	5	3
	160-169	0	0	0	0	0	1	1	0
	170-179	0	0	0	0	0	1	1	1
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	1	1	0
	総数	14	15	20	27	42	60	178	115
	女性	90mmHg未満	0	1	1	0	0	1	3
90-99		12	7	6	2	2	1	30	10
100-109		3	7	15	8	7	6	46	33
110-119		2	7	12	7	11	9	48	37
120-129		0	0	1	6	8	16	31	19
130-139		0	1	4	7	6	11	29	22
140-149		0	1	1	3	5	20	30	17
150-159		0	1	0	1	1	4	7	5
160-169		0	0	0	1	0	2	3	2
170-179		0	0	0	1	0	5	6	2
180mmHg以上		0	0	0	0	0	0	0	0
総数		17	25	40	36	40	75	233	148

最低血圧の分布(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外) (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	1	1	0	0	1	1	4	1
	60-69	3	7	4	3	6	10	33	17
	70-79	7	4	7	9	13	13	53	34
	80-89	3	3	7	11	7	6	37	30
	90-99	0	0	2	0	1	0	3	3
	100-109	0	0	0	0	0	0	0	0
	110mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	14	15	20	23	28	30	130	85
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	0	0	0	1	0
	50-59	5	4	5	1	1	3	19	8
	60-69	10	10	21	8	10	11	70	44
	70-79	1	8	9	11	11	14	54	38
	80-89	0	2	3	11	6	6	28	24
	90-99	0	0	0	3	1	1	5	5
	100-109	0	1	0	0	0	0	1	0
	110mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	17	25	38	34	29	35	178	119

最高血圧の分布(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外) (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	90mmHg未満	0	0	1	0	0	0	1	1
	90-99	1	0	1	1	1	0	4	3
	100-109	4	7	2	3	4	2	22	10
	110-119	5	6	7	5	7	4	34	23
	120-129	1	1	6	6	6	8	28	20
	130-139	2	1	3	8	9	11	34	25
	140-149	1	0	0	0	1	4	6	3
	150-159	0	0	0	0	0	0	0	0
	160-169	0	0	0	0	0	1	1	0
	170-179	0	0	0	0	0	0	0	0
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	14	15	20	23	28	30	130	85
女性	90mmHg未満	0	1	1	0	0	1	3	1
	90-99	12	7	6	2	1	1	29	9
	100-109	3	7	14	8	7	4	43	31
	110-119	2	7	12	7	8	8	44	34
	120-129	0	0	1	6	6	6	19	15
	130-139	0	1	3	6	4	5	19	15
	140-149	0	1	1	2	2	6	12	8
	150-159	0	1	0	1	1	3	6	4
	160-169	0	0	0	1	0	0	1	1
	170-179	0	0	0	1	0	1	2	1
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	17	25	38	34	29	35	178	119

血圧の状況(各分類に該当する人)

血圧の状況(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	正常	正常高値	高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	20-29歳	14	9	1	3	1	0	0	1
	30-39歳	15	11	0	4	0	0	0	0
	40-49歳	20	9	1	8	2	0	0	0
	50-59歳	27	7	5	13	2	0	0	2
	60-69歳	42	10	7	17	8	0	0	3
	70歳以上	60	7	11	22	17	2	1	18
	(再掲)20歳以上	178	53	25	67	30	2	1	24
	(再掲)40-74歳	115	31	14	47	22	1	0	15
女性	20-29歳	17	17	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	25	22	0	1	2	0	0	1
	40-49歳	40	33	1	5	1	0	0	1
	50-59歳	36	16	2	12	4	2	0	3
	60-69歳	40	17	6	10	7	0	0	6
	70歳以上	75	17	14	12	25	7	0	29
	(再掲)20歳以上	233	122	23	40	39	9	0	40
	(再掲)40-74歳	148	76	12	32	24	4	0	22
総数	20-29歳	31	26	1	3	1	0	0	1
	30-39歳	40	33	0	5	2	0	0	1
	40-49歳	60	42	2	13	3	0	0	1
	50-59歳	63	23	7	25	6	2	0	5
	60-69歳	82	27	13	27	15	0	0	9
	70歳以上	135	24	25	34	42	9	1	47
	(再掲)20歳以上	411	175	48	107	69	11	1	64
	(再掲)40-74歳	263	107	26	79	46	5	0	37

血圧の状況(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外)

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	正常	正常高値	高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	20-29歳	14	9	1	3	1	0	0	1
	30-39歳	15	11	0	4	0	0	0	0
	40-49歳	20	9	1	8	2	0	0	0
	50-59歳	23	6	5	12	0	0	0	0
	60-69歳	28	8	5	13	2	0	0	1
	70歳以上	30	6	6	13	4	1	0	5
	(再掲)20歳以上	130	49	18	53	9	1	0	7
	(再掲)40-74歳	85	28	11	40	6	0	0	3
女性	20-29歳	17	17	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	25	22	0	1	2	0	0	1
	40-49歳	38	32	1	4	1	0	0	1
	50-59歳	34	16	2	11	3	2	0	2
	60-69歳	29	14	4	7	4	0	0	3
	70歳以上	35	14	5	5	10	1	0	10
	(再掲)20歳以上	178	115	12	28	20	3	0	17
	(再掲)40-74歳	119	71	9	23	14	2	0	11
総数	20-29歳	31	26	1	3	1	0	0	1
	30-39歳	40	33	0	5	2	0	0	1
	40-49歳	58	41	2	12	3	0	0	1
	50-59歳	57	22	7	23	3	2	0	2
	60-69歳	57	22	9	20	6	0	0	4
	70歳以上	65	20	11	18	14	2	0	15
	(再掲)20歳以上	308	164	30	81	29	4	0	24
	(再掲)40-74歳	204	99	20	63	20	2	0	14

「糖尿病が強く疑われる者」及び「可能性を否定できない者」の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる者」及び 「可能性を否定できない者」		強く疑われる者※1		可能性を否定できない者※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	14	9.6	6.4	9.6	6.4	0.0	0.0
	40-49歳	20	11.8	6.7	5.3	5.0	6.4	4.9
	50-59歳	26	18.8	8.2	9.1	6.5	9.7	5.8
	60-69歳	41	23.4	8.0	9.9	5.7	13.5	5.7
	70歳以上	57	27.0	6.0	13.5	4.8	13.5	4.8
	(再掲)20歳以上※3	172	17.4	3.2	8.8	2.5	8.6	2.1
	(再掲)65-74歳	54	30.0	6.3	16.0	5.9	14.0	4.9
	(再掲)75歳以上	31	22.7	7.7	10.2	4.8	12.5	6.6
	(再掲)40-74歳※3	113	20.5	4.3	9.8	3.5	10.8	2.9
女性	20-29歳	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	23	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0
	40-49歳	38	11.4	4.7	7.4	3.9	4.0	2.9
	50-59歳	35	22.4	6.9	10.5	5.7	11.9	6.0
	60-69歳	40	25.6	8.3	11.9	4.3	13.7	5.6
	70歳以上	67	39.9	6.3	23.2	5.9	16.8	4.6
	(再掲)20歳以上※3	220	23.2	3.3	13.1	2.7	10.1	2.3
	(再掲)65-74歳	55	34.4	7.8	19.1	5.5	15.3	5.6
	(再掲)75歳以上	37	48.8	10.7	27.2	9.5	21.5	6.3
	(再掲)40-74歳※3	143	21.9	4.2	11.8	3.4	10.1	2.6
総数	20-29歳	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	37	8.3	4.4	8.3	4.4	0.0	0.0
	40-49歳	58	11.6	4.8	6.3	3.9	5.3	3.4
	50-59歳	61	20.6	5.3	9.8	4.5	10.8	3.9
	60-69歳	81	24.5	5.0	10.9	2.9	13.6	4.0
	70歳以上	124	34.4	4.7	19.0	4.0	15.4	3.9
	(再掲)20歳以上※3	392	20.4	2.4	11.0	2.0	9.4	1.7
	(再掲)65-74歳	109	32.3	5.1	17.6	3.6	14.7	4.3
	(再掲)75歳以上	68	38.2	6.9	20.3	5.7	17.8	4.4
	(再掲)40-74歳※3	256	21.2	3.2	10.8	2.5	10.4	2.1

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※1 強く疑われる者: HbA1c(NGSP)6.5%以上または「糖尿病治療の有無」(問診)に「有」と回答した者

※2 可能性を否定できない者: HbA1c(NGSP)6.0%以上6.5%未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

脂質異常症が疑われる者の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	脂質異常症が疑われる者	標準誤差
男性	20-29歳	14	11.2	10.8
	30-39歳	15	2.0	2.1
	40-49歳	20	2.1	2.2
	50-59歳	26	20.6	8.5
	60-69歳	41	17.2	6.6
	70歳以上	55	31.3	7.8
	(再掲)20歳以上※	171	16.0	2.8
	(再掲)65-74歳	53	23.2	7.0
	(再掲)75歳以上	30	35.2	10.1
	(再掲)40-74歳※	112	15.6	3.4
女性	20-29歳	17	0.0	0.0
	30-39歳	23	0.0	0.0
	40-49歳	38	3.2	2.5
	50-59歳	35	7.4	4.1
	60-69歳	40	9.5	4.4
	70歳以上	68	44.8	5.1
	(再掲)20歳以上※	221	18.0	2.8
	(再掲)65-74歳	55	28.1	6.9
	(再掲)75歳以上	38	50.7	7.6
	(再掲)40-74歳※	143	13.9	2.8
総数	20-29歳	31	5.9	5.7
	30-39歳	38	1.0	1.1
	40-49歳	58	2.6	1.9
	50-59歳	61	14.0	4.5
	60-69歳	81	13.3	3.7
	70歳以上	123	39.2	4.4
	(再掲)20歳以上※	392	17.0	2.1
	(再掲)65-74歳	108	25.7	4.7
	(再掲)75歳以上	68	44.6	7.6
	(再掲)40-74歳※	255	14.7	2.2

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ・HDLコレステロール値が40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬を服用または中性脂肪を下げる薬を服用

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口に合わせるための重み付けをして算出した値

メタボリックシンドロームが強く疑われる者及び予備群と考えられる者の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる		予備群	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	19.3	12.2	0.0	0.0	19.3	12.2
	30-39歳	14	17.3	10.6	5.3	5.1	12.0	9.8
	40-49歳	20	41.4	13.2	0.0	0.0	41.4	13.2
	50-59歳	26	29.4	11.0	11.6	6.7	17.8	8.3
	60-69歳	41	40.9	12.4	15.9	6.8	25.0	9.0
	70歳以上	55	48.9	9.5	23.0	8.6	26.0	6.3
	(再掲)20歳以上※3	170	36.0	5.5	11.1	2.9	24.9	5.5
	(再掲)65-74歳	53	48.7	7.7	19.2	5.4	29.5	7.8
	(再掲)75歳以上	30	45.9	11.1	24.5	9.5	21.4	7.7
	(再掲)40-74歳※3	112	40.3	6.3	11.3	2.9	29.0	6.6
女性	20-29歳	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	21	7.8	7.7	7.8	7.7	0.0	0.0
	40-49歳	38	9.4	4.9	5.3	3.1	4.0	2.7
	50-59歳	34	11.8	6.4	6.1	4.3	5.7	3.4
	60-69歳	40	9.3	3.9	7.8	3.8	1.5	1.1
	70歳以上	66	15.2	6.2	10.3	5.2	4.9	2.6
	(再掲)20歳以上※3	216	10.7	3.0	7.3	2.5	3.4	1.2
	(再掲)65-74歳	55	11.9	5.6	9.0	4.1	2.9	1.9
	(再掲)75歳以上	36	20.1	7.3	13.8	7.6	6.4	4.2
	(再掲)40-74歳※3	142	9.9	3.4	6.3	2.5	3.5	1.4
総数	20-29歳	31	10.2	6.4	0.0	0.0	10.2	6.4
	30-39歳	35	12.9	6.8	6.5	4.4	6.4	5.5
	40-49歳	58	25.7	7.5	2.6	1.5	23.1	6.9
	50-59歳	60	20.8	7.2	8.9	4.1	12.0	5.0
	60-69歳	81	24.8	5.9	11.8	3.6	13.1	4.4
	70歳以上	121	29.4	5.5	15.6	4.8	13.7	3.0
	(再掲)20歳以上※3	386	22.9	3.2	9.1	1.9	13.8	2.8
	(再掲)65-74歳	108	29.4	4.7	13.8	3.6	15.6	3.8
	(再掲)75歳以上	66	30.6	6.6	18.1	5.6	12.5	4.2
	(再掲)40-74歳※3	254	24.8	3.8	8.7	2.1	16.0	3.5

注) ・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをした値
 ・妊婦は除外

※ 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをして算出した値

メタボリックシンドロームの疑い判定基準(R1国民健康・栄養調査と同様の判定基準)

【メタボリックシンドロームが強く疑われる者】

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

- ①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用
- ③HbA1c(NGSP)値6.0%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用

【予備群】

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記①～③の項目のうち1項目に該当する人

血液検査の結果

血色素量 (g/dl)	男性					女性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差		中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
年齢階級														
20-29歳	14	16.1	0.6	0.2	15.7	16.1	16.5	17	13.0	0.7	0.1	12.6	12.8	13.5
30-39歳	14	15.1	0.8	0.2	14.7	15.2	15.4	23	12.7	1.2	0.2	11.9	12.9	13.6
40-49歳	20	15.6	0.9	0.2	15.0	15.4	16.3	38	12.5	2.0	0.4	11.0	12.8	13.8
50-59歳	26	15.1	0.9	0.2	14.7	15.1	15.8	35	13.9	1.0	0.2	13.2	13.8	14.8
60-69歳	41	15.0	1.1	0.1	14.3	15.0	15.7	40	13.6	0.8	0.1	13.4	13.8	14.0
70歳以上	57	14.3	1.6	0.2	13.4	14.4	15.0	67	12.9	1.3	0.2	11.7	12.9	14.1
(再掲)20歳以上※	172	15.1	1.2	0.1	14.6	15.1	15.8	220	13.1	1.4	0.1	12.4	13.4	14.0
(再掲)40-74歳※	113	15.1	1.1	0.1	14.5	15.1	15.9	143	13.3	1.4	0.1	12.6	13.6	14.1

赤血球数 (万个/ μ l)

赤血球数 (万个/ μ l)	男性					女性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差		中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
年齢階級														
20-29歳	14	528.5	21.7	6.3	513.2	522.7	544.7	17	441.3	23.0	4.1	421.0	436.6	455.7
30-39歳	14	506.4	33.9	9.6	487.7	504.5	521.0	23	437.6	44.8	11.6	398.9	440.0	474.9
40-49歳	20	510.7	26.0	5.7	495.7	511.5	524.9	38	436.5	33.8	5.9	413.9	435.9	461.8
50-59歳	26	481.2	38.8	8.4	462.0	476.9	498.5	35	460.7	36.0	5.8	439.3	465.2	473.4
60-69歳	41	479.9	43.5	5.9	449.9	478.9	510.9	40	451.1	30.9	4.2	431.2	446.3	473.1
70歳以上	57	458.2	56.4	7.9	430.4	463.0	483.9	67	421.7	43.4	7.2	385.1	421.0	454.0
(再掲)20歳以上※	172	488.3	47.2	4.1	463.0	491.4	522.0	220	438.2	39.8	3.1	413.0	440.1	467.0
(再掲)40-74歳※	113	485.9	41.1	3.8	462.0	485.0	519.0	143	446.4	36.4	3.4	422.0	451.0	469.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

ヘマトクリット値(%)	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
年齢階級										
20-29歳	14	47.1	1.5	0.5	48.0	17	39.4	1.5	0.3	40.3
30-39歳	14	45.2	2.3	0.6	45.7	23	38.9	3.7	0.8	41.6
40-49歳	20	46.4	2.7	0.6	47.7	38	38.6	4.6	0.9	41.9
50-59歳	26	44.9	2.6	0.6	46.7	35	41.9	2.8	0.5	43.9
60-69歳	41	44.5	3.2	0.4	46.1	40	41.3	2.5	0.3	42.9
70歳以上	57	43.1	4.4	0.5	46.3	67	40.0	3.8	0.7	43.2
(再掲)20歳以上※	172	44.9	3.4	0.3	46.8	220	40.1	3.6	0.3	42.7
(再掲)40-74歳※	113	44.9	3.1	0.3	46.7	143	40.7	3.6	0.3	43.2

平均赤血球容積(MCV)(fl)

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	89.1	2.9	0.9	91.2	17	89.4	4.0	0.9	91.9
30-39歳	14	89.3	4.6	1.3	92.5	23	89.1	5.4	1.7	92.5
40-49歳	20	90.9	3.2	0.8	92.9	38	88.5	8.9	1.5	94.9
50-59歳	26	93.4	3.6	0.8	96.7	35	91.0	3.5	0.7	93.6
60-69歳	41	93.0	4.0	0.9	94.8	40	91.7	3.2	0.6	94.2
70歳以上	57	94.5	4.6	0.8	97.2	67	95.0	4.4	0.8	97.7
(再掲)20歳以上※	172	92.2	4.4	0.4	94.7	220	91.7	5.7	0.4	95.4
(再掲)40-74歳※	113	92.7	3.8	0.4	95.0	143	91.2	5.9	0.5	94.9

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

平均赤血球色素量(MCH)(pg)		男 性					女 性							
年齢階級	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	30.6	0.7	0.2	30.2	30.3	31.0	17	29.6	1.7	0.4	28.5	29.9	31.3
30-39歳	14	29.9	1.6	0.4	28.4	30.2	30.9	23	29.2	2.0	0.6	28.3	29.0	30.1
40-49歳	20	30.5	1.1	0.2	29.7	30.8	31.4	38	28.6	4.0	0.7	26.0	30.0	31.1
50-59歳	26	31.4	1.4	0.3	30.6	31.6	32.2	35	30.2	1.3	0.2	29.4	30.3	31.3
60-69歳	41	31.4	1.3	0.3	30.4	31.0	32.0	40	30.2	1.3	0.3	29.0	30.0	31.2
70歳以上	57	31.4	1.8	0.4	30.3	31.6	32.5	67	30.7	1.6	0.2	29.7	30.7	31.8
(再掲)20歳以上※	172	31.0	1.5	0.1	30.2	31.0	31.9	220	30.0	2.3	0.1	29.0	30.2	31.3
(再掲)40-74歳※	113	31.1	1.4	0.1	30.3	31.2	31.9	143	29.9	2.5	0.2	29.0	30.4	31.2

平均赤血球色素濃度(MCHC)(%)		男 性					女 性							
年齢階級	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	34.3	0.7	0.2	34.0	34.2	34.8	17	33.1	1.0	0.2	32.6	33.3	33.8
30-39歳	14	33.5	1.0	0.2	32.6	33.6	34.2	23	32.8	0.8	0.2	32.0	32.9	33.4
40-49歳	20	33.6	0.7	0.1	33.1	33.4	34.2	38	32.2	1.9	0.4	31.5	32.5	33.5
50-59歳	26	33.6	0.9	0.2	33.1	33.7	34.1	35	33.2	0.8	0.2	32.6	33.2	33.7
60-69歳	41	33.7	0.7	0.1	33.4	33.7	34.2	40	32.9	0.5	0.1	32.4	33.0	33.2
70歳以上	57	33.3	1.0	0.2	32.5	33.2	34.0	67	32.4	1.0	0.2	31.7	32.6	33.0
(再掲)20歳以上※	172	33.6	0.9	0.1	33.0	33.6	34.1	220	32.6	1.1	0.1	32.0	32.8	33.3
(再掲)40-74歳※	113	33.6	0.8	0.1	33.1	33.6	34.1	143	32.7	1.2	0.2	32.3	32.9	33.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

総たんぱく質値 (g/dl)

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	7.6	0.3	0.1	7.5	17	7.3	0.3	0.1	7.4
30-39歳	15	7.4	0.2	0.1	7.3	23	7.3	0.5	0.1	7.5
40-49歳	20	7.5	0.5	0.1	7.4	38	7.2	0.4	0.1	7.2
50-59歳	26	7.4	0.3	0.1	7.4	35	7.4	0.3	0.0	7.4
60-69歳	41	7.3	0.3	0.1	7.2	40	7.2	0.3	0.0	7.3
70歳以上	56	7.2	0.4	0.1	7.2	68	7.3	0.5	0.1	7.2
(再掲)20歳以上※	172	7.4	0.4	0.0	7.3	221	7.3	0.4	0.0	7.3
(再掲)40-74歳※	113	7.4	0.4	0.1	7.3	143	7.3	0.3	0.0	7.3

アルブミン値 (g/dl)

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	4.9	0.2	0.1	4.8	17	4.5	0.2	0.0	4.4
30-39歳	15	4.6	0.2	0.0	4.6	23	4.3	0.4	0.1	4.1
40-49歳	20	4.6	0.2	0.0	4.7	38	4.3	0.3	0.0	4.1
50-59歳	26	4.5	0.3	0.1	4.5	35	4.4	0.2	0.0	4.3
60-69歳	41	4.4	0.2	0.0	4.4	40	4.4	0.2	0.0	4.3
70歳以上	56	4.2	0.3	0.1	4.2	68	4.3	0.3	0.1	4.1
(再掲)20歳以上※	172	4.5	0.3	0.0	4.5	221	4.3	0.3	0.0	4.2
(再掲)40-74歳※	113	4.4	0.3	0.0	4.5	143	4.4	0.2	0.0	4.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

ヘモグロビンA1c(NGSP)(%) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	5.2	0.3	0.1	5.2	17	5.4	0.3	0.1	5.4
30-39歳	14	5.5	0.4	0.1	5.3	23	5.6	0.5	0.1	5.7
40-49歳	20	5.6	0.5	0.1	5.4	38	5.6	0.5	0.1	5.6
50-59歳	26	5.8	0.7	0.2	5.4	35	5.8	0.6	0.1	5.8
60-69歳	41	5.6	0.5	0.1	5.4	40	5.8	0.5	0.1	5.9
70歳以上	57	5.9	0.7	0.1	5.5	67	6.0	0.6	0.1	6.0
(再掲)20歳以上※	172	5.7	0.6	0.1	5.4	220	5.8	0.6	0.1	5.8
(再掲)40-74歳※	113	5.7	0.6	0.1	5.4	143	5.8	0.6	0.1	5.9

ヘモグロビンA1c(NGSP値)(%) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	5.2	0.3	0.1	5.1	17	5.4	0.3	0.1	5.4
30-39歳	14	5.5	0.4	0.1	5.3	23	5.6	0.5	0.1	5.7
40-49歳	19	5.5	0.3	0.1	5.4	37	5.6	0.4	0.1	5.6
50-59歳	24	5.6	0.3	0.1	5.4	32	5.6	0.3	0.0	5.8
60-69歳	40	5.6	0.3	0.1	5.4	34	5.7	0.3	0.1	5.8
70歳以上	50	5.7	0.3	0.0	5.5	62	5.8	0.4	0.1	5.9
(再掲)20歳以上※	161	5.5	0.3	0.0	5.3	205	5.7	0.4	0.0	5.7
(再掲)40-74歳※	106	5.6	0.3	0.0	5.4	131	5.7	0.4	0.0	5.8

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

血糖値 (mg/dl) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	11	89.8	4.8	1.5	85.6	13	90.1	6.9	1.7	85.0
30-39歳	12	90.6	9.7	2.6	83.8	19	91.8	8.4	2.7	86.0
40-49歳	17	94.9	16.7	4.0	87.2	33	94.2	9.9	2.0	87.9
50-59歳	21	94.3	11.9	2.6	88.0	31	100.0	29.3	6.3	85.8
60-69歳	35	99.6	16.1	2.7	91.0	32	98.4	14.8	1.5	89.0
70歳以上	39	103.2	18.1	2.7	93.0	57	103.5	15.4	2.3	94.0
(再掲)20歳以上※	135	96.4	15.1	1.7	87.3	185	98.4	17.2	1.6	89.0
(再掲)40-74歳※	93	97.4	15.1	1.8	89.0	121	98.1	18.6	2.1	88.5

血糖値 (mg/dl) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	11	89.8	4.8	1.5	85.6	13	90.1	6.9	1.7	85.0
30-39歳	12	90.6	9.7	2.6	83.8	19	91.8	8.4	2.7	86.0
40-49歳	16	91.6	11.4	2.8	87.0	32	93.5	9.0	1.7	89.0
50-59歳	19	92.5	11.3	2.3	88.0	28	91.2	8.7	2.0	85.1
60-69歳	34	97.8	11.9	2.0	91.0	28	95.9	9.5	1.7	88.8
70歳以上	34	99.8	12.3	2.2	92.4	53	101.7	14.7	2.1	91.0
(再掲)20歳以上※	126	94.2	11.4	1.1	87.0	173	95.7	11.8	1.2	89.0
(再掲)40-74歳※	87	95.1	12.1	1.3	88.0	111	94.5	10.0	1.0	87.9

注)血液採取が食後3時間以降に行われたものを集計対象とした

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

総コレステロール (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性					女 性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	161.9	21.7	5.2	140.0	158.8	166.9	179.0	191.9	204.5
30-39歳	15	195.9	26.4	7.5	179.0	191.9	204.5	188.4	37.3	8.6
40-49歳	20	207.6	26.7	5.3	193.0	203.4	225.1	205.4	38.8	7.4
50-59歳	26	219.6	38.4	7.2	185.8	220.0	233.0	230.1	35.5	8.2
60-69歳	41	202.1	31.2	6.2	181.7	202.5	228.8	223.8	35.0	5.7
70歳以上	56	198.7	35.3	4.5	171.0	202.0	220.4	210.8	29.0	3.3
(再掲)20歳以上※	172	200.1	34.5	2.3	176.1	199.0	220.2	209.7	36.2	2.9
(再掲)40-74歳※	113	208.9	33.3	2.1	187.4	208.0	227.0	218.1	35.7	3.2

総コレステロール (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性					女 性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	161.9	21.7	5.2	140.0	158.8	166.9	180.1	23.5	5.3
30-39歳	15	195.9	26.4	7.5	179.0	191.9	204.5	188.4	37.3	8.6
40-49歳	19	208.1	26.8	5.4	193.0	203.7	225.2	205.1	38.9	7.5
50-59歳	22	221.3	39.6	8.0	185.9	220.0	233.0	231.8	35.5	8.5
60-69歳	38	205.0	29.9	6.2	185.0	204.8	230.3	228.5	32.5	5.1
70歳以上	49	195.9	33.3	4.8	171.0	197.0	217.3	216.8	30.4	4.9
(再掲)20歳以上※	157	199.8	34.1	2.5	177.5	196.8	220.0	211.5	37.6	3.2
(再掲)40-74歳※	102	210.3	32.2	2.5	189.4	209.3	227.0	221.6	35.5	3.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

中性脂肪 (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性					女 性							
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点			
20-29歳	14	93.7	55.9	17.2	50.2	73.1	134.4	17.2	50.8	11.4	39.5	49.0	102.6
30-39歳	15	144.5	67.5	15.9	101.5	128.7	174.8	15.9	79.2	19.4	41.3	66.6	119.6
40-49歳	20	127.7	53.7	13.9	78.1	133.5	166.3	13.9	80.1	12.0	68.9	85.1	114.9
50-59歳	26	174.4	92.7	12.6	100.7	164.0	195.9	12.6	56.9	10.0	64.2	93.4	134.3
60-69歳	41	132.4	80.8	15.2	69.4	116.8	161.8	15.2	86.4	14.1	66.6	98.1	141.4
70歳以上	56	136.1	73.9	9.8	87.3	121.1	153.2	9.8	98.8	12.1	79.0	109.4	170.5
(再掲)20歳以上※	172	136.8	74.9	6.1	85.1	123.1	172.7	6.1	84.1	6.5	68.0	94.0	143.0
(再掲)40-74歳※	113	147.1	80.7	7.1	90.1	130.0	178.5	7.1	71.5	5.6	70.0	98.6	145.9

中性脂肪 (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性					女 性							
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点			
20-29歳	14	93.7	55.9	17.2	50.2	73.1	134.4	17.2	50.8	11.4	39.5	49.0	102.6
30-39歳	15	144.5	67.5	15.9	101.5	128.7	174.8	15.9	79.2	19.4	41.3	66.6	119.6
40-49歳	19	128.5	54.0	14.2	76.6	133.7	167.0	14.2	80.5	12.1	68.8	85.1	114.1
50-59歳	22	177.3	92.9	15.1	123.6	168.9	196.6	15.1	58.0	10.5	55.9	91.4	132.6
60-69歳	38	133.9	82.4	16.5	69.9	117.8	161.1	16.5	89.8	15.0	64.2	101.1	150.3
70歳以上	49	140.6	79.0	10.9	88.8	120.3	156.6	10.9	121.6	20.2	79.1	114.3	172.2
(再掲)20歳以上※	157	137.9	75.9	6.8	84.2	123.5	173.0	6.8	89.8	7.5	63.8	91.6	139.1
(再掲)40-74歳※	102	149.6	81.5	8.2	91.6	133.4	179.3	8.2	74.9	6.1	68.9	95.5	143.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

HDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点				
20-29歳	14	53.3	14.2	4.1	42.0	57.0	66.0	17	68.3	14.1	2.6	56.8	69.0	73.4
30-39歳	15	54.3	7.6	1.9	47.0	52.5	59.5	23	71.2	20.3	3.5	58.3	65.4	76.0
40-49歳	20	63.0	17.5	4.5	49.5	58.0	77.4	38	68.8	11.4	1.5	60.9	70.4	76.5
50-59歳	26	55.2	9.9	2.0	47.9	57.0	61.9	35	71.2	16.2	3.0	56.0	67.5	88.0
60-69歳	41	62.3	16.9	4.0	50.9	60.4	74.9	40	70.2	15.2	2.7	59.0	68.0	80.9
70歳以上	56	56.8	15.9	3.1	43.5	56.0	67.3	68	66.3	14.7	2.1	57.0	68.0	75.8
(再掲)20歳以上※	172	57.9	14.8	1.1	47.0	57.0	67.2	221	68.8	15.2	1.2	58.0	68.0	77.0
(再掲)40-74歳※	113	59.8	15.9	1.7	48.6	58.0	69.5	143	68.4	13.7	1.1	58.0	67.0	77.5

HDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点				
20-29歳	14	53.3	14.2	4.1	41.4	49.1	66.0	17	68.3	14.1	2.6	56.8	69.0	73.4
30-39歳	15	54.3	7.6	1.9	47.0	52.5	59.5	23	71.2	20.3	3.5	58.3	65.4	76.0
40-49歳	19	63.2	17.7	4.6	49.5	58.0	78.0	37	68.6	11.4	1.5	60.8	70.3	76.4
50-59歳	22	55.5	10.0	2.0	47.7	57.0	61.3	32	72.3	15.7	3.2	56.4	67.8	88.1
60-69歳	38	62.5	16.5	4.3	51.0	60.0	74.7	34	71.1	15.2	2.8	59.3	68.0	83.9
70歳以上	49	55.0	14.5	2.1	43.1	55.5	67.0	41	64.6	15.2	2.2	55.6	68.0	75.3
(再掲)20歳以上※	157	57.6	14.5	1.3	47.0	56.5	67.0	184	69.0	15.4	1.2	58.0	68.0	78.0
(再掲)40-74歳※	102	59.8	15.4	2.0	49.0	58.0	68.3	120	69.6	13.8	1.2	59.0	67.8	78.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

LDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点				
20-29歳	14	94.6	24.5	6.2	78.9	92.5	108.4	17	97.7	19.0	4.9	83.4	89.6	107.5
30-39歳	15	121.0	30.2	8.4	102.0	115.4	135.8	23	101.1	35.0	7.7	74.1	87.2	124.3
40-49歳	20	122.3	25.0	5.9	103.0	125.0	144.2	38	117.9	38.3	7.3	99.6	110.0	128.6
50-59歳	26	137.7	31.0	6.0	118.7	135.0	158.0	35	137.1	27.6	6.4	122.2	134.6	147.8
60-69歳	41	117.1	21.8	3.0	100.8	117.9	132.3	40	126.9	28.1	3.9	104.0	126.5	147.9
70歳以上	56	117.2	26.7	3.2	98.1	116.0	133.1	68	119.3	27.6	2.8	97.9	114.9	143.5
(再掲)20歳以上※	172	119.6	28.4	1.9	102.0	118.0	137.0	221	119.0	31.8	2.6	97.0	114.0	138.0
(再掲)40-74歳※	113	124.7	27.4	1.9	108.1	124.6	140.8	143	127.0	31.6	2.8	105.0	127.0	146.0

LDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性					女 性								
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点				
20-29歳	14	94.6	24.5	6.2	78.9	92.5	108.4	17	97.7	19.0	4.9	83.4	89.6	107.5
30-39歳	15	121.0	30.2	8.4	102.0	115.4	135.8	23	101.1	35.0	7.7	74.1	87.2	124.3
40-49歳	19	122.7	25.1	6.0	102.9	127.6	144.5	37	117.8	38.4	7.4	97.6	110.0	128.0
50-59歳	22	138.6	32.0	6.5	118.9	136.6	158.0	32	137.8	28.4	6.8	122.8	137.1	150.1
60-69歳	38	119.5	21.1	2.9	109.9	119.3	133.7	34	129.8	27.8	4.0	104.3	131.3	152.9
70歳以上	49	116.5	26.4	4.0	99.2	116.0	134.5	41	127.4	29.1	4.5	103.5	136.0	149.0
(再掲)20歳以上※	157	119.7	28.5	1.9	102.6	118.0	137.0	184	121.1	33.2	3.0	98.0	119.3	143.0
(再掲)40-74歳※	102	125.9	27.3	2.0	111.0	125.1	141.7	120	129.5	32.2	3.1	105.0	129.0	147.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

クレアチニン(mg/dl)

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	0.8	0.1	0.0	0.8	17	0.6	0.1	0.0	0.6
30-39歳	15	0.8	0.1	0.0	0.8	23	0.6	0.1	0.0	0.6
40-49歳	20	0.8	0.1	0.0	0.8	38	0.6	0.1	0.0	0.6
50-59歳	26	0.9	0.1	0.0	0.9	35	0.7	0.1	0.0	0.7
60-69歳	41	0.9	0.2	0.0	0.9	40	0.7	0.1	0.0	0.7
70歳以上	56	0.9	0.2	0.0	0.9	68	0.7	0.2	0.0	0.7
(再掲)20歳以上※	172	0.9	0.1	0.0	0.8	221	0.7	0.1	0.0	0.6
(再掲)40-74歳※	113	0.9	0.2	0.0	0.8	143	0.7	0.1	0.0	0.6

推算GFR (ml/min/1.73m²)

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	98.6	13.2	4.0	86.6	17	95.2	11.9	2.6	83.2
30-39歳	15	84.9	8.2	1.8	77.1	23	91.2	13.6	2.8	81.8
40-49歳	20	79.4	9.3	2.1	73.4	38	83.8	10.9	1.9	74.8
50-59歳	26	72.0	8.3	1.7	64.8	35	70.6	10.3	1.8	64.3
60-69歳	41	68.9	14.6	2.4	56.9	40	68.0	9.6	1.8	61.6
70歳以上	56	67.6	14.7	2.4	56.4	68	65.4	17.1	3.3	56.1
(再掲)20歳以上※	172	76.1	15.4	1.5	66.4	221	75.0	17.2	1.5	64.3
(再掲)40-74歳※	113	72.8	12.6	1.5	65.0	143	73.2	12.8	1.2	65.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと果の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

$$\text{推算GFR (ml/分/1.73 m}^2\text{)} = 194 \times \text{血清Cr (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢(歳)}^{-0.287} \text{ (男性)}$$

血清鉄

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	122.1	33.3	8.6	143.5	17	60.0	31.1	6.9	87.5
30-39歳	15	83.7	19.2	4.8	96.2	23	62.3	29.4	6.2	76.5
40-49歳	20	89.7	32.3	8.3	108.0	38	63.3	38.6	6.5	95.5
50-59歳	26	82.3	30.8	6.7	114.4	35	68.3	21.7	3.7	76.5
60-69歳	41	87.7	31.0	6.8	106.8	40	64.2	21.7	4.5	79.0
70歳以上	56	82.8	31.8	5.0	103.0	68	61.7	23.0	3.3	71.0
(再掲)20歳以上※	172	89.0	32.1	3.1	108.1	221	63.3	27.0	1.8	77.0
(再掲)40-74歳※	113	86.5	31.8	3.4	105.7	143	65.1	27.3	2.4	78.0

TIBC

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	336.6	28.0	6.3	350.2	17	360.5	35.9	8.1	389.5
30-39歳	15	314.3	30.8	8.5	334.6	23	384.4	65.5	13.2	435.6
40-49歳	20	339.1	24.4	5.0	357.5	38	368.9	58.4	8.8	426.5
50-59歳	26	322.2	35.4	7.4	347.6	35	327.7	37.1	5.5	356.5
60-69歳	41	319.4	33.0	5.9	336.0	40	329.1	37.6	7.0	352.8
70歳以上	56	329.7	42.2	6.2	365.0	68	323.6	41.9	4.1	347.6
(再掲)20歳以上※	172	327.2	34.6	2.6	350.0	221	342.4	51.2	3.3	365.5
(再掲)40-74歳※	113	328.1	34.1	3.3	351.7	143	336.1	45.7	3.6	359.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

GOT

年齢階級	男性					女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点		
20-29歳	14	21.9	10.4	3.3	15.8	17.0	24.6	17.0	24.6	15.8	17.0	24.6
30-39歳	15	23.2	8.7	2.2	18.0	19.5	24.5	18.0	19.5	24.5	19.5	24.5
40-49歳	20	25.9	9.8	2.2	19.0	22.0	33.4	19.0	22.0	33.4	22.0	33.4
50-59歳	26	23.9	8.1	1.3	19.8	22.0	26.3	19.8	22.0	26.3	22.0	26.3
60-69歳	41	24.3	7.0	1.2	21.0	22.0	27.6	21.0	22.0	27.6	22.0	27.6
70歳以上	56	29.0	18.4	2.9	19.0	23.0	28.4	19.0	23.0	28.4	23.0	28.4
(再掲)20歳以上※	172	25.4	12.1	1.0	19.0	22.0	28.0	19.0	22.0	28.0	22.0	28.0
(再掲)40-74歳※	113	24.2	7.9	0.9	19.0	22.0	27.0	19.0	22.0	27.0	22.0	27.0

GPT

年齢階級	男性					女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点		
20-29歳	14	25.1	29.3	9.3	9.0	12.4	29.7	9.0	12.4	29.7	12.4	29.7
30-39歳	15	29.4	21.3	6.1	18.5	22.4	28.0	18.5	22.4	28.0	22.4	28.0
40-49歳	20	28.4	20.6	4.8	16.0	22.7	36.0	16.0	22.7	36.0	22.7	36.0
50-59歳	26	26.9	13.9	3.1	19.0	23.0	29.7	19.0	23.0	29.7	23.0	29.7
60-69歳	41	23.3	8.3	1.3	17.8	22.0	26.8	17.8	22.0	26.8	22.0	26.8
70歳以上	56	24.5	15.3	2.3	15.0	20.0	30.4	15.0	20.0	30.4	20.0	30.4
(再掲)20歳以上※	172	26.1	17.8	1.7	16.0	21.0	29.0	16.0	21.0	29.0	21.0	29.0
(再掲)40-74歳※	113	25.3	14.4	1.8	16.6	22.0	29.0	16.6	22.0	29.0	22.0	29.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

γGTP

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	20.7	12.5	2.4	13.0	15.0	26.3	17.2	1.2	17.2
30-39歳	15	24.3	9.4	2.4	18.0	21.6	30.9	17.9	3.2	17.9
40-49歳	20	44.1	36.6	9.2	19.0	25.5	66.5	20.0	2.3	20.0
50-59歳	26	45.4	44.7	7.6	27.0	35.3	45.9	29.9	2.1	29.9
60-69歳	41	33.7	23.5	4.2	19.8	24.9	42.2	23.1	2.3	23.1
70歳以上	56	39.9	40.9	6.3	17.0	21.8	40.5	23.0	2.1	23.0
(再掲)20歳以上※	172	36.5	34.1	3.1	18.0	24.6	42.0	21.0	1.3	21.0
(再掲)40-74歳※	113	42.9	39.1	4.5	20.0	27.0	52.0	23.0	2.1	23.0

尿酸

年齢階級	男性					女性				
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	75%点
20-29歳	14	6.0	1.1	0.4	5.6	5.8	6.6	4.7	0.3	4.7
30-39歳	15	6.3	1.1	0.2	5.9	6.6	7.0	4.3	0.2	4.3
40-49歳	20	6.1	0.7	0.2	5.5	6.0	6.8	4.6	0.2	4.6
50-59歳	26	5.8	0.9	0.2	5.1	6.0	6.2	5.1	0.1	5.1
60-69歳	41	6.0	1.1	0.3	5.2	6.0	7.2	5.9	0.2	5.9
70歳以上	56	5.7	1.1	0.2	5.1	5.6	6.3	5.2	0.2	5.2
(再掲)20歳以上※	172	5.9	1.0	0.1	5.3	5.9	6.6	5.1	0.1	5.1
(再掲)40-74歳※	113	5.9	1.0	0.1	5.3	5.9	6.6	5.1	0.1	5.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

服薬の状況

「血圧を下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	179	48	131
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	0	20
	50-59歳	27	4	23
	60-69歳	42	14	28
	70歳以上	60	30	30
女性	総数	234	56	178
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	2	38
	50-59歳	36	2	34
	60-69歳	40	11	29
	70歳以上	76	41	35

「脈の乱れを治す薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	178	5	173
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	0	20
	50-59歳	27	0	27
	60-69歳	42	2	40
	70歳以上	59	3	56
女性	総数	234	4	230
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	36	0	36
	60-69歳	40	0	40
	70歳以上	76	4	72

「インスリン注射または血糖を下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	179	12	167
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	1	19
	50-59歳	27	2	25
	60-69歳	42	1	41
	70歳以上	60	8	52
女性	総数	234	19	215
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	1	39
	50-59歳	36	3	33
	60-69歳	40	6	34
	70歳以上	76	9	67

「コレステロールを下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	178	16	162
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	1	19
	50-59歳	27	3	24
	60-69歳	42	3	39
	70歳以上	59	9	50
女性	総数	234	38	196
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	1	39
	50-59歳	36	3	33
	60-69歳	40	6	34
	70歳以上	76	28	48

「中性脂肪を下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	178	6	172
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	1	19
	50-59歳	27	2	25
	60-69歳	42	1	41
	70歳以上	59	2	57
女性	総数	234	9	225
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	36	1	35
	60-69歳	40	1	39
	70歳以上	76	7	69

「貧血治療のための薬(鉄剤)」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	179	0	179
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	15	0	15
	40-49歳	20	0	20
	50-59歳	27	0	27
	60-69歳	42	0	42
	70歳以上	60	0	60
女性	総数	234	5	229
	20-29歳	17	0	17
	30-39歳	25	1	24
	40-49歳	40	2	38
	50-59歳	36	0	36
	60-69歳	40	0	40
	70歳以上	76	2	74