

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

炭水化物(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	299.6	80.6	13.43	134.9	154.0	203.1	247.1	305.9	346.3	400.4	430.1	611.7
	30-39歳	65	284.9	78.3	12.94	83.8	199.6	213.1	234.3	261.9	337.8	415.6	436.1	490.4
	40-49歳	93	301.7	91.4	9.93	137.2	151.5	175.7	249.1	295.8	341.7	415.5	461.1	706.5
	50-59歳	98	293.9	96.9	11.00	88.7	175.0	185.6	216.3	279.4	342.3	417.3	443.6	745.7
	60-69歳	118	290.1	83.1	12.41	107.0	170.5	190.3	233.7	269.8	336.0	421.4	457.0	535.7
	70歳以上	152	285.3	70.1	5.22	129.5	174.8	194.1	231.6	283.4	326.4	363.8	388.8	499.9
	(再掲)20-49歳※1	204	295.2	84.3	7.84	134.9	169.4	210.0	236.9	280.7	341.3	415.4	429.8	615.1
	(再掲)40-74歳※1	357	295.5	88.5	6.42	117.7	170.2	190.0	234.3	283.4	341.8	409.5	443.7	584.0
	(再掲)65-74歳	105	298.9	82.9	10.72	143.1	176.1	194.0	245.1	290.5	359.7	394.7	452.5	560.0
	(再掲)75歳以上	104	279.0	65.8	6.64	156.1	174.5	188.6	228.5	283.2	319.0	348.1	395.2	494.6
	(再掲)20歳以上※1	572	291.8	83.2	4.98	122.0	172.7	196.0	234.5	280.7	338.4	400.8	436.4	518.9
	(再掲)20歳以上※2	572	292.2	83.7	5.11	117.9	173.2	198.1	234.5	280.7	338.9	404.5	436.1	519.5
	女性	20-29歳	41	216.5	50.4	6.13	87.8	112.4	145.8	185.6	215.7	262.7	279.0	292.2
30-39歳		71	244.8	68.9	10.51	106.5	139.0	158.0	201.6	239.2	279.6	331.9	354.6	466.9
40-49歳		106	232.5	61.1	6.94	49.6	138.8	158.9	199.3	230.3	267.3	306.5	354.3	420.0
50-59歳		128	233.4	59.0	4.12	105.6	128.8	150.0	194.2	234.3	269.0	314.7	333.7	424.3
60-69歳		120	246.9	67.1	7.18	89.5	137.8	169.6	207.5	245.8	291.6	322.1	335.3	585.9
70歳以上		191	232.7	59.5	4.74	96.4	139.3	156.5	199.3	227.2	266.4	309.5	334.8	410.5
(再掲)20-49歳※1		218	233.1	62.5	5.62	100.5	134.1	153.1	198.5	230.8	269.5	309.5	340.9	440.8
(再掲)40-74歳※1		413	236.7	61.4	4.08	106.5	140.1	161.9	199.0	233.7	272.2	314.6	334.4	413.9
(再掲)65-74歳		118	244.5	64.0	6.62	136.1	148.3	172.1	200.5	238.2	281.3	321.9	342.5	570.0
(再掲)75歳以上		132	234.2	62.6	6.60	95.5	137.5	149.4	202.5	232.7	267.8	315.3	342.1	447.9
(再掲)20歳以上※1		657	235.4	62.1	3.64	104.5	138.1	156.3	199.2	233.5	270.7	313.4	334.7	416.0
(再掲)20歳以上※2		657	234.7	61.9	3.76	105.1	137.5	154.0	198.5	233.5	270.4	311.2	332.8	419.8
男女計		20-29歳	87	259.1	79.2	7.16	91.9	139.1	173.6	205.5	249.7	310.1	373.7	401.3
	30-39歳	136	265.2	76.3	7.99	85.8	149.9	178.6	218.4	251.2	303.8	371.9	426.0	469.6
	40-49歳	199	267.6	85.2	6.97	128.7	142.3	169.8	218.2	258.2	309.9	378.2	415.6	610.3
	50-59歳	226	263.6	85.6	6.32	106.4	138.8	179.6	209.3	248.8	313.6	369.1	422.1	508.0
	60-69歳	238	268.1	78.3	8.02	101.0	154.2	181.3	217.9	262.7	308.6	367.4	427.5	511.1
	70歳以上	343	254.4	69.1	4.31	104.9	149.0	171.7	211.1	249.8	300.5	341.8	367.3	460.4
	(再掲)20-49歳※1	422	264.7	80.5	4.70	107.7	144.3	171.3	215.7	253.5	309.5	365.5	415.6	485.1
	(再掲)40-74歳※1	770	265.4	81.3	4.33	109.7	147.0	175.0	214.0	256.0	309.4	362.5	414.0	514.1
	(再掲)65-74歳	223	268.8	77.8	6.63	137.4	161.1	174.9	218.2	259.3	310.6	363.7	394.3	546.8
	(再掲)75歳以上	236	252.4	67.5	5.62	97.7	148.9	162.6	211.2	250.2	294.6	336.0	356.6	473.5
	(再掲)20歳以上※1	1,229	262.5	78.2	3.35	107.3	148.2	174.8	213.3	252.8	307.4	358.6	410.2	482.8
	(再掲)20歳以上※2	1,229	263.5	79.0	3.22	107.2	147.4	175.0	213.3	253.5	308.3	360.5	413.0	480.7

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

炭水化物エネルギー比率(%)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	56.7	8.3	1.63	36.1	40.1	45.8	51.8	56.6	61.7	68.2	74.5	77.3
	30-39歳	65	61.4	7.9	1.03	32.7	49.0	52.9	56.5	61.2	67.5	70.9	73.5	76.5
	40-49歳	93	60.0	7.6	0.72	35.9	49.3	50.1	54.2	60.1	64.5	69.1	74.1	86.8
	50-59歳	98	60.3	8.2	0.98	37.4	46.6	49.3	54.8	60.4	65.8	71.7	74.5	80.6
	60-69歳	118	61.4	9.1	0.92	32.3	44.3	51.0	56.4	62.2	68.1	72.7	75.5	80.9
	70歳以上	152	62.7	7.1	0.65	42.4	49.1	54.1	58.3	63.3	67.4	70.8	72.8	77.1
	(再掲)20-49歳※1	204	59.7	8.1	0.65	35.1	46.3	50.2	54.6	59.5	65.0	69.4	72.3	78.6
	(再掲)40-74歳※1	357	61.0	8.2	0.43	35.6	47.9	50.8	55.7	61.3	66.0	71.4	74.0	79.8
	(再掲)65-74歳	105	63.3	7.6	0.67	34.5	50.6	54.2	58.4	63.2	68.1	71.7	76.0	81.0
	(再掲)75歳以上	104	62.2	7.4	0.76	41.7	47.7	53.1	57.2	62.9	66.6	71.2	73.3	76.8
	(再掲)20歳以上※1	572	60.8	8.1	0.48	36.0	47.4	50.8	55.7	61.0	66.1	70.9	73.6	79.4
	(再掲)20歳以上※2	572	60.5	8.2	0.55	36.0	46.6	50.6	55.6	60.5	66.0	70.9	73.6	78.6
	女性	20-29歳	41	55.7	8.3	1.16	34.1	39.5	44.9	49.1	58.1	61.6	66.0	66.6
30-39歳		71	57.3	7.9	0.98	33.9	39.9	47.1	52.7	59.2	62.8	64.7	66.8	72.7
40-49歳		106	58.8	8.1	0.98	42.4	45.5	47.5	53.6	58.3	63.6	69.1	72.1	79.8
50-59歳		128	56.6	8.2	0.81	34.8	42.1	45.3	52.1	57.0	61.9	66.6	69.2	81.4
60-69歳		120	58.3	7.7	0.80	27.8	46.6	49.9	54.0	58.2	63.0	67.9	71.1	76.2
70歳以上		191	59.3	8.2	0.65	41.0	45.1	48.1	53.4	59.0	64.8	69.7	72.9	81.5
(再掲)20-49歳※1		218	57.5	8.2	0.64	34.1	43.8	47.1	52.1	58.5	62.7	66.3	69.5	79.0
(再掲)40-74歳※1		413	57.7	7.8	0.51	38.5	44.7	47.3	53.1	57.7	62.6	67.3	70.0	78.6
(再掲)65-74歳		118	58.3	6.8	0.77	41.7	47.3	49.7	53.4	58.3	63.0	66.5	69.8	76.1
(再掲)75歳以上		132	60.8	8.4	0.78	38.2	45.1	50.2	55.7	61.1	66.9	72.1	75.0	82.9
(再掲)20歳以上※1		657	58.0	8.1	0.48	36.7	44.3	47.1	53.1	58.3	63.2	67.9	70.6	77.9
(再掲)20歳以上※2		657	57.7	8.1	0.49	34.1	43.6	47.1	52.6	58.2	62.9	66.9	70.3	77.6
男女計		20-29歳	87	56.2	8.3	1.06	34.5	40.3	44.9	50.8	57.5	61.6	66.2	69.1
	30-39歳	136	59.4	8.2	0.87	33.0	43.2	49.7	54.6	60.3	64.7	69.4	71.1	76.1
	40-49歳	199	59.4	7.9	0.63	40.0	47.1	49.6	53.9	59.7	64.4	69.1	71.9	79.8
	50-59歳	226	58.5	8.4	0.73	37.0	43.3	47.6	53.2	58.9	64.0	68.7	72.3	80.8
	60-69歳	238	59.8	8.5	0.75	32.0	46.6	50.5	54.4	60.2	65.0	71.2	73.4	78.7
	70歳以上	343	60.7	7.9	0.58	41.6	45.7	49.7	55.1	61.3	66.4	70.3	72.8	76.6
	(再掲)20-49歳※1	422	58.6	8.2	0.54	35.0	44.9	48.5	53.6	59.1	63.9	68.4	71.4	78.8
	(再掲)40-74歳※1	770	59.3	8.2	0.39	37.0	46.1	49.5	54.0	59.5	64.4	69.2	72.5	79.8
	(再掲)65-74歳	223	60.5	7.6	0.66	38.7	48.1	50.4	55.5	61.0	65.6	70.1	72.1	79.6
	(再掲)75歳以上	236	61.3	8.0	0.66	41.3	45.5	51.3	55.8	61.7	66.6	71.3	74.3	77.0
	(再掲)20歳以上※1	1,229	59.4	8.3	0.43	36.1	45.1	49.1	54.2	59.7	64.8	69.4	72.2	78.0
	(再掲)20歳以上※2	1,229	59.1	8.3	0.46	36.0	44.9	48.6	54.0	59.5	64.5	69.2	71.9	77.3

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

総食物繊維(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	14.1	7.5	1.36	2.9	4.8	6.4	8.1	12.0	18.5	26.6	29.2	33.8
	30-39歳	65	12.3	4.1	0.54	2.9	6.1	7.3	10.3	12.4	14.3	17.6	20.5	25.6
	40-49歳	93	13.7	4.8	0.50	3.5	7.7	8.0	10.2	12.6	16.6	19.2	23.2	33.2
	50-59歳	98	15.6	6.5	0.81	1.5	5.3	7.5	10.9	15.3	18.9	24.9	28.6	33.5
	60-69歳	118	17.2	7.4	0.79	3.2	5.7	8.4	12.2	16.6	22.0	27.8	31.1	39.3
	70歳以上	152	17.6	6.8	0.49	5.5	7.5	9.5	12.5	16.6	22.0	27.0	30.7	37.2
	(再掲)20-49歳※1	204	13.3	5.4	0.44	3.0	6.4	7.4	9.7	12.5	15.8	20.2	24.8	30.4
	(再掲)40-74歳※1	357	15.9	6.6	0.45	3.3	7.3	8.5	11.3	15.0	19.2	25.6	28.7	33.9
	(再掲)65-74歳	105	18.4	7.4	0.76	3.2	7.1	10.6	13.3	18.0	22.8	28.7	31.9	41.3
	(再掲)75歳以上	104	17.3	6.8	0.62	5.7	7.1	8.8	12.2	16.5	22.1	27.0	30.4	38.2
	(再掲)20歳以上※1	572	15.4	6.6	0.36	3.3	6.5	7.8	10.6	14.4	18.9	24.6	27.8	33.8
	(再掲)20歳以上※2	572	15.1	6.5	0.38	3.3	6.4	7.5	10.5	14.2	18.7	24.5	27.7	33.6
女性	20-29歳	41	13.1	5.3	0.78	2.8	3.7	6.2	9.1	13.5	16.7	20.7	21.9	27.9
	30-39歳	71	13.2	5.0	0.74	3.0	5.5	7.6	9.6	12.0	16.0	20.3	23.1	28.6
	40-49歳	106	13.1	5.3	0.54	3.3	4.6	7.4	9.6	12.6	16.2	20.7	21.9	31.6
	50-59歳	128	16.0	6.2	0.53	5.1	7.6	8.9	11.3	15.7	19.7	23.4	29.1	34.8
	60-69歳	120	17.7	6.2	0.55	5.8	8.2	9.3	13.4	17.9	21.7	25.8	28.5	36.6
	70歳以上	191	16.8	6.2	0.37	5.6	7.3	9.7	12.6	16.3	20.5	25.7	29.1	32.4
	(再掲)20-49歳※1	218	13.2	5.2	0.35	2.8	5.1	7.1	9.4	12.6	16.1	20.5	21.9	28.3
	(再掲)40-74歳※1	413	16.1	6.1	0.36	4.2	7.5	8.7	11.7	15.4	20.0	23.5	27.1	33.7
	(再掲)65-74歳	118	18.1	5.6	0.43	6.2	9.2	10.8	14.6	17.7	21.2	25.9	28.0	33.4
	(再掲)75歳以上	132	16.3	6.5	0.44	5.1	6.8	8.2	10.9	16.3	20.2	25.3	29.8	36.3
	(再掲)20歳以上※1	657	15.4	6.1	0.29	3.9	6.8	8.3	10.9	14.9	19.4	23.2	27.0	32.4
	(再掲)20歳以上※2	657	15.0	6.0	0.30	3.6	6.3	8.1	10.4	14.4	19.0	22.7	26.0	32.5
男女計	20-29歳	87	13.6	6.5	0.91	2.8	4.1	6.4	8.5	13.0	17.3	22.5	26.9	33.8
	30-39歳	136	12.8	4.5	0.46	2.8	5.7	7.3	9.8	12.4	15.2	19.8	21.7	25.4
	40-49歳	199	13.4	5.1	0.38	3.5	6.8	7.8	9.8	12.6	16.4	20.5	22.9	30.6
	50-59歳	226	15.8	6.3	0.60	4.3	6.5	8.7	11.2	15.4	19.3	24.0	28.6	33.7
	60-69歳	238	17.5	6.8	0.56	3.2	7.7	9.2	12.7	17.3	21.7	26.1	30.4	35.8
	70歳以上	343	17.2	6.4	0.34	5.7	7.4	9.6	12.6	16.4	21.3	26.4	30.3	33.6
	(再掲)20-49歳※1	422	13.2	5.3	0.33	2.9	5.8	7.3	9.5	12.6	16.0	20.4	23.1	30.4
	(再掲)40-74歳※1	770	16.0	6.3	0.35	3.4	7.5	8.6	11.4	15.2	19.8	24.3	28.0	33.5
	(再掲)65-74歳	223	18.2	6.4	0.41	3.3	8.3	10.7	14.1	18.0	22.0	27.0	30.8	34.8
	(再掲)75歳以上	236	16.7	6.6	0.39	5.6	7.0	8.3	11.5	16.4	21.3	25.2	30.1	35.5
	(再掲)20歳以上※1	1,229	15.4	6.3	0.28	3.4	6.7	7.9	10.7	14.7	19.2	23.7	27.3	33.4
	(再掲)20歳以上※2	1,229	15.1	6.3	0.30	3.3	6.4	7.7	10.5	14.3	18.8	23.3	27.0	33.4

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

水溶性食物繊維(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	3.4	1.9	0.36	0.4	1.1	1.2	1.8	2.7	5.6	6.0	6.5	9.0
	30-39歳	65	2.9	1.1	0.15	0.6	1.1	1.4	2.2	2.8	3.6	4.5	4.8	5.8
	40-49歳	93	3.1	1.2	0.13	0.7	1.3	1.6	2.1	2.9	3.5	4.7	5.7	7.7
	50-59歳	98	3.7	1.7	0.21	0.0	0.9	1.7	2.3	3.7	4.6	5.8	6.6	9.7
	60-69歳	118	3.8	1.7	0.18	0.4	0.9	1.9	2.6	3.7	4.8	6.5	7.1	9.2
	70歳以上	152	3.9	1.7	0.13	0.8	1.5	1.9	2.7	3.7	4.7	5.9	7.6	9.8
	(再掲)20-49歳※1	204	3.1	1.4	0.12	0.6	1.2	1.5	2.1	2.9	3.7	5.3	5.9	7.4
	(再掲)40-74歳※1	357	3.6	1.6	0.11	0.6	1.3	1.8	2.4	3.4	4.4	5.7	6.6	9.1
	(再掲)65-74歳	105	4.1	1.8	0.15	0.3	1.2	1.8	2.9	3.9	5.1	6.8	7.3	9.8
	(再掲)75歳以上	104	3.9	1.8	0.17	0.7	1.5	1.9	2.7	3.7	4.6	5.7	8.3	9.9
	(再掲)20歳以上※1	572	3.5	1.6	0.09	0.6	1.2	1.6	2.4	3.3	4.4	5.7	6.5	9.1
	(再掲)20歳以上※2	572	3.5	1.6	0.10	0.6	1.2	1.5	2.3	3.3	4.3	5.7	6.5	9.1
女性	20-29歳	41	3.2	1.4	0.18	0.5	0.8	1.5	1.9	3.3	4.3	4.9	5.4	6.9
	30-39歳	71	3.1	1.3	0.18	0.6	1.2	1.4	2.3	2.9	3.7	5.2	5.4	8.7
	40-49歳	106	3.0	1.2	0.12	0.3	1.0	1.5	2.2	2.9	4.0	4.7	5.0	6.6
	50-59歳	128	3.8	1.8	0.16	1.3	1.6	1.9	2.5	3.5	4.7	5.7	7.1	11.3
	60-69歳	120	4.0	1.5	0.14	0.9	1.7	1.9	2.9	4.0	5.0	5.8	6.6	10.1
	70歳以上	191	3.7	1.5	0.08	1.0	1.6	1.9	2.7	3.6	4.6	5.8	6.6	7.5
	(再掲)20-49歳※1	218	3.1	1.3	0.08	0.5	1.1	1.5	2.2	2.9	4.0	4.9	5.4	6.7
	(再掲)40-74歳※1	413	3.7	1.6	0.09	0.6	1.5	1.9	2.7	3.6	4.7	5.6	6.4	8.6
	(再掲)65-74歳	118	4.1	1.4	0.10	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	4.9	6.1	6.7	9.3
	(再掲)75歳以上	132	3.5	1.5	0.09	0.9	1.2	1.7	2.4	3.3	4.6	5.4	6.6	7.3
	(再掲)20歳以上※1	657	3.5	1.5	0.06	0.7	1.4	1.7	2.5	3.3	4.5	5.4	6.2	7.8
	(再掲)20歳以上※2	657	3.5	1.5	0.07	0.7	1.3	1.7	2.5	3.3	4.4	5.4	6.1	7.8
男女計	20-29歳	87	3.3	1.7	0.24	0.5	1.1	1.2	1.9	3.0	4.4	5.8	6.1	9.0
	30-39歳	136	3.0	1.2	0.11	0.6	1.1	1.4	2.2	2.9	3.7	4.8	5.4	6.0
	40-49歳	199	3.0	1.2	0.10	0.5	1.3	1.5	2.2	2.9	3.7	4.6	5.5	6.7
	50-59歳	226	3.7	1.7	0.17	0.6	1.4	1.8	2.5	3.6	4.7	5.8	6.6	9.8
	60-69歳	238	3.9	1.6	0.14	0.7	1.6	1.9	2.8	3.8	4.9	5.9	6.8	9.1
	70歳以上	343	3.8	1.6	0.08	1.0	1.5	1.9	2.7	3.7	4.6	5.8	7.0	9.5
	(再掲)20-49歳※1	422	3.1	1.4	0.09	0.6	1.1	1.5	2.1	2.9	3.9	5.0	5.7	6.6
	(再掲)40-74歳※1	770	3.7	1.6	0.09	0.6	1.5	1.8	2.6	3.5	4.5	5.6	6.5	8.6
	(再掲)65-74歳	223	4.1	1.6	0.10	0.6	1.7	2.3	3.1	3.9	5.0	6.4	7.0	9.1
	(再掲)75歳以上	236	3.6	1.6	0.10	1.0	1.5	1.7	2.5	3.5	4.6	5.5	6.8	9.4
	(再掲)20歳以上※1	1,229	3.5	1.6	0.07	0.7	1.3	1.7	2.4	3.3	4.4	5.5	6.4	8.6
	(再掲)20歳以上※2	1,229	3.5	1.6	0.07	0.6	1.2	1.7	2.4	3.3	4.4	5.5	6.2	8.6

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

不溶性食物繊維(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	10.4	5.6	1.00	2.0	3.1	4.4	6.0	9.5	13.6	19.7	22.6	23.3
	30-39歳	65	9.0	3.1	0.40	1.8	4.9	5.3	6.4	9.1	10.5	13.4	15.1	18.1
	40-49歳	93	10.2	3.8	0.39	2.4	5.3	6.0	7.6	9.3	12.7	15.0	17.9	25.6
	50-59歳	98	11.4	4.8	0.59	1.5	4.0	5.6	7.5	10.9	14.0	18.3	21.0	24.7
	60-69歳	118	12.6	5.3	0.58	2.5	4.0	6.0	9.1	12.5	16.2	20.1	21.5	29.1
	70歳以上	152	13.0	4.9	0.37	4.6	5.7	6.6	9.4	12.8	16.5	19.3	21.9	26.1
	(再掲)20-49歳※1	204	9.8	4.1	0.32	2.0	4.7	5.3	7.0	9.2	11.9	15.0	18.6	22.9
	(再掲)40-74歳※1	357	11.7	4.8	0.31	2.3	4.9	6.1	8.1	11.0	14.6	18.5	20.8	26.2
	(再掲)65-74歳	105	13.6	5.5	0.55	2.5	5.6	6.5	10.0	12.7	16.9	20.8	22.2	31.2
	(再掲)75歳以上	104	12.8	4.9	0.47	4.7	5.5	6.5	8.7	12.3	16.7	18.6	20.7	26.3
	(再掲)20歳以上※1	572	11.3	4.9	0.26	2.3	4.9	5.7	7.6	10.5	14.0	18.1	20.6	25.4
	(再掲)20歳以上※2	572	11.1	4.8	0.28	2.3	4.7	5.5	7.5	10.2	13.9	18.0	20.5	25.0
女性	20-29歳	41	9.5	3.9	0.57	2.1	2.9	4.0	7.2	9.7	11.5	15.8	16.5	19.4
	30-39歳	71	9.7	3.6	0.55	2.5	3.9	5.3	7.1	8.6	11.7	14.7	17.7	19.8
	40-49歳	106	9.7	4.1	0.43	2.8	3.6	4.9	6.7	9.2	11.8	15.4	16.5	27.1
	50-59歳	128	11.7	4.6	0.39	3.8	5.5	6.9	8.5	11.3	14.7	16.8	20.7	27.0
	60-69歳	120	12.9	4.5	0.39	4.4	5.6	7.2	9.5	12.7	16.3	18.6	20.5	26.3
	70歳以上	191	12.5	4.8	0.29	4.3	5.1	6.7	9.2	12.1	14.9	19.0	22.2	25.4
	(再掲)20-49歳※1	218	9.6	3.9	0.26	2.2	3.6	4.9	7.1	9.1	11.6	15.2	16.5	19.6
	(再掲)40-74歳※1	413	11.8	4.6	0.26	3.4	5.2	6.1	8.7	11.4	14.7	17.3	20.2	25.7
	(再掲)65-74歳	118	13.2	4.2	0.34	4.3	6.4	7.9	10.2	12.6	15.8	19.0	20.9	25.8
	(再掲)75歳以上	132	12.2	5.1	0.34	4.0	4.9	6.1	8.4	12.0	14.3	18.6	23.0	28.9
	(再掲)20歳以上※1	657	11.4	4.6	0.21	3.1	4.8	5.8	8.1	10.8	14.1	17.3	19.7	25.0
	(再掲)20歳以上※2	657	11.0	4.5	0.22	2.8	4.5	5.8	7.8	10.3	14.0	16.8	19.0	25.0
男女計	20-29歳	87	9.9	4.8	0.65	2.0	3.0	4.4	6.1	9.6	12.1	16.4	19.8	23.3
	30-39歳	136	9.3	3.4	0.35	1.8	4.3	5.4	7.1	8.9	11.2	14.1	15.6	18.4
	40-49歳	199	9.9	4.0	0.30	2.8	4.0	5.7	7.4	9.3	12.3	15.2	16.6	25.0
	50-59歳	226	11.6	4.7	0.44	3.2	4.9	6.3	7.9	11.2	14.3	17.9	20.9	25.4
	60-69歳	238	12.8	4.9	0.39	2.5	5.2	6.3	9.3	12.5	16.3	19.3	21.0	26.6
	70歳以上	343	12.7	4.9	0.26	4.5	5.5	6.7	9.4	12.2	15.8	19.1	22.1	25.4
	(再掲)20-49歳※1	422	9.7	4.0	0.24	2.2	3.9	5.2	7.0	9.2	11.7	15.1	16.9	22.3
	(再掲)40-74歳※1	770	11.7	4.7	0.24	2.8	4.9	6.1	8.4	11.3	14.7	17.9	20.6	25.6
	(再掲)65-74歳	223	13.4	4.8	0.29	2.5	6.1	7.6	10.0	12.7	16.3	20.2	21.6	26.6
	(再掲)75歳以上	236	12.4	5.0	0.30	4.3	5.1	6.2	8.5	12.2	15.9	18.6	22.5	26.0
	(再掲)20歳以上※1	1,229	11.3	4.7	0.20	2.8	4.9	5.8	7.9	10.7	14.1	17.6	20.2	25.0
	(再掲)20歳以上※2	1,229	11.1	4.7	0.21	2.5	4.6	5.6	7.6	10.2	13.9	17.3	19.7	25.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンA(μgRE)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	456	415	67	51	92	169	199	332	545	859	1,759	1,957
	30-39歳	65	550	1,249	142	29	90	141	237	351	504	680	1,213	11,195
	40-49歳	93	410	256	31	73	106	164	233	379	535	690	890	1,896
	50-59歳	98	483	323	40	80	111	143	233	447	605	848	1,113	1,746
	60-69歳	118	442	301	37	38	68	95	201	378	618	859	1,020	1,376
	70歳以上	152	619	840	70	34	129	160	269	476	701	891	1,265	6,336
	(再掲)20-49歳※1	204	471	791	55	39	109	143	234	348	528	759	1,081	1,952
	(再掲)40-74歳※1	357	451	301	22	39	95	127	227	391	600	825	999	1,692
	(再掲)65-74歳	105	485	329	40	23	98	117	226	433	683	872	1,177	1,737
	(再掲)75歳以上	104	678	998	105	41	156	204	287	500	674	951	1,524	7,171
	(再掲)20歳以上※1	572	501	683	36	40	98	143	236	391	593	826	1,095	1,951
	(再掲)20歳以上※2	572	497	688	36	43	99	143	236	390	588	825	1,096	1,947
女性	20-29歳	41	576	403	68	36	86	127	247	503	813	1,271	1,527	1,537
	30-39歳	71	585	1,116	115	25	111	151	232	353	525	834	2,242	10,061
	40-49歳	106	420	309	36	17	37	106	210	348	581	836	1,010	1,907
	50-59歳	128	550	523	71	44	89	142	257	446	660	1,080	1,369	4,279
	60-69歳	120	657	853	83	74	104	201	285	499	732	965	1,659	6,333
	70歳以上	191	531	361	29	86	156	193	290	471	650	895	1,039	2,431
	(再掲)20-49歳※1	218	516	725	47	24	85	118	225	376	597	903	1,269	2,899
	(再掲)40-74歳※1	413	550	602	39	32	93	146	250	441	658	922	1,210	3,517
	(再掲)65-74歳	118	575	397	37	87	174	207	344	533	723	917	1,010	3,051
	(再掲)75歳以上	132	516	300	27	54	153	190	282	464	704	917	1,076	1,550
	(再掲)20歳以上※1	657	550	640	32	36	104	158	255	426	657	936	1,255	3,196
	(再掲)20歳以上※2	657	553	670	35	36	94	151	248	422	658	957	1,277	3,207
男女計	20-29歳	87	515	411	46	38	86	155	239	394	684	1,122	1,530	1,957
	30-39歳	136	567	1,182	123	26	113	143	233	351	507	790	1,316	10,569
	40-49歳	199	415	283	27	26	72	115	215	373	556	821	904	1,686
	50-59歳	226	517	435	45	44	95	143	246	445	637	987	1,207	1,888
	60-69歳	238	551	652	52	38	90	121	244	437	676	939	1,205	3,624
	70歳以上	343	567	607	38	82	153	182	284	474	683	895	1,095	3,225
	(再掲)20-49歳※1	422	493	759	47	31	87	142	226	364	556	842	1,135	2,298
	(再掲)40-74歳※1	770	502	481	27	37	94	138	241	417	624	872	1,065	1,926
	(再掲)65-74歳	223	535	370	34	31	109	160	262	497	706	901	1,092	1,792
	(再掲)75歳以上	236	582	680	50	78	154	192	283	473	681	920	1,112	4,664
	(再掲)20歳以上※1	1,229	527	661	30	38	100	149	244	413	621	891	1,144	2,476
	(再掲)20歳以上※2	1,229	525	680	32	38	97	146	242	406	616	892	1,199	2,306

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

β-カロテン当量(μg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	3,322	3,443	543	24	249	392	876	1,968	4,656	9,404	10,588	14,378
	30-39歳	65	3,142	2,403	299	16	231	820	1,168	2,689	4,350	5,718	8,587	12,178
	40-49歳	93	3,188	2,433	276	74	169	507	1,693	2,647	4,678	5,887	8,034	14,491
	50-59歳	98	3,783	3,252	423	7	267	486	1,445	2,969	5,297	7,842	10,385	17,911
	60-69歳	118	3,662	3,070	352	0	30	187	1,117	3,010	5,514	7,733	10,620	12,292
	70歳以上	152	4,123	3,023	250	85	280	703	1,560	3,993	5,831	8,008	9,114	15,536
	(再掲)20-49歳※1	204	3,204	2,689	207	20	212	522	1,166	2,620	4,536	6,291	9,096	13,463
	(再掲)40-74歳※1	357	3,633	3,008	216	4	149	445	1,366	2,966	5,227	7,426	9,822	13,035
	(再掲)65-74歳	105	4,221	3,326	364	0	96	527	1,211	3,765	6,449	8,652	10,626	14,975
	(再掲)75歳以上	104	4,045	2,809	309	77	376	712	1,877	3,773	5,491	7,520	9,117	16,811
	(再掲)20歳以上※1	572	3,585	2,946	171	15	180	570	1,297	2,958	5,161	7,411	9,427	13,212
	(再掲)20歳以上※2	572	3,548	2,968	173	16	197	549	1,276	2,871	5,072	7,383	9,842	13,529
女性	20-29歳	41	4,133	3,080	539	37	127	264	1,106	4,120	6,513	7,745	9,553	12,159
	30-39歳	71	3,393	2,810	329	45	492	724	1,698	2,749	4,558	6,844	7,843	16,035
	40-49歳	106	3,380	2,847	354	29	88	190	1,064	3,004	5,037	8,282	8,749	11,680
	50-59歳	128	4,140	3,473	392	44	266	582	1,325	3,428	5,687	8,960	11,242	16,234
	60-69歳	120	4,864	3,357	302	83	819	1,038	2,278	4,348	7,210	9,049	10,281	18,513
	70歳以上	191	4,470	2,945	247	443	707	1,030	2,201	3,873	6,559	8,433	9,677	14,735
	(再掲)20-49歳※1	218	3,564	2,896	229	37	129	319	1,309	3,024	5,298	7,628	8,654	13,365
	(再掲)40-74歳※1	413	4,205	3,166	211	56	195	681	1,756	3,628	5,975	8,412	9,669	15,252
	(再掲)65-74歳	118	4,919	2,794	270	114	865	1,278	2,569	4,740	7,121	8,435	9,438	14,419
	(再掲)75歳以上	132	4,485	3,152	285	389	700	906	1,863	3,857	6,550	8,814	9,730	15,589
	(再掲)20歳以上※1	657	4,142	3,118	171	68	321	712	1,755	3,465	5,969	8,149	9,579	14,773
	(再掲)20歳以上※2	657	4,059	3,131	178	45	233	647	1,667	3,282	5,914	7,990	9,551	14,782
男女計	20-29歳	87	3,717	3,280	401	24	175	366	927	2,893	5,917	7,883	10,369	14,378
	30-39歳	136	3,265	2,605	265	18	286	826	1,320	2,716	4,356	6,442	7,890	15,236
	40-49歳	199	3,283	2,641	266	36	150	212	1,303	2,666	4,896	6,710	8,664	11,971
	50-59歳	226	3,961	3,363	353	31	274	546	1,440	3,055	5,435	8,414	10,688	16,845
	60-69歳	238	4,274	3,269	291	0	108	707	1,604	3,711	6,121	8,540	10,530	15,899
	70歳以上	343	4,327	2,979	210	98	577	854	1,875	3,878	6,246	8,320	9,412	14,616
	(再掲)20-49歳※1	422	3,380	2,795	173	32	179	398	1,261	2,830	4,835	7,087	8,914	12,959
	(再掲)40-74歳※1	770	3,926	3,101	198	31	177	592	1,550	3,244	5,650	7,977	9,611	13,983
	(再掲)65-74歳	223	4,607	3,058	281	0	468	920	1,768	4,572	6,713	8,600	10,148	14,169
	(再掲)75歳以上	236	4,306	3,020	243	94	667	720	1,873	3,845	5,991	8,525	9,732	14,800
	(再掲)20歳以上※1	1,229	3,875	3,048	157	31	216	668	1,517	3,175	5,549	7,881	9,572	14,279
	(再掲)20歳以上※2	1,229	3,804	3,060	158	30	204	609	1,424	3,105	5,480	7,859	9,576	14,275

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンE(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	8.3	4.3	0.81	2.3	3.3	3.4	4.4	7.8	11.3	15.8	17.0	18.7
	30-39歳	65	5.7	2.1	0.26	1.8	2.5	3.3	3.8	5.2	6.9	8.4	9.8	13.0
	40-49歳	93	6.5	2.7	0.31	2.0	3.2	3.8	4.7	6.0	8.0	10.0	12.9	17.5
	50-59歳	98	7.8	3.5	0.35	1.4	2.4	3.3	5.3	7.5	10.3	12.2	14.3	20.7
	60-69歳	118	7.2	3.4	0.34	1.4	2.8	3.7	4.8	6.5	9.3	11.5	14.1	19.4
	70歳以上	152	7.2	3.6	0.34	1.1	2.8	3.4	4.3	6.3	9.6	12.1	13.8	17.9
	(再掲)20-49歳※1	204	6.6	3.1	0.30	1.8	3.2	3.4	4.6	6.1	8.1	10.9	13.0	17.8
	(再掲)40-74歳※1	357	7.2	3.3	0.21	1.4	3.0	3.6	4.8	6.5	9.1	11.8	13.2	17.9
	(再掲)65-74歳	105	7.2	3.5	0.31	0.6	2.4	3.2	4.5	6.8	9.6	12.0	13.2	20.3
	(再掲)75歳以上	104	7.0	3.5	0.40	1.2	2.6	3.4	4.6	6.1	8.6	12.0	14.2	17.8
	(再掲)20歳以上※1	572	7.0	3.4	0.19	1.6	3.0	3.5	4.6	6.3	8.7	11.8	13.2	17.7
	(再掲)20歳以上※2	572	7.1	3.4	0.21	1.7	3.0	3.4	4.6	6.4	8.8	12.0	13.3	17.9
女性	20-29歳	41	6.3	3.0	0.41	1.4	1.9	3.1	3.9	6.1	8.2	10.4	10.8	15.7
	30-39歳	71	6.0	2.6	0.37	1.2	2.0	2.3	4.2	5.6	7.9	9.4	10.1	13.0
	40-49歳	106	5.8	3.0	0.36	0.9	1.7	2.2	3.7	5.3	7.5	10.6	11.8	15.3
	50-59歳	128	7.3	3.1	0.29	1.2	2.7	4.0	5.1	6.7	9.0	11.7	13.8	15.2
	60-69歳	120	7.4	3.1	0.27	1.9	2.7	3.4	5.0	7.2	9.1	11.9	13.7	16.0
	70歳以上	191	7.0	3.8	0.36	2.2	2.5	3.0	4.1	6.3	9.0	12.2	14.0	20.9
	(再掲)20-49歳※1	218	6.0	2.9	0.24	1.2	1.9	2.5	3.9	5.6	7.9	10.1	11.0	14.8
	(再掲)40-74歳※1	413	7.0	3.4	0.23	1.4	2.5	3.2	4.5	6.5	8.8	11.9	13.7	16.7
	(再掲)65-74歳	118	7.6	3.9	0.43	1.8	2.7	3.6	4.6	7.0	9.7	13.6	15.3	20.6
	(再掲)75歳以上	132	6.6	3.4	0.29	2.1	2.4	2.6	4.1	6.1	8.3	11.7	12.4	20.9
	(再掲)20歳以上※1	657	6.7	3.3	0.18	1.4	2.4	3.0	4.3	6.2	8.5	11.1	12.8	16.7
	(再掲)20歳以上※2	657	6.6	3.2	0.18	1.4	2.3	3.0	4.3	6.2	8.4	10.8	12.5	15.7
男女計	20-29歳	87	7.3	3.8	0.50	1.4	2.9	3.4	4.2	6.6	9.1	12.4	15.8	18.7
	30-39歳	136	5.8	2.3	0.24	1.4	2.2	3.2	4.1	5.6	7.1	9.1	10.1	13.0
	40-49歳	199	6.2	2.9	0.27	1.2	2.0	3.1	4.3	5.6	7.6	10.2	12.3	15.9
	50-59歳	226	7.5	3.3	0.28	1.4	2.6	3.5	5.2	7.0	9.6	12.0	13.7	15.4
	60-69歳	238	7.3	3.2	0.25	1.4	2.7	3.7	5.0	6.9	9.1	11.9	13.7	17.2
	70歳以上	343	7.1	3.7	0.30	1.8	2.6	3.2	4.2	6.3	9.1	12.1	13.9	20.4
	(再掲)20-49歳※1	422	6.3	3.0	0.22	1.4	2.3	3.3	4.2	5.8	8.0	10.2	12.3	16.6
	(再掲)40-74歳※1	770	7.1	3.4	0.19	1.4	2.7	3.4	4.7	6.5	8.9	11.8	13.4	16.8
	(再掲)65-74歳	223	7.5	3.7	0.32	1.0	2.7	3.4	4.5	6.9	9.7	12.4	14.1	19.8
	(再掲)75歳以上	236	6.8	3.4	0.27	1.7	2.4	3.0	4.2	6.1	8.6	11.7	12.5	17.2
	(再掲)20歳以上※1	1,229	6.9	3.3	0.16	1.4	2.6	3.3	4.5	6.3	8.6	11.5	13.0	17.0
	(再掲)20歳以上※2	1,229	6.9	3.3	0.17	1.4	2.6	3.3	4.5	6.3	8.6	11.5	13.0	17.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンD(μg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	8.1	8.9	1.51	0.2	0.4	1.2	2.3	4.2	11.6	20.8	28.8	41.5
	30-39歳	65	7.1	7.5	0.86	0.3	0.7	1.1	1.8	3.3	13.0	18.3	20.7	33.1
	40-49歳	93	8.0	8.0	1.06	0.3	0.6	0.6	1.9	4.8	13.7	20.3	24.6	31.5
	50-59歳	98	11.6	10.6	1.03	0.2	0.8	1.1	2.0	9.8	18.9	27.5	32.8	41.4
	60-69歳	118	12.7	13.9	1.25	0.1	0.5	1.3	3.2	8.0	19.0	27.1	42.1	71.2
	70歳以上	152	11.2	9.7	0.86	0.3	0.7	1.5	3.4	7.6	16.8	25.9	28.1	42.7
	(再掲)20-49歳※1	204	7.7	8.0	0.61	0.2	0.6	1.1	1.9	4.0	12.8	20.3	24.5	33.3
	(再掲)40-74歳※1	357	10.8	11.1	0.74	0.2	0.6	1.1	2.4	6.7	16.8	25.0	31.6	49.0
	(再掲)65-74歳	105	12.6	13.7	1.19	0.2	0.4	1.2	3.1	7.9	19.8	26.6	42.8	69.5
	(再掲)75歳以上	104	11.5	9.7	1.01	0.3	0.8	1.8	3.5	7.7	16.3	26.6	29.2	41.7
	(再掲)20歳以上※1	572	10.0	10.3	0.55	0.2	0.6	1.1	2.3	6.1	15.7	24.0	28.5	42.8
	(再掲)20歳以上※2	572	9.8	10.1	0.56	0.2	0.6	1.1	2.1	5.8	15.3	24.0	28.3	42.4
女性	20-29歳	41	7.3	7.6	1.51	0.1	0.2	0.5	1.8	4.1	10.4	20.0	21.5	36.8
	30-39歳	71	5.4	6.0	0.78	0.3	0.4	0.4	1.5	2.4	8.2	16.9	18.6	22.3
	40-49歳	106	6.7	7.1	0.76	0.0	0.1	1.0	1.8	3.3	10.9	18.2	23.5	27.4
	50-59歳	128	9.4	9.8	0.83	0.2	0.5	1.0	2.2	5.9	14.1	22.3	26.2	54.4
	60-69歳	120	10.6	10.5	1.09	0.3	0.9	1.5	3.0	7.1	13.9	25.3	27.7	59.9
	70歳以上	191	10.0	9.3	0.82	0.2	0.5	1.2	2.6	6.8	16.0	24.7	28.7	37.7
	(再掲)20-49歳※1	218	6.4	6.9	0.52	0.0	0.4	0.6	1.6	2.9	9.0	17.6	21.4	26.9
	(再掲)40-74歳※1	413	9.2	9.4	0.52	0.1	0.7	1.2	2.1	5.6	13.5	22.6	26.5	41.2
	(再掲)65-74歳	118	10.5	10.6	1.15	0.3	0.9	1.4	3.4	6.9	14.4	26.3	28.9	59.1
	(再掲)75歳以上	132	9.8	9.3	1.03	0.2	0.3	1.2	2.5	6.5	15.9	24.6	28.9	37.0
	(再掲)20歳以上※1	657	8.6	8.9	0.46	0.1	0.5	0.9	2.1	5.3	12.9	21.5	26.2	37.4
	(再掲)20歳以上※2	657	8.3	8.7	0.48	0.1	0.4	0.9	2.0	4.9	12.6	20.5	25.2	37.2
男女計	20-29歳	87	7.7	8.3	0.95	0.1	0.3	1.0	2.2	4.1	10.9	20.6	23.0	41.5
	30-39歳	136	6.3	6.8	0.66	0.3	0.4	0.7	1.7	2.8	10.4	16.9	20.2	32.6
	40-49歳	199	7.4	7.6	0.76	0.0	0.6	0.8	1.8	4.1	12.2	20.0	24.3	29.4
	50-59歳	226	10.5	10.3	0.76	0.2	0.6	1.1	2.1	6.7	16.2	24.7	32.0	42.1
	60-69歳	238	11.6	12.3	1.08	0.2	0.8	1.4	3.2	7.5	16.7	25.6	37.0	65.8
	70歳以上	343	10.5	9.5	0.75	0.2	0.6	1.3	3.0	7.1	16.3	24.8	28.4	38.7
	(再掲)20-49歳※1	422	7.1	7.5	0.42	0.1	0.4	0.9	1.8	3.5	11.2	18.8	22.9	33.1
	(再掲)40-74歳※1	770	10.0	10.3	0.54	0.2	0.6	1.1	2.2	6.2	14.7	24.0	27.8	43.1
	(再掲)65-74歳	223	11.5	12.1	1.00	0.2	0.7	1.3	3.2	7.0	17.6	26.5	37.7	63.8
	(再掲)75歳以上	236	10.5	9.5	0.82	0.2	0.6	1.4	2.7	7.1	16.2	24.9	28.8	38.4
	(再掲)20歳以上※1	1,229	9.3	9.6	0.44	0.2	0.6	1.1	2.1	5.6	14.2	22.8	27.2	42.1
	(再掲)20歳以上※2	1,229	9.0	9.5	0.44	0.2	0.5	1.0	2.1	5.3	14.0	22.2	26.8	41.9

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンK(μg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	206	148	20.8	25	42	60	108	178	232	449	609	715
	30-39歳	65	184	120	13.8	14	33	58	100	141	273	365	432	558
	40-49歳	93	224	163	21.9	31	54	70	123	203	266	411	480	1,080
	50-59歳	98	267	169	20.2	6	59	85	104	239	402	492	593	729
	60-69歳	118	263	186	16.6	0	33	62	139	220	355	513	667	877
	70歳以上	152	300	203	20.8	24	50	80	130	269	399	561	683	945
	(再掲)20-49歳※1	204	205	146	11.4	20	43	70	106	171	248	400	476	899
	(再掲)40-74歳※1	357	265	181	13.8	3	49	74	125	221	370	515	601	852
	(再掲)65-74歳	105	317	203	24.3	0	44	79	161	279	477	574	672	910
	(再掲)75歳以上	104	271	199	27.4	17	46	75	127	227	346	503	686	972
	(再掲)20歳以上※1	572	247	175	10.0	14	44	74	117	207	343	486	577	881
	(再掲)20歳以上※2	572	241	171	9.8	14	43	75	115	205	328	477	565	830
	女性	20-29歳	41	192	129	26.4	22	40	49	99	155	288	413	479
30-39歳		71	229	143	20.4	18	38	55	124	210	280	413	563	668
40-49歳		106	200	119	10.4	15	57	75	110	169	264	378	449	567
50-59歳		128	253	164	20.2	33	54	75	131	198	350	518	593	759
60-69歳		120	300	195	15.1	29	65	96	150	246	394	546	677	1,017
70歳以上		191	272	201	18.3	21	67	89	129	213	370	533	650	963
(再掲)20-49歳※1		218	208	131	11.2	18	39	63	107	186	274	396	479	585
(再掲)40-74歳※1		413	268	182	10.5	28	64	91	133	216	359	528	610	918
(再掲)65-74歳		118	325	205	24.0	38	83	109	156	284	447	574	680	958
(再掲)75歳以上		132	239	181	14.2	17	54	85	114	194	321	490	594	1,033
(再掲)20歳以上※1		657	250	174	9.3	22	54	81	125	202	337	503	585	901
(再掲)20歳以上※2		657	242	166	9.7	22	50	76	119	198	324	480	573	805
男女計		20-29歳	87	199	139	17.8	22	43	54	103	172	238	413	491
	30-39歳	136	206	133	13.3	15	39	58	103	180	276	390	484	623
	40-49歳	199	212	143	14.5	18	56	71	114	179	263	408	466	986
	50-59歳	226	260	166	16.3	30	57	81	117	219	368	516	584	722
	60-69歳	238	282	191	14.1	0	40	79	141	235	375	531	667	889
	70歳以上	343	284	202	18.4	22	57	88	130	227	384	547	671	964
	(再掲)20-49歳※1	422	207	138	9.5	20	43	67	107	178	262	396	477	640
	(再掲)40-74歳※1	770	266	181	9.9	22	57	79	131	219	363	521	603	900
	(再掲)65-74歳	223	321	204	21.5	0	76	92	156	283	450	573	671	942
	(再掲)75歳以上	236	252	189	14.8	20	50	85	119	207	341	500	613	962
	(再掲)20歳以上※1	1,229	248	174	8.5	22	50	77	119	207	340	491	583	898
	(再掲)20歳以上※2	1,229	242	169	8.5	22	46	75	117	201	327	479	566	819

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンB1(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	1.25	0.95	0.172	0.26	0.33	0.49	0.72	1.09	1.43	1.99	2.36	6.12
	30-39歳	65	0.84	0.55	0.078	0.28	0.40	0.41	0.53	0.73	0.97	1.23	1.46	5.36
	40-49歳	93	0.96	0.39	0.040	0.34	0.36	0.46	0.72	0.88	1.17	1.57	1.68	2.24
	50-59歳	98	1.36	1.92	0.328	0.18	0.49	0.58	0.70	0.93	1.30	1.72	2.59	11.86
	60-69歳	118	0.96	0.63	0.058	0.19	0.35	0.43	0.62	0.87	1.19	1.41	1.69	6.09
	70歳以上	152	0.88	0.55	0.054	0.29	0.37	0.50	0.64	0.80	0.99	1.30	1.53	3.84
	(再掲)20-49歳※1	204	0.98	0.64	0.059	0.28	0.40	0.43	0.65	0.86	1.18	1.57	1.87	5.44
	(再掲)40-74歳※1	357	1.05	1.09	0.091	0.33	0.38	0.48	0.67	0.88	1.16	1.51	1.81	7.65
	(再掲)65-74歳	105	0.91	0.48	0.049	0.32	0.36	0.43	0.63	0.82	1.10	1.37	1.70	3.96
	(再掲)75歳以上	104	0.91	0.64	0.070	0.27	0.36	0.50	0.61	0.81	1.00	1.31	1.56	5.14
	(再掲)20歳以上※1	572	1.01	0.96	0.050	0.28	0.39	0.47	0.65	0.85	1.15	1.45	1.77	5.74
	(再掲)20歳以上※2	572	1.04	1.02	0.058	0.27	0.40	0.47	0.65	0.86	1.17	1.52	1.90	5.94
女性	20-29歳	41	0.92	0.94	0.179	0.27	0.36	0.46	0.58	0.69	0.97	1.13	3.18	5.58
	30-39歳	71	0.92	0.78	0.076	0.18	0.38	0.47	0.61	0.80	1.00	1.22	1.39	6.19
	40-49歳	106	0.76	0.33	0.042	0.11	0.24	0.30	0.51	0.74	0.94	1.17	1.37	1.95
	50-59歳	128	0.92	0.88	0.093	0.30	0.45	0.52	0.58	0.77	0.97	1.23	1.44	7.06
	60-69歳	120	0.84	0.30	0.025	0.31	0.44	0.48	0.63	0.80	0.98	1.27	1.39	1.92
	70歳以上	191	0.83	0.51	0.042	0.25	0.36	0.48	0.58	0.76	0.95	1.24	1.37	2.84
	(再掲)20-49歳※1	218	0.85	0.69	0.054	0.19	0.30	0.41	0.58	0.76	0.95	1.17	1.38	5.58
	(再掲)40-74歳※1	413	0.83	0.52	0.027	0.22	0.36	0.46	0.59	0.76	0.97	1.21	1.38	2.00
	(再掲)65-74歳	118	0.83	0.30	0.027	0.36	0.45	0.54	0.60	0.76	0.98	1.26	1.38	2.10
	(再掲)75歳以上	132	0.83	0.58	0.058	0.23	0.28	0.45	0.56	0.77	0.93	1.30	1.40	4.50
	(再掲)20歳以上※1	657	0.85	0.62	0.030	0.23	0.36	0.47	0.59	0.76	0.96	1.20	1.38	5.45
	(再掲)20歳以上※2	657	0.87	0.68	0.037	0.24	0.36	0.47	0.59	0.76	0.97	1.20	1.38	5.57
男女計	20-29歳	87	1.09	0.96	0.126	0.27	0.37	0.47	0.61	0.82	1.20	1.73	2.31	6.12
	30-39歳	136	0.88	0.67	0.064	0.30	0.40	0.43	0.57	0.76	0.99	1.22	1.42	5.73
	40-49歳	199	0.86	0.38	0.038	0.20	0.30	0.37	0.60	0.83	1.06	1.28	1.59	2.13
	50-59歳	226	1.14	1.50	0.171	0.29	0.46	0.54	0.64	0.86	1.06	1.45	1.99	10.72
	60-69歳	238	0.90	0.50	0.035	0.29	0.40	0.46	0.63	0.81	1.08	1.32	1.56	2.14
	70歳以上	343	0.85	0.53	0.033	0.26	0.37	0.48	0.59	0.78	0.97	1.28	1.45	2.48
	(再掲)20-49歳※1	422	0.92	0.67	0.047	0.23	0.35	0.42	0.60	0.80	1.08	1.38	1.70	5.53
	(再掲)40-74歳※1	770	0.94	0.85	0.047	0.23	0.38	0.47	0.62	0.81	1.06	1.33	1.59	2.65
	(再掲)65-74歳	223	0.86	0.40	0.028	0.33	0.43	0.48	0.61	0.80	1.06	1.31	1.50	2.14
	(再掲)75歳以上	236	0.86	0.60	0.044	0.25	0.35	0.48	0.59	0.79	0.96	1.30	1.48	4.93
	(再掲)20歳以上※1	1,229	0.93	0.80	0.032	0.26	0.37	0.47	0.60	0.81	1.04	1.35	1.60	5.57
	(再掲)20歳以上※2	1,229	0.95	0.87	0.038	0.26	0.37	0.47	0.61	0.81	1.06	1.37	1.65	5.63

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンB2(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	1.25	0.72	0.146	0.34	0.53	0.64	0.83	1.08	1.50	2.01	2.13	4.71
	30-39歳	65	1.03	0.61	0.079	0.30	0.35	0.36	0.72	0.98	1.22	1.57	2.20	4.80
	40-49歳	93	1.13	0.56	0.059	0.42	0.58	0.67	0.79	1.01	1.30	1.58	2.20	4.23
	50-59歳	98	1.55	1.58	0.244	0.37	0.51	0.64	0.89	1.25	1.54	2.01	3.88	9.88
	60-69歳	118	1.26	0.61	0.069	0.44	0.48	0.65	0.87	1.21	1.47	1.82	2.19	5.30
	70歳以上	152	1.35	0.65	0.070	0.40	0.52	0.67	0.99	1.29	1.55	1.97	2.58	4.35
	(再掲)20-49歳※1	204	1.12	0.62	0.057	0.32	0.38	0.58	0.78	0.98	1.31	1.66	2.17	4.54
	(再掲)40-74歳※1	357	1.30	0.96	0.083	0.41	0.53	0.64	0.87	1.17	1.45	1.83	2.20	6.44
	(再掲)65-74歳	105	1.27	0.53	0.078	0.31	0.45	0.56	0.93	1.28	1.54	1.84	2.04	4.12
	(再掲)75歳以上	104	1.40	0.73	0.092	0.40	0.51	0.75	1.00	1.28	1.59	2.21	3.04	4.78
	(再掲)20歳以上※1	572	1.27	0.86	0.050	0.35	0.45	0.63	0.85	1.11	1.45	1.87	2.23	4.83
	(再掲)20歳以上※2	572	1.27	0.90	0.054	0.34	0.44	0.62	0.84	1.10	1.45	1.88	2.21	4.85
女性	20-29歳	41	1.21	0.83	0.151	0.33	0.38	0.45	0.77	1.02	1.43	1.82	3.45	4.82
	30-39歳	71	1.14	0.77	0.090	0.21	0.36	0.49	0.68	1.03	1.27	1.63	2.48	5.31
	40-49歳	106	0.95	0.41	0.039	0.16	0.39	0.49	0.69	0.94	1.14	1.44	1.62	2.60
	50-59歳	128	1.26	0.77	0.086	0.39	0.42	0.57	0.88	1.13	1.45	1.88	2.19	5.67
	60-69歳	120	1.25	0.51	0.052	0.40	0.55	0.73	0.91	1.19	1.47	1.83	2.20	3.25
	70歳以上	191	1.25	0.67	0.068	0.26	0.48	0.63	0.90	1.15	1.47	1.80	2.38	4.97
	(再掲)20-49歳※1	218	1.08	0.67	0.054	0.16	0.39	0.49	0.70	0.98	1.25	1.58	1.92	5.03
	(再掲)40-74歳※1	413	1.17	0.58	0.038	0.22	0.49	0.58	0.83	1.09	1.39	1.71	2.16	3.28
	(再掲)65-74歳	118	1.24	0.45	0.039	0.51	0.59	0.73	0.91	1.21	1.47	1.80	2.25	2.79
	(再掲)75歳以上	132	1.25	0.74	0.096	0.26	0.44	0.63	0.89	1.12	1.47	1.80	2.55	5.18
	(再掲)20歳以上※1	657	1.18	0.67	0.041	0.26	0.46	0.56	0.82	1.09	1.39	1.73	2.23	4.84
	(再掲)20歳以上※2	657	1.18	0.69	0.045	0.26	0.43	0.55	0.81	1.08	1.38	1.71	2.22	4.88
男女計	20-29歳	87	1.23	0.78	0.102	0.33	0.40	0.59	0.82	1.06	1.47	1.82	2.13	4.82
	30-39歳	136	1.08	0.69	0.073	0.25	0.36	0.40	0.72	0.98	1.25	1.58	2.25	5.26
	40-49歳	199	1.04	0.50	0.039	0.16	0.48	0.58	0.76	0.97	1.23	1.49	1.93	3.27
	50-59歳	226	1.40	1.25	0.126	0.38	0.50	0.61	0.88	1.19	1.53	1.96	2.90	8.87
	60-69歳	238	1.25	0.56	0.052	0.43	0.53	0.69	0.89	1.21	1.47	1.81	2.17	3.29
	70歳以上	343	1.29	0.66	0.053	0.26	0.52	0.64	0.94	1.19	1.51	1.93	2.52	4.78
	(再掲)20-49歳※1	422	1.10	0.65	0.045	0.26	0.40	0.51	0.75	0.98	1.27	1.62	2.09	4.76
	(再掲)40-74歳※1	770	1.23	0.79	0.048	0.38	0.50	0.62	0.85	1.12	1.43	1.79	2.16	4.29
	(再掲)65-74歳	223	1.25	0.49	0.049	0.42	0.54	0.69	0.92	1.21	1.48	1.81	2.10	2.81
	(再掲)75歳以上	236	1.31	0.74	0.072	0.26	0.45	0.66	0.94	1.18	1.51	1.94	2.66	4.94
	(再掲)20歳以上※1	1,229	1.22	0.77	0.037	0.30	0.45	0.58	0.84	1.10	1.43	1.79	2.23	4.81
	(再掲)20歳以上※2	1,229	1.22	0.80	0.040	0.33	0.44	0.58	0.83	1.09	1.42	1.80	2.21	4.82

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ナイン(mgNE)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	17.9	8.9	1.69	5.0	6.6	8.5	13.1	16.5	20.4	28.7	36.2	64.6
	30-39歳	65	14.0	6.5	0.97	3.7	6.1	6.8	8.7	13.2	18.7	22.1	25.0	42.3
	40-49歳	93	17.7	6.6	0.60	7.6	9.6	10.2	12.8	16.7	21.3	26.9	28.7	41.5
	50-59歳	98	20.3	11.7	1.79	2.8	7.3	8.8	13.0	17.5	24.6	33.1	42.0	67.4
	60-69歳	118	18.2	8.4	0.94	5.9	6.6	8.9	12.1	17.7	23.5	28.4	32.7	54.5
	70歳以上	152	17.0	8.0	0.78	4.3	7.3	9.3	11.3	15.1	20.3	27.9	35.8	43.1
	(再掲)20-49歳※1	204	16.4	7.4	0.74	5.0	6.7	8.4	11.4	15.3	20.0	25.7	28.7	41.7
	(再掲)40-74歳※1	357	18.4	9.0	0.54	5.9	7.6	9.6	12.5	16.4	22.7	28.5	33.6	60.0
	(再掲)65-74歳	105	17.8	8.4	0.79	5.8	6.4	9.3	11.4	15.6	22.5	28.4	33.0	48.4
	(再掲)75歳以上	104	17.2	7.9	0.89	4.4	7.4	9.3	11.5	15.1	20.2	27.9	36.8	40.5
	(再掲)20歳以上※1	572	17.5	8.6	0.42	5.0	7.2	8.7	11.8	15.8	21.4	27.6	32.7	46.4
	(再掲)20歳以上※2	572	17.5	8.7	0.48	4.9	6.8	8.5	11.8	15.8	21.4	27.7	32.9	51.0
女性	20-29歳	41	12.7	5.9	1.22	3.2	4.1	6.6	9.0	12.3	15.0	17.3	25.3	35.9
	30-39歳	71	14.1	7.3	1.08	3.2	5.6	7.1	8.8	12.1	17.2	24.2	30.4	38.9
	40-49歳	106	12.8	4.7	0.43	2.0	4.1	6.3	9.9	12.9	15.5	18.6	19.9	25.8
	50-59歳	128	15.8	6.7	0.63	6.4	7.1	9.3	11.6	14.8	17.5	24.8	32.2	42.4
	60-69歳	120	15.4	6.5	0.75	5.2	7.6	8.4	11.0	14.2	18.4	23.3	27.5	46.1
	70歳以上	191	14.7	6.6	0.57	3.8	6.2	7.7	10.6	13.5	17.4	23.7	27.4	38.1
	(再掲)20-49歳※1	218	13.3	6.0	0.49	3.1	4.4	7.0	9.3	12.6	15.8	19.9	24.2	36.6
	(再掲)40-74歳※1	413	15.0	6.2	0.43	4.0	7.0	8.2	10.9	14.1	17.5	22.8	26.5	35.7
	(再掲)65-74歳	118	15.8	6.8	0.79	5.2	7.6	8.3	10.8	14.3	19.6	24.8	26.7	45.7
	(再掲)75歳以上	132	13.9	6.6	0.63	3.6	5.4	6.7	9.7	12.8	16.9	20.9	28.8	40.9
	(再掲)20歳以上※1	657	14.4	6.5	0.37	3.6	6.3	7.7	10.3	13.5	17.1	22.6	27.1	36.0
	(再掲)20歳以上※2	657	14.3	6.5	0.38	3.5	6.3	7.6	10.2	13.4	17.0	22.0	27.1	36.0
男女計	20-29歳	87	15.4	8.0	1.14	3.2	6.2	7.4	10.1	13.7	18.1	24.8	31.9	64.6
	30-39歳	136	14.1	6.9	0.91	3.5	5.7	7.1	8.8	12.5	17.6	23.7	25.2	39.5
	40-49歳	199	15.3	6.2	0.39	3.3	6.3	8.6	11.2	14.4	18.6	24.3	27.0	36.8
	50-59歳	226	18.1	9.8	1.10	3.2	7.2	8.8	12.5	15.6	21.3	31.0	36.0	62.2
	60-69歳	238	16.8	7.6	0.77	5.2	7.2	8.8	11.5	15.0	20.2	26.1	30.7	49.3
	70歳以上	343	15.7	7.3	0.53	4.5	6.6	8.2	10.8	14.2	19.0	26.4	29.0	40.7
	(再掲)20-49歳※1	422	14.9	6.9	0.54	3.5	6.3	7.7	10.0	13.6	18.1	24.0	27.6	38.6
	(再掲)40-74歳※1	770	16.7	7.9	0.40	4.1	7.2	8.9	11.5	15.0	20.0	26.3	30.9	45.1
	(再掲)65-74歳	223	16.7	7.6	0.64	4.1	7.0	8.9	11.3	15.0	20.6	26.1	30.6	47.7
	(再掲)75歳以上	236	15.3	7.3	0.54	4.5	6.2	7.5	10.5	13.7	18.4	26.1	30.0	40.4
	(再掲)20歳以上※1	1,229	15.9	7.7	0.36	4.0	6.6	8.2	10.9	14.4	19.4	25.7	30.1	41.5
	(再掲)20歳以上※2	1,229	15.9	7.9	0.39	3.7	6.6	8.1	10.8	14.4	19.3	25.7	30.4	41.8

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンB6(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	1.30	0.83	0.154	0.38	0.51	0.58	0.89	1.20	1.45	1.97	2.59	5.44
	30-39歳	65	1.05	0.55	0.066	0.42	0.46	0.57	0.79	0.95	1.19	1.44	1.85	5.26
	40-49歳	93	1.23	0.36	0.032	0.49	0.75	0.87	0.98	1.19	1.41	1.82	1.96	2.21
	50-59歳	98	1.68	1.76	0.289	0.18	0.55	0.75	0.89	1.31	1.66	2.25	4.54	10.62
	60-69歳	118	1.35	0.66	0.067	0.49	0.60	0.71	0.99	1.25	1.58	1.91	2.24	6.06
	70歳以上	152	1.40	0.75	0.075	0.33	0.64	0.68	1.00	1.30	1.67	1.95	2.46	5.63
	(再掲)20-49歳※1	204	1.19	0.58	0.055	0.40	0.53	0.69	0.89	1.08	1.35	1.73	2.03	5.28
	(再掲)40-74歳※1	357	1.40	1.02	0.086	0.45	0.64	0.77	0.97	1.25	1.58	1.93	2.22	7.99
	(再掲)65-74歳	105	1.37	0.54	0.051	0.25	0.57	0.75	1.08	1.30	1.66	1.89	2.15	4.34
	(再掲)75歳以上	104	1.43	0.87	0.105	0.34	0.64	0.66	0.98	1.32	1.67	2.15	2.77	5.92
	(再掲)20歳以上※1	572	1.34	0.93	0.051	0.38	0.57	0.71	0.92	1.20	1.54	1.90	2.27	5.63
	(再掲)20歳以上※2	572	1.34	0.98	0.058	0.37	0.57	0.70	0.90	1.19	1.52	1.90	2.28	5.92
女性	20-29歳	41	1.10	0.85	0.171	0.44	0.44	0.50	0.72	0.99	1.21	1.41	2.52	5.25
	30-39歳	71	1.16	0.97	0.116	0.35	0.45	0.56	0.78	0.95	1.23	1.50	2.04	6.45
	40-49歳	106	0.94	0.36	0.038	0.18	0.34	0.45	0.73	0.93	1.13	1.33	1.55	2.12
	50-59歳	128	1.34	0.94	0.095	0.47	0.65	0.71	0.87	1.19	1.45	1.83	2.16	6.61
	60-69歳	120	1.21	0.43	0.047	0.31	0.60	0.64	0.90	1.19	1.49	1.71	1.95	2.77
	70歳以上	191	1.29	1.04	0.097	0.31	0.54	0.67	0.87	1.14	1.47	1.74	2.00	6.62
	(再掲)20-49歳※1	218	1.06	0.75	0.059	0.19	0.42	0.52	0.75	0.94	1.19	1.41	1.65	5.46
	(再掲)40-74歳※1	413	1.18	0.60	0.037	0.19	0.55	0.64	0.87	1.09	1.39	1.68	1.93	3.21
	(再掲)65-74歳	118	1.25	0.45	0.047	0.48	0.61	0.76	0.93	1.18	1.53	1.81	2.01	2.81
	(再掲)75歳以上	132	1.30	1.23	0.137	0.29	0.47	0.63	0.82	1.12	1.44	1.72	1.95	9.41
	(再掲)20歳以上※1	657	1.19	0.84	0.043	0.30	0.49	0.62	0.84	1.07	1.36	1.67	1.92	5.67
	(再掲)20歳以上※2	657	1.18	0.83	0.043	0.33	0.48	0.61	0.81	1.04	1.34	1.64	1.92	5.66
男女計	20-29歳	87	1.20	0.84	0.125	0.38	0.45	0.58	0.79	1.09	1.34	1.65	2.32	5.44
	30-39歳	136	1.10	0.78	0.077	0.36	0.46	0.57	0.78	0.95	1.23	1.46	1.91	5.98
	40-49歳	199	1.09	0.39	0.029	0.18	0.45	0.62	0.89	1.05	1.29	1.60	1.87	2.15
	50-59歳	226	1.51	1.42	0.159	0.26	0.64	0.74	0.89	1.25	1.55	2.11	2.56	9.83
	60-69歳	238	1.28	0.56	0.047	0.46	0.60	0.71	0.93	1.23	1.55	1.83	2.00	3.09
	70歳以上	343	1.34	0.93	0.066	0.34	0.60	0.68	0.89	1.20	1.55	1.81	2.23	6.03
	(再掲)20-49歳※1	422	1.12	0.67	0.048	0.34	0.47	0.58	0.83	1.03	1.29	1.56	1.90	5.28
	(再掲)40-74歳※1	770	1.29	0.84	0.050	0.26	0.60	0.71	0.91	1.18	1.48	1.82	2.10	5.47
	(再掲)65-74歳	223	1.30	0.49	0.038	0.48	0.61	0.76	0.96	1.24	1.57	1.82	2.02	2.86
	(再掲)75歳以上	236	1.35	1.10	0.091	0.34	0.52	0.65	0.84	1.19	1.55	1.82	2.36	6.13
	(再掲)20歳以上※1	1,229	1.26	0.89	0.037	0.35	0.53	0.65	0.87	1.12	1.44	1.78	2.11	5.65
	(再掲)20歳以上※2	1,229	1.26	0.91	0.042	0.35	0.52	0.64	0.87	1.11	1.42	1.78	2.13	5.65

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンB12(μg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	5.55	4.65	0.61	0.27	0.40	1.80	3.09	4.86	6.37	10.17	15.42	32.70
	30-39歳	65	7.35	8.60	0.85	0.24	0.59	0.79	1.55	3.76	11.50	20.02	23.17	45.79
	40-49歳	93	7.48	9.32	0.83	0.95	1.16	1.54	2.20	4.93	9.01	15.75	21.94	62.95
	50-59歳	98	8.54	7.66	0.70	0.30	1.24	1.75	2.82	5.93	11.86	20.08	24.93	40.19
	60-69歳	118	8.65	7.56	0.70	0.41	0.87	1.11	3.44	5.84	14.05	21.54	24.57	31.25
	70歳以上	152	8.58	8.25	0.64	1.01	1.69	2.00	3.56	6.40	10.30	17.58	23.12	51.60
	(再掲)20-49歳※1	204	6.97	8.16	0.45	0.27	0.76	1.26	2.16	4.57	8.02	16.05	20.95	46.62
	(再掲)40-74歳※1	357	8.10	7.95	0.43	0.61	1.00	1.49	2.82	5.64	10.36	19.14	24.39	40.07
	(再掲)65-74歳	105	8.15	7.40	0.66	0.25	0.82	1.04	2.35	6.40	10.31	21.89	24.51	33.89
	(再掲)75歳以上	104	9.26	9.20	0.83	1.11	1.71	2.05	3.56	6.28	12.18	20.63	25.86	56.60
	(再掲)20歳以上※1	572	7.89	8.02	0.32	0.31	0.96	1.49	2.81	5.43	10.14	18.59	23.64	42.46
	(再掲)20歳以上※2	572	7.74	7.89	0.32	0.30	0.86	1.46	2.75	5.23	9.95	18.46	23.51	41.41
女性	20-29歳	41	4.90	4.55	0.57	0.18	0.38	0.95	2.10	3.64	6.55	9.11	18.12	23.05
	30-39歳	71	6.33	7.19	0.91	0.33	0.39	0.75	1.65	4.03	9.14	15.75	23.54	44.26
	40-49歳	106	5.29	4.68	0.44	0.06	0.79	1.17	2.04	3.58	7.00	15.00	16.08	21.86
	50-59歳	128	7.02	6.83	0.55	0.25	0.99	1.29	2.37	4.34	9.18	17.16	21.55	37.58
	60-69歳	120	7.67	6.40	0.64	0.29	1.29	1.67	3.40	6.02	10.54	15.30	20.57	34.04
	70歳以上	191	7.15	5.51	0.44	0.63	0.96	1.80	3.27	5.60	9.54	14.27	18.27	29.17
	(再掲)20-49歳※1	218	5.57	5.69	0.37	0.06	0.55	0.94	1.93	3.63	7.05	13.72	17.66	24.69
	(再掲)40-74歳※1	413	6.87	6.15	0.39	0.22	0.90	1.46	2.43	4.89	8.76	15.31	17.96	30.71
	(再掲)65-74歳	118	7.51	6.07	0.56	0.59	1.13	1.66	3.49	6.16	8.89	15.26	19.15	31.94
	(再掲)75歳以上	132	6.86	5.10	0.51	0.66	1.31	1.85	3.01	5.52	9.54	14.15	18.32	23.09
	(再掲)20歳以上※1	657	6.61	6.00	0.26	0.27	0.85	1.39	2.40	4.85	8.59	15.09	18.25	27.94
	(再掲)20歳以上※2	657	6.43	6.06	0.27	0.21	0.78	1.18	2.29	4.42	8.19	15.09	18.36	27.43
男女計	20-29歳	87	5.23	4.59	0.45	0.18	0.45	1.09	2.38	4.22	6.45	8.74	13.97	32.70
	30-39歳	136	6.85	7.93	0.76	0.24	0.55	0.78	1.62	3.85	9.25	19.77	22.59	44.94
	40-49歳	199	6.40	7.47	0.54	0.06	0.95	1.43	2.12	4.17	7.95	15.07	17.90	49.83
	50-59歳	226	7.78	7.28	0.54	0.29	1.07	1.46	2.75	5.08	10.36	19.55	23.84	33.75
	60-69歳	238	8.15	7.00	0.57	0.42	0.96	1.47	3.44	5.98	11.50	17.76	24.31	33.14
	70歳以上	343	7.74	6.81	0.41	0.69	1.50	1.91	3.41	6.08	9.91	15.09	20.73	33.91
	(再掲)20-49歳※1	422	6.28	7.09	0.38	0.21	0.73	0.99	2.05	4.04	7.57	15.07	20.26	36.19
	(再掲)40-74歳※1	770	7.47	7.11	0.34	0.30	0.97	1.47	2.74	5.24	9.84	16.24	21.90	30.97
	(再掲)65-74歳	223	7.79	6.69	0.48	0.36	0.94	1.34	3.29	6.35	10.25	16.04	23.82	30.34
	(再掲)75歳以上	236	7.84	7.14	0.44	0.71	1.65	2.02	3.31	5.71	9.97	15.85	21.20	39.37
	(再掲)20歳以上※1	1,229	7.22	7.07	0.25	0.31	0.88	1.44	2.59	5.06	9.29	16.02	21.14	33.11
	(再掲)20歳以上※2	1,229	7.09	7.06	0.27	0.29	0.86	1.37	2.43	4.90	8.95	16.03	21.15	33.08

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

葉酸(μg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	276	140	27.6	87	104	121	192	243	335	517	608	698
	30-39歳	65	256	158	17.5	68	92	120	182	228	300	382	459	1,313
	40-49歳	93	287	133	14.3	79	139	157	211	275	331	385	477	1,036
	50-59歳	98	320	135	16.3	40	140	159	215	308	423	525	584	656
	60-69歳	118	364	161	15.2	113	139	181	248	348	444	563	682	887
	70歳以上	152	372	154	14.8	94	156	199	272	354	463	528	657	982
	(再掲)20-49歳※1	204	273	144	10.5	72	108	135	199	244	321	389	491	989
	(再掲)40-74歳※1	357	331	147	7.2	95	148	168	231	306	406	524	587	820
	(再掲)65-74歳	105	388	164	12.2	76	146	178	275	361	490	605	692	919
	(再掲)75歳以上	104	369	161	20.2	97	157	184	263	355	443	514	665	1,028
	(再掲)20歳以上※1	572	319	154	7.2	82	131	156	215	294	386	505	584	859
	(再掲)20歳以上※2	572	313	153	7.6	80	125	154	213	287	378	500	584	838
女性	20-29歳	41	248	101	18.0	54	67	116	167	251	311	380	409	514
	30-39歳	71	273	146	17.5	47	116	140	167	254	343	412	470	1,225
	40-49歳	106	246	97	10.0	51	83	126	188	240	291	364	402	626
	50-59歳	128	337	142	15.7	123	146	185	246	303	422	532	591	860
	60-69歳	120	383	171	19.7	96	161	190	278	356	454	609	679	1,019
	70歳以上	191	349	134	10.4	115	149	195	261	345	425	520	587	856
	(再掲)20-49歳※1	218	256	118	8.5	52	86	129	185	245	324	373	421	597
	(再掲)40-74歳※1	413	335	153	10.7	69	141	179	231	312	397	521	619	890
	(再掲)65-74歳	118	387	153	13.8	163	193	221	282	364	458	609	654	875
	(再掲)75歳以上	132	332	124	10.5	94	126	169	257	317	405	509	558	688
	(再掲)20歳以上※1	657	318	145	9.0	70	127	157	224	297	386	497	578	851
	(再掲)20歳以上※2	657	308	144	9.3	56	123	150	214	285	372	477	566	850
男女計	20-29歳	87	263	123	18.2	54	90	121	180	244	327	403	526	698
	30-39歳	136	264	152	15.0	60	103	134	174	239	318	397	460	1,264
	40-49歳	199	267	118	9.1	59	101	154	200	253	323	378	415	765
	50-59歳	226	328	138	13.7	92	146	167	230	307	422	530	584	726
	60-69歳	238	374	166	15.2	97	155	182	255	355	452	593	668	969
	70歳以上	343	359	143	10.6	112	156	196	264	348	432	521	607	865
	(再掲)20-49歳※1	422	265	132	7.6	57	104	135	190	244	322	382	458	711
	(再掲)40-74歳※1	770	333	150	8.0	75	146	176	231	308	403	524	608	853
	(再掲)65-74歳	223	388	158	10.9	108	179	201	280	364	470	608	671	856
	(再掲)75歳以上	236	347	141	12.0	112	134	184	259	331	424	515	564	911
	(再掲)20歳以上※1	1,229	318	150	7.3	74	128	157	221	296	386	502	584	851
	(再掲)20歳以上※2	1,229	310	149	7.5	69	123	152	213	286	373	492	577	832

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

パントテン酸(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	5.87	1.98	0.383	2.26	2.98	3.72	4.54	5.34	6.95	9.03	9.88	11.21
	30-39歳	65	5.19	1.81	0.270	2.39	2.94	3.19	3.99	4.92	5.75	7.25	8.64	13.65
	40-49歳	93	5.97	1.67	0.215	2.90	3.82	4.06	4.55	5.94	6.92	7.95	9.08	11.70
	50-59歳	98	6.01	1.94	0.237	1.82	3.34	3.67	4.49	5.96	7.27	8.34	9.57	11.46
	60-69歳	118	6.00	1.98	0.199	2.37	2.66	3.55	4.54	6.06	7.05	8.54	9.80	13.10
	70歳以上	152	6.03	1.94	0.184	2.52	3.02	3.81	4.84	5.81	7.23	8.21	9.54	12.98
	(再掲)20-49歳※1	204	5.66	1.83	0.172	2.38	3.17	3.67	4.45	5.37	6.66	7.96	9.22	11.55
	(再掲)40-74歳※1	357	6.01	1.84	0.130	2.22	3.32	3.85	4.61	6.03	7.19	8.18	9.39	11.55
	(再掲)65-74歳	105	6.19	1.86	0.223	1.30	2.76	3.85	4.95	6.21	7.44	8.19	9.69	12.26
	(再掲)75歳以上	104	5.96	2.05	0.230	2.53	2.97	3.81	4.70	5.58	7.08	8.41	9.66	13.33
	(再掲)20歳以上※1	572	5.86	1.90	0.125	2.37	3.12	3.70	4.58	5.62	6.90	8.20	9.50	11.66
	(再掲)20歳以上※2	572	5.84	1.91	0.131	2.36	3.12	3.67	4.51	5.60	6.89	8.20	9.51	11.60
女性	20-29歳	41	4.90	1.43	0.283	2.12	2.43	2.94	3.92	4.90	5.97	6.96	7.22	7.53
	30-39歳	71	5.16	1.77	0.259	1.41	2.71	3.33	3.96	5.11	5.76	7.55	9.00	11.96
	40-49歳	106	4.76	1.52	0.162	1.14	1.89	2.76	3.72	4.89	5.62	6.71	7.52	8.08
	50-59歳	128	5.42	1.64	0.163	1.61	2.47	3.32	4.19	5.38	6.54	7.44	8.46	9.19
	60-69歳	120	5.46	1.60	0.156	2.16	2.53	3.42	4.52	5.39	6.73	7.59	8.38	9.54
	70歳以上	191	5.32	1.70	0.144	1.71	2.84	3.24	4.21	5.26	6.37	7.50	8.50	10.09
	(再掲)20-49歳※1	218	4.94	1.60	0.136	1.70	2.44	2.88	3.89	4.91	5.78	7.16	7.59	9.44
	(再掲)40-74歳※1	413	5.27	1.63	0.111	1.78	2.53	3.28	4.22	5.27	6.34	7.46	8.19	9.55
	(再掲)65-74歳	118	5.53	1.61	0.145	2.42	3.34	3.54	4.25	5.40	6.65	7.70	8.45	10.10
	(再掲)75歳以上	132	5.23	1.70	0.140	1.71	2.69	3.04	4.08	5.20	6.29	7.46	8.45	9.95
	(再掲)20歳以上※1	657	5.21	1.65	0.107	1.72	2.59	3.13	4.12	5.19	6.23	7.42	8.08	9.51
	(再掲)20歳以上※2	657	5.18	1.63	0.112	1.72	2.48	3.07	4.06	5.18	6.16	7.29	8.00	9.40
男女計	20-29歳	87	5.40	1.80	0.249	2.17	2.47	3.07	4.22	5.17	6.26	7.82	9.08	11.21
	30-39歳	136	5.17	1.79	0.227	1.88	2.79	3.24	3.99	5.01	5.75	7.36	8.57	12.72
	40-49歳	199	5.38	1.71	0.153	1.38	2.76	3.32	4.33	5.29	6.43	7.66	8.05	10.61
	50-59歳	226	5.71	1.81	0.171	1.74	2.94	3.39	4.45	5.63	6.87	8.16	8.74	10.36
	60-69歳	238	5.72	1.81	0.149	2.24	2.62	3.47	4.52	5.64	6.75	8.00	8.68	10.65
	70歳以上	343	5.62	1.83	0.143	1.72	2.87	3.41	4.28	5.58	6.64	7.89	8.82	11.08
	(再掲)20-49歳※1	422	5.31	1.76	0.130	1.82	2.72	3.26	4.16	5.16	6.20	7.54	8.42	11.20
	(再掲)40-74歳※1	770	5.63	1.77	0.102	1.83	2.86	3.48	4.40	5.54	6.74	7.96	8.56	10.10
	(再掲)65-74歳	223	5.82	1.75	0.151	1.85	3.29	3.57	4.41	5.72	6.84	8.09	8.73	10.09
	(再掲)75歳以上	236	5.52	1.88	0.154	1.71	2.84	3.17	4.27	5.46	6.44	7.74	8.84	12.30
	(再掲)20歳以上※1	1,229	5.52	1.80	0.101	1.81	2.85	3.39	4.28	5.37	6.55	7.80	8.64	10.82
	(再掲)20歳以上※2	1,229	5.51	1.81	0.104	1.87	2.81	3.37	4.28	5.35	6.53	7.80	8.68	10.85

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

ビタミンC(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	80	51	9	2	9	21	49	69	103	134	183	294
	30-39歳	65	65	36	5	13	19	26	36	54	84	108	140	186
	40-49歳	93	76	41	4	5	22	24	47	75	91	119	152	234
	50-59歳	98	96	64	8	1	25	32	49	84	125	191	221	329
	60-69歳	118	109	71	6	18	21	32	56	96	148	203	240	449
	70歳以上	152	118	71	7	10	29	42	63	102	153	230	253	334
	(再掲)20-49歳※1	204	73	42	3	4	18	26	45	69	92	119	151	230
	(再掲)40-74歳※1	357	98	64	3	11	22	32	51	84	124	179	223	309
	(再掲)65-74歳	105	123	77	6	9	20	27	73	117	161	223	281	473
	(再掲)75歳以上	104	116	70	10	9	29	43	60	103	152	230	250	336
	(再掲)20歳以上※1	572	93	62	3	9	22	31	50	82	119	177	219	303
	(再掲)20歳以上※2	572	91	60	3	8	22	31	49	80	118	172	213	302
女性	20-29歳	41	89	57	10	3	19	25	47	90	120	157	194	324
	30-39歳	71	82	55	6	5	16	26	36	77	113	139	159	321
	40-49歳	106	74	49	6	4	8	20	40	65	98	123	183	242
	50-59歳	128	109	72	8	22	32	42	53	95	138	222	251	363
	60-69歳	120	127	67	7	19	27	53	77	117	164	231	252	325
	70歳以上	191	125	79	7	24	35	49	69	115	164	222	256	461
	(再掲)20-49歳※1	218	81	53	3	4	15	23	40	71	107	139	174	280
	(再掲)40-74歳※1	413	107	66	4	6	24	36	60	92	144	205	243	310
	(再掲)65-74歳	118	129	66	6	21	38	59	71	117	176	231	255	292
	(再掲)75歳以上	132	126	86	9	11	33	42	72	107	162	226	260	610
	(再掲)20歳以上※1	657	106	70	4	6	24	33	59	92	139	201	242	315
	(再掲)20歳以上※2	657	102	67	4	5	22	31	55	89	132	194	235	318
男女計	20-29歳	87	84	54	6	2	12	25	48	74	115	156	185	324
	30-39歳	136	73	47	4	10	17	26	36	60	99	131	150	288
	40-49歳	199	75	45	4	4	15	22	46	71	92	123	158	235
	50-59歳	226	103	68	7	8	28	36	50	85	132	212	247	339
	60-69歳	238	119	69	5	18	25	36	68	111	158	206	244	317
	70歳以上	343	122	76	7	17	34	43	67	108	158	225	254	330
	(再掲)20-49歳※1	422	77	48	2	4	16	25	43	69	101	133	161	245
	(再掲)40-74歳※1	770	103	65	3	8	22	34	57	86	135	195	234	308
	(再掲)65-74歳	223	127	71	5	18	26	41	72	117	167	229	256	319
	(再掲)75歳以上	236	122	80	8	14	33	43	67	105	157	226	254	400
	(再掲)20歳以上※1	1,229	100	66	3	8	23	33	54	84	129	189	231	308
	(再掲)20歳以上※2	1,229	96	64	3	6	22	31	52	83	123	183	226	307

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。