

高血圧及び正常高値の者の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	高血圧有病者及び正常高値		高血圧有病者		正常高値	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	15	11.7	9.8	5.8	4.9	5.8	4.9
	30-39歳	25	31.0	11.0	4.2	4.3	26.7	10.7
	40-49歳	39	54.5	9.4	37.0	9.0	17.6	5.8
	50-59歳	41	63.8	10.9	50.9	10.5	12.9	5.1
	60-69歳	70	79.2	4.9	74.3	5.2	4.9	3.0
	70歳以上	114	79.9	5.0	68.3	5.3	11.6	3.2
	(再掲)20歳以上※	304	56.0	4.4	43.2	3.2	12.7	2.3
	(再掲)65-74歳	90	77.1	6.4	70.5	6.2	6.6	2.0
	(再掲)75歳以上	66	80.9	5.4	68.0	6.9	12.9	4.6
	(再掲)40-74歳※	198	68.1	6.2	56.7	5.3	11.4	2.1
女性	20-29歳	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	10.2	5.2	2.1	2.1	8.1	3.9
	40-49歳	50	28.7	7.3	13.7	4.3	15.0	4.1
	50-59歳	77	41.2	6.1	33.5	6.4	7.8	2.6
	60-69歳	111	66.2	4.5	46.5	5.1	19.7	6.3
	70歳以上	129	80.0	4.8	68.8	4.6	11.1	2.7
	(再掲)20歳以上※	438	45.4	3.3	34.6	2.7	10.9	1.7
	(再掲)65-74歳	117	68.8	5.8	52.2	5.0	16.6	4.6
	(再掲)75歳以上	92	84.5	4.8	74.9	5.0	9.7	2.9
	(再掲)40-74歳※	275	49.6	4.6	35.0	3.2	14.6	3.1
総数	20-29歳	34	6.0	5.7	3.0	2.8	3.0	2.8
	30-39歳	77	20.8	6.3	3.2	2.3	17.6	5.9
	40-49歳	89	41.8	4.3	25.5	4.6	16.3	3.4
	50-59歳	118	52.4	6.0	42.1	6.5	10.3	2.8
	60-69歳	181	72.6	2.5	60.2	4.0	12.4	2.9
	70歳以上	243	79.9	3.5	68.6	3.5	11.3	2.4
	(再掲)20歳以上※	742	50.5	2.6	38.7	2.1	11.8	1.2
	(再掲)65-74歳	207	72.8	3.7	60.9	4.3	11.9	2.4
	(再掲)75歳以上	158	83.2	3.9	72.3	4.5	10.8	2.9
	(再掲)40-74歳※	473	58.9	3.2	45.9	3.3	13.0	1.4

注)

- ・問診項目「血圧を下げる薬の服薬状況」に回答している者を集計対象とした。
- ・「高血圧症」及び「正常高値」は日本高血圧学会(2009年)による血圧の分類で判定。
- ・「高血圧症」は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、または血圧を下げる薬を服用している者とした。
- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のH28人口に合わせるための重み付けをした値。

血圧の平均値(20歳以上)

最低血圧(血圧を下げる薬服用者を含む)

(mmHg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	15	73.7	8.2	1.9	67.3	74.7	80.0	19	69.5	6.8	1.4	67.0	70.1	74.9
30-39歳	25	75.3	10.5	2.3	68.2	74.4	85.1	52	70.4	9.7	1.9	62.8	70.0	77.8
40-49歳	39	85.6	10.8	2.0	74.9	85.0	93.2	50	74.0	9.0	0.9	67.3	73.0	82.0
50-59歳	42	85.0	11.4	2.5	76.8	84.7	96.2	77	79.0	11.6	1.7	71.7	78.9	84.8
60-69歳	70	82.1	10.9	1.4	75.0	80.0	89.5	111	78.5	10.1	1.0	72.0	80.0	85.0
70歳以上	114	76.6	10.8	1.4	70.0	77.0	82.3	129	75.5	9.8	0.7	70.0	75.0	81.0
(再掲)20歳以上※	305	79.7	11.3	0.8	73.0	79.2	87.0	438	74.8	10.1	0.7	69.0	74.0	81.0
(再掲)40-74歳※	199	83.6	10.7	1.2	75.0	82.0	91.0	275	77.1	10.4	0.8	70.0	78.0	83.0
(再掲)40-89歳※	260	81.9	11.4	0.9	74.0	81.0	89.0	362	76.5	10.2	0.6	70.0	76.0	82.0

最高血圧(血圧を下げる薬服用者を含む)

(mmHg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	15	115.2	12.0	3.3	106.4	113.7	120.4	19	106.7	9.6	2.0	99.0	106.2	113.0
30-39歳	25	113.3	13.8	2.9	105.0	113.0	126.7	52	108.1	12.5	2.2	98.5	104.8	118.0
40-49歳	39	126.0	12.7	2.1	118.6	124.0	133.0	50	116.5	14.2	2.3	104.9	115.8	127.1
50-59歳	42	130.2	13.8	2.6	121.0	129.0	138.7	77	123.2	18.5	2.8	108.8	122.0	133.0
60-69歳	70	134.0	16.8	2.1	123.0	130.0	146.0	111	131.1	15.2	1.5	123.3	130.0	140.2
70歳以上	114	135.1	17.6	1.9	124.0	134.0	146.0	129	134.8	16.7	1.6	122.5	133.0	142.2
(再掲)20歳以上※	305	126.7	17.0	1.1	115.0	125.0	137.0	438	122.8	18.6	1.2	107.0	122.0	134.0
(再掲)40-74歳※	199	131.1	14.9	1.4	121.0	129.0	142.0	275	125.2	17.5	1.4	112.0	126.0	135.0
(再掲)40-89歳※	260	131.6	15.8	1.3	121.0	129.0	142.0	362	128.1	17.7	1.2	115.0	128.0	138.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

最低血圧(血圧を下げる薬服用者を除外)

(mmHg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	15	73.7	8.2	1.9	67.3	74.7	80.0	19	69.5	6.8	1.4	67.0	70.0	74.9
30-39歳	25	75.3	10.5	2.3	68.2	74.4	85.1	52	70.4	9.7	1.9	62.8	70.0	77.8
40-49歳	35	84.5	10.7	2.0	74.0	82.2	91.0	47	73.5	9.1	1.0	66.5	72.4	82.0
50-59歳	32	85.1	11.4	2.7	76.2	85.0	96.2	67	78.1	12.3	2.1	70.0	75.6	83.0
60-69歳	35	82.0	12.1	2.3	75.0	80.0	89.3	72	78.7	10.9	1.2	72.0	80.0	85.0
70歳以上	53	78.2	11.0	2.0	72.0	78.0	84.7	50	76.1	10.0	1.4	69.4	73.0	80.8
(再掲)20歳以上※	195	79.5	11.3	0.8	73.0	79.0	87.0	307	74.2	10.4	0.8	68.0	73.0	80.0
(再掲)40-74歳※	126	83.6	10.9	1.5	75.0	82.0	91.0	210	76.6	10.9	0.9	69.0	77.0	82.4
(再掲)40-89歳※	152	82.8	11.3	1.2	74.0	81.6	90.0	235	76.4	10.7	0.8	69.0	75.0	82.0

最高血圧(血圧を下げる薬服用者を除外)

(mmHg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	15	115.2	12.0	3.3	106.4	113.7	120.4	19	106.7	9.6	2.0	99.0	106.2	113.0
30-39歳	25	113.3	13.8	2.9	105.0	113.0	126.7	52	108.1	12.5	2.2	98.5	104.8	118.0
40-49歳	35	125.4	12.2	2.2	116.8	124.1	132.9	47	115.9	14.5	2.4	103.7	115.1	127.7
50-59歳	32	129.9	12.4	2.6	120.4	129.0	141.2	67	122.0	19.6	3.2	108.0	113.6	133.0
60-69歳	35	134.3	16.0	2.0	120.5	132.3	146.3	72	127.7	15.2	2.0	119.1	128.0	137.0
70歳以上	53	133.4	19.0	2.8	122.3	132.8	146.4	50	132.0	15.9	2.1	121.0	130.3	139.4
(再掲)20歳以上※	195	124.0	16.1	1.2	111.9	122.0	133.0	307	118.3	17.4	1.3	105.0	116.0	129.0
(再掲)40-74歳※	126	129.7	13.9	1.8	120.0	128.0	139.0	210	122.8	17.3	1.7	111.0	122.0	133.0
(再掲)40-89歳※	152	130.0	15.0	1.6	120.0	128.5	140.0	235	124.0	17.4	1.5	112.0	122.6	134.0

注)

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出して値

・問診において「血圧を下げる薬の服用状況」を回答した者を集計対象とした

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

血圧の分布

最低血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)
								20歳以上	40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	1	2	0	0	0	7	10	0
	60-69	4	6	0	3	7	20	40	14
	70-79	5	9	12	9	17	47	99	56
	80-89	5	7	11	15	26	28	92	71
	90-99	0	1	12	10	17	9	49	45
	100-109	0	0	3	4	2	2	11	10
	110-119	0	0	1	1	0	1	3	2
	120-129	0	0	0	0	1	0	1	1
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		15	25	39	42	70	114	305
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	1	0	0	2	1
	50-59	1	3	2	0	3	6	15	6
	60-69	5	18	13	12	14	27	89	46
	70-79	12	21	19	25	40	53	170	100
	80-89	0	9	14	28	40	25	116	90
	90-99	0	0	2	6	11	17	36	24
	100-109	0	1	0	3	3	1	8	6
	110-119	0	0	0	1	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	1	0	0	1	1
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		19	52	50	77	111	129	438

最高血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)	(再掲)	
								20歳以上	40-74歳	
男性	90mmHg未満	0	1	0	0	0	0	1	0	
	90-99	0	3	0	0	1	2	6	1	
	100-109	5	5	3	3	1	5	22	8	
	110-119	6	9	6	4	9	7	41	22	
	120-129	3	2	13	15	19	28	80	60	
	130-139	0	5	11	9	11	31	67	44	
	140-149	0	0	4	6	15	21	46	36	
	150-159	1	0	2	4	6	10	23	15	
	160-169	0	0	0	0	7	8	15	11	
	170-179	0	0	0	1	1	0	2	2	
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	2	2	0	
	総数		15	25	39	42	70	114	305	199
	女性	90mmHg未満	0	2	1	0	0	0	3	1
90-99		5	10	4	4	4	0	27	12	
100-109		8	19	13	14	4	8	66	35	
110-119		4	11	15	19	14	13	76	53	
120-129		2	7	9	17	35	26	96	68	
130-139		0	3	6	10	26	37	82	52	
140-149		0	0	2	5	16	20	43	28	
150-159		0	0	0	4	8	13	25	15	
160-169		0	0	0	2	3	5	10	5	
170-179		0	0	0	1	0	5	6	3	
180mmHg以上		0	0	0	1	1	2	4	3	
総数			19	52	50	77	111	129	438	275

最低血圧の分布(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外) (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	1	2	0	0	0	3	6	0
	60-69	4	6	0	2	4	8	24	7
	70-79	5	9	12	6	10	20	62	38
	80-89	5	7	10	12	11	15	60	43
	90-99	0	1	10	9	8	5	33	30
	100-109	0	0	2	2	1	1	6	5
	110-119	0	0	1	1	0	1	3	2
	120-129	0	0	0	0	1	0	1	1
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		15	25	35	32	35	53	195
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	1	0	0	1	0	0	2	1
	50-59	1	3	2	0	3	1	10	6
	60-69	5	18	13	12	12	12	72	42
	70-79	12	21	19	24	18	22	116	72
	80-89	0	9	11	20	30	7	77	64
	90-99	0	0	2	5	7	7	21	18
	100-109	0	1	0	3	2	1	7	5
	110-119	0	0	0	1	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	1	0	0	1	1
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		19	52	47	67	72	50	307

最高血圧の分布(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外) (人)

性別	区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	90mmHg未満	0	1	0	0	0	0	1	0
	90-99	0	3	0	0	0	2	5	0
	100-109	5	5	3	1	1	3	18	6
	110-119	6	9	6	4	7	4	36	19
	120-129	3	2	11	12	8	12	48	40
	130-139	0	5	11	6	4	15	41	26
	140-149	0	0	3	6	9	7	25	21
	150-159	1	0	1	3	2	5	12	8
	160-169	0	0	0	0	4	3	7	6
	170-179	0	0	0	0	0	0	0	0
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	2	2	0
	総数		15	25	35	32	35	53	195
女性	90mmHg未満	0	2	1	0	0	0	3	1
	90-99	5	10	4	4	4	0	27	12
	100-109	8	19	13	14	4	2	60	32
	110-119	4	11	15	18	13	8	69	51
	120-129	2	7	6	12	22	11	60	45
	130-139	0	3	6	8	15	16	48	35
	140-149	0	0	2	3	9	6	20	18
	150-159	0	0	0	4	3	4	11	9
	160-169	0	0	0	2	1	1	4	3
	170-179	0	0	0	1	0	1	2	2
	180mmHg以上	0	0	0	1	1	1	3	2
	総数		19	52	47	67	72	50	307

血圧の状況(各分類に該当する人)

血圧の状況(血圧を下げる薬服用者を含む)

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	20-29歳	15	8	5	1	1	0	0	1
	30-39歳	25	16	1	7	1	0	0	0
	40-49歳	39	6	9	7	13	3	1	1
	50-59歳	42	6	10	9	11	5	1	2
	60-69歳	70	8	17	12	24	8	1	13
	70歳以上	114	13	25	34	31	9	2	29
	(再掲)20歳以上	305	57	67	70	81	25	5	46
	(再掲)40-74歳	199	23	46	44	63	20	3	28
女性	20-29歳	19	17	2	0	0	0	0	0
	30-39歳	52	38	8	5	0	1	0	0
	40-49歳	50	30	10	7	3	0	0	1
	50-59歳	77	31	20	10	10	4	2	4
	60-69歳	111	20	30	27	29	4	1	19
	70歳以上	129	20	26	33	37	11	2	32
	(再掲)20歳以上	438	156	96	82	79	20	5	56
	(再掲)40-74歳	275	90	67	53	51	10	4	31
総数	20-29歳	34	25	7	1	1	0	0	1
	30-39歳	77	54	9	12	1	1	0	0
	40-49歳	89	36	19	14	16	3	1	2
	50-59歳	119	37	30	19	21	9	3	6
	60-69歳	181	28	47	39	53	12	2	32
	70歳以上	243	33	51	67	68	20	4	61
	(再掲)20歳以上	743	213	163	152	160	45	10	102
	(再掲)40-74歳	474	113	113	97	114	30	7	59

血圧の状況(「血圧を下げる薬服用状況」に回答した者を集計対象とし血圧を下げる薬服用者を除外)

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	20-29歳	15	8	5	1	1	0	0	1
	30-39歳	25	16	1	7	1	0	0	0
	40-49歳	35	6	9	7	10	2	1	0
	50-59歳	32	4	8	6	11	2	1	2
	60-69歳	35	7	7	4	12	4	1	7
	70歳以上	53	9	10	16	12	4	2	11
	(再掲)20歳以上	195	50	40	41	47	12	5	21
	(再掲)40-74歳	126	20	31	23	39	10	3	14
女性	20-29歳	19	17	2	0	0	0	0	0
	30-39歳	52	38	8	5	0	1	0	0
	40-49歳	47	30	8	6	3	0	0	1
	50-59歳	67	31	15	7	8	4	2	3
	60-69歳	72	20	18	16	16	1	1	9
	70歳以上	50	10	11	15	10	3	1	6
	(再掲)20歳以上	307	146	62	49	37	9	4	19
	(再掲)40-74歳	210	87	46	34	34	6	3	17
総数	20-29歳	34	25	7	1	1	0	0	1
	30-39歳	77	54	9	12	1	1	0	0
	40-49歳	82	36	17	13	13	2	1	1
	50-59歳	99	35	23	13	19	6	3	5
	60-69歳	107	27	25	20	28	5	2	16
	70歳以上	103	19	21	31	22	7	3	17
	(再掲)20歳以上	502	196	102	90	84	21	9	40
	(再掲)40-74歳	336	107	77	57	73	16	6	31

「糖尿病が強く疑われる者」及び「可能性を否定できない者」の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる者」及び 「可能性を否定できない者」		強く疑われる者※1		可能性を否定できない者※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	24	4.4	4.4	0.0	0.0	4.4	4.4
	40-49歳	36	7.6	4.6	5.1	3.8	2.4	2.5
	50-59歳	40	26.7	7.6	13.6	4.6	13.2	5.7
	60-69歳	70	36.0	7.5	28.6	7.5	7.5	2.8
	70歳以上	108	44.1	5.2	25.8	4.9	18.3	4.6
	(再掲)20歳以上※3	292	22.1	2.7	13.8	2.2	8.3	1.9
	(再掲)65-74歳	87	40.5	4.9	28.7	4.6	11.8	3.6
	(再掲)75歳以上	63	46.1	7.0	24.1	5.8	22.0	6.0
	(再掲)40-74歳※3	191	26.7	4.4	18.3	3.1	8.4	2.7
女性	20-29歳	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	50	7.1	4.0	5.0	3.6	2.2	2.1
	40-49歳	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	77	10.7	3.0	2.0	1.4	8.7	2.9
	60-69歳	106	37.6	6.7	17.0	4.5	20.6	5.0
	70歳以上	119	35.5	5.0	17.1	3.4	18.3	4.3
	(再掲)20歳以上※3	416	18.7	2.3	8.6	1.5	10.2	1.9
	(再掲)65-74歳	111	36.4	5.8	17.6	4.4	18.8	4.5
	(再掲)75歳以上	84	34.9	5.7	18.0	4.3	16.8	4.6
	(再掲)40-74歳※3	263	20.6	3.3	8.3	2.1	12.3	2.6
総数	20-29歳	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	74	5.7	3.1	2.4	1.9	3.3	2.5
	40-49歳	81	4.0	2.3	2.7	1.9	1.3	1.3
	50-59歳	117	18.6	3.9	7.7	2.2	10.9	3.0
	60-69歳	176	36.8	5.6	22.8	4.8	14.0	3.2
	70歳以上	227	39.2	3.8	20.9	3.3	18.3	3.4
	(再掲)20歳以上※3	708	20.4	1.9	11.1	1.4	9.3	1.5
	(再掲)65-74歳	198	38.4	4.2	22.9	3.4	15.4	3.3
	(再掲)75歳以上	147	39.2	4.1	20.4	3.4	18.8	3.8
	(再掲)40-74歳※3	454	23.7	3.0	13.4	2.0	10.4	2.1

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※1 強く疑われる者:HbA1c(NGSP)6.5%以上または「糖尿病治療の有無」(問診)に「有」と回答した者

※2 可能性を否定できない者:HbA1c(NGSP)6.0%以上6.5%未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

脂質異常症が疑われる者の割合				(%)
性別	年齢区分	総数	脂質異常症が疑われる者	標準誤差
男性	20-29歳	14	7.7	7.7
	30-39歳	24	5.7	5.6
	40-49歳	36	16.6	6.1
	50-59歳	41	25.1	7.7
	60-69歳	70	31.5	5.4
	70歳以上	109	27.3	4.4
	(再掲)20歳以上※	294	20.1	2.4
	(再掲)65-74歳	87	33.3	5.4
	(再掲)75歳以上	64	26.1	6.0
	(再掲)40-74歳※	192	25.4	3.2
女性	20-29歳	19	0.0	0.0
	30-39歳	50	3.5	2.5
	40-49歳	45	6.7	4.8
	50-59歳	77	14.7	5.4
	60-69歳	107	34.2	4.3
	70歳以上	121	33.7	5.0
	(再掲)20歳以上※	419	18.8	2.4
	(再掲)65-74歳	113	40.4	4.8
	(再掲)75歳以上	85	30.9	6.2
	(再掲)40-74歳※	265	22.9	3.4
総数	20-29歳	33	3.9	3.8
	30-39歳	74	4.6	3.0
	40-49歳	81	11.9	3.7
	50-59歳	118	19.9	4.6
	60-69歳	177	32.8	3.2
	70歳以上	230	30.9	3.4
	(再掲)20歳以上※	713	19.5	1.9
	(再掲)65-74歳	200	37.0	3.2
	(再掲)75歳以上	149	29.0	4.9
	(再掲)40-74歳※	457	24.2	2.5

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ・HDLコレステロール値が40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬を服用または中性脂肪を下げる薬を服用

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口に合わせるための重み付けをして算出した値

メタボリックシンドロームが強く疑われる者及び予備群と考えられる者の割合

(%)

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる		予備群	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	12.4	11.0	0.0	0.0	12.4	11.0
	30-39歳	24	21.5	8.3	0.0	0.0	21.5	8.3
	40-49歳	36	39.4	7.9	9.5	5.1	29.9	7.0
	50-59歳	40	52.2	10.0	32.4	8.5	19.8	6.7
	60-69歳	69	50.9	6.4	29.1	5.9	21.8	5.9
	70歳以上	108	57.3	4.6	32.2	3.8	25.0	3.6
	(再掲)20歳以上※3	291	40.8	3.0	18.7	1.8	22.0	3.0
	(再掲)65-74歳	87	59.7	5.4	37.5	4.4	22.2	4.0
	(再掲)75歳以上	63	54.7	5.8	26.6	5.0	28.0	6.1
(再掲)40-74歳※3	190	49.6	4.8	26.3	3.9	23.4	3.4	
女性	20-29歳	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	5.5	3.0	2.2	2.2	3.3	2.3
	40-49歳	44	3.5	2.5	1.3	1.4	2.1	2.1
	50-59歳	77	9.1	3.3	3.8	2.7	5.3	2.2
	60-69歳	106	24.0	4.6	17.4	3.1	6.7	2.7
	70歳以上	119	25.9	5.1	12.7	3.1	13.2	3.7
	(再掲)20歳以上※3	412	14.0	2.1	7.6	1.3	6.4	1.3
	(再掲)65-74歳	111	26.5	4.4	17.7	3.1	8.8	3.5
	(再掲)75歳以上	84	26.2	5.6	12.9	3.5	13.2	4.0
(再掲)40-74歳※3	262	15.1	2.6	8.9	1.8	6.2	1.8	
総数	20-29歳	32	6.4	6.2	0.0	0.0	6.4	6.2
	30-39歳	72	13.8	4.5	1.1	1.1	12.7	4.6
	40-49歳	80	22.6	4.9	5.7	2.9	16.9	4.3
	50-59歳	117	30.3	5.8	17.9	4.1	12.4	3.4
	60-69歳	175	37.5	4.7	23.3	3.4	14.2	3.5
	70歳以上	227	39.4	3.2	21.1	2.5	18.3	2.5
	(再掲)20歳以上※3	703	27.1	2.3	13.1	1.4	14.0	1.7
	(再掲)65-74歳	198	42.5	4.6	27.3	3.0	15.2	2.6
	(再掲)75歳以上	147	37.2	3.5	18.2	2.9	19.0	3.4
(再掲)40-74歳※3	452	32.6	3.6	17.7	2.4	14.9	2.1	

注) ・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをした値
 ・妊婦は除外

※ 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをして算出した値

メタボリックシンドロームの疑い判定基準(H28国民健康・栄養調査と同様の判定基準)

【メタボリックシンドロームが強く疑われる者】

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

- ①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用
- ③HbA1c(NGSP)値6.0%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用

【予備群】

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記①～③の項目のうち1項目に該当する人

血液検査の結果

血色素量(g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	15.3	1.1	0.2	15.4	14.2	16.2	19	13.3	1.1	0.3	13.6	12.4	14.2
30-39歳	24	15.3	0.7	0.1	15.3	15.0	16.0	50	12.7	1.2	0.2	12.8	11.8	13.6
40-49歳	35	15.2	1.1	0.2	15.4	14.5	15.9	45	12.9	1.0	0.1	12.9	12.3	13.5
50-59歳	41	15.0	0.9	0.2	15.0	14.5	15.5	77	13.4	0.9	0.1	13.4	12.7	14.0
60-69歳	70	14.7	1.3	0.2	14.8	13.8	15.7	108	13.3	1.1	0.2	13.3	12.7	14.0
70歳以上	108	13.7	1.7	0.2	13.9	12.8	14.9	119	12.8	1.3	0.2	13.0	12.2	13.6
(再掲)20歳以上※	291	14.8	1.4	0.1	15.0	14.0	15.7	418	13.1	1.1	0.1	13.1	12.3	13.8
(再掲)40-74歳※	191	14.9	1.2	0.1	15.0	14.0	15.7	265	13.2	1.0	0.1	13.2	12.5	13.9

赤血球数(万個/ μ l)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	514.4	38.3	8.3	519.1	482.5	541.0	19	451.8	37.0	9.1	452.8	419.4	487.2
30-39歳	24	509.2	35.4	8.4	506.4	489.5	521.8	50	436.9	34.8	5.0	429.0	414.2	462.7
40-49歳	35	490.4	42.1	9.3	496.0	474.1	511.4	45	436.9	27.2	3.9	431.3	414.0	455.5
50-59歳	41	484.3	35.3	6.3	484.2	460.5	509.0	77	441.1	34.1	4.5	434.2	415.9	466.7
60-69歳	70	464.8	41.8	5.0	463.6	433.4	502.5	108	442.4	36.5	5.5	442.1	422.4	470.0
70歳以上	108	434.5	55.8	6.9	439.0	404.6	467.9	119	422.6	40.0	5.3	425.0	391.6	449.9
(再掲)20歳以上※	291	478.3	51.4	3.3	482.0	448.0	511.0	418	436.7	37.0	3.4	435.7	412.0	460.5
(再掲)40-74歳※	191	475.6	42.5	4.0	478.0	448.4	507.8	265	438.4	34.7	3.8	434.0	414.4	462.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

ヘマトクリット値(%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	44.7	2.6	0.5	44.8	42.4	46.7	19	39.8	2.8	0.6	40.5	37.6	41.4
30-39歳	24	45.2	1.9	0.4	45.3	44.1	46.9	50	38.7	2.9	0.6	38.5	36.3	41.1
40-49歳	35	44.9	3.0	0.7	45.0	43.2	46.9	45	39.0	2.3	0.3	39.3	37.4	40.7
50-59歳	41	44.2	2.7	0.4	44.1	43.0	46.0	77	40.3	2.5	0.3	40.0	38.6	42.0
60-69歳	70	43.5	3.4	0.4	44.0	41.1	46.1	108	40.5	2.8	0.4	40.5	39.1	42.2
70歳以上	108	41.2	4.8	0.6	41.6	38.4	44.3	119	39.3	3.4	0.4	39.3	37.2	41.2
(再掲)20歳以上※	291	43.7	3.6	0.2	44.2	41.5	46.2	418	39.6	2.9	0.2	39.8	37.7	41.4
(再掲)40-74歳※	191	44.0	3.2	0.3	44.0	41.7	46.2	265	39.9	2.8	0.3	39.8	38.0	41.7

平均赤血球容積(MCV) (fl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	87.0	4.4	1.0	88.3	85.8	89.4	19	88.4	3.8	0.9	88.8	85.4	90.7
30-39歳	24	89.0	4.2	1.0	88.3	86.6	92.4	50	88.8	5.7	0.7	90.1	87.0	92.4
40-49歳	35	91.7	4.3	0.7	91.5	88.5	94.4	45	89.3	5.0	0.8	89.8	86.7	92.6
50-59歳	41	91.5	4.6	0.9	92.1	86.6	94.8	77	91.4	3.3	0.4	91.5	89.9	93.3
60-69歳	70	93.8	4.2	0.5	93.3	91.5	95.1	108	91.6	4.3	0.5	91.4	89.4	94.2
70歳以上	108	95.0	5.0	0.5	94.5	91.8	98.0	119	93.0	4.3	0.4	93.2	89.7	96.4
(再掲)20歳以上※	291	91.8	5.2	0.4	91.8	88.3	94.8	418	90.9	4.7	0.3	91.0	88.5	93.9
(再掲)40-74歳※	191	92.6	4.5	0.4	92.6	89.8	95.1	265	91.2	4.3	0.4	91.5	89.3	93.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

平均赤血球血色素量(MCH) (pg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	29.8	1.8	0.4	30.3	29.4	30.8	19	29.4	1.5	0.4	29.5	28.6	30.3
30-39歳	24	30.1	1.7	0.4	30.3	29.6	31.4	50	29.1	2.3	0.4	29.4	28.4	30.5
40-49歳	35	31.1	1.7	0.3	31.2	30.1	32.3	45	29.5	2.0	0.3	29.8	28.7	30.8
50-59歳	41	31.0	1.7	0.3	30.9	29.8	32.1	77	30.4	1.3	0.1	30.6	29.9	31.1
60-69歳	70	31.7	1.6	0.2	31.5	30.8	32.3	108	30.1	1.7	0.2	30.1	29.3	31.3
70歳以上	108	31.6	1.9	0.2	31.5	30.2	32.9	119	30.4	1.7	0.2	30.4	29.5	31.5
(再掲)20歳以上※	291	31.0	1.9	0.1	31.0	30.0	32.0	418	29.9	1.8	0.1	30.1	29.2	31.1
(再掲)40-74歳※	191	31.3	1.7	0.1	31.2	30.2	32.2	265	30.1	1.7	0.1	30.2	29.5	31.2

平均赤血球血色素濃度(MCHC) (%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	34.2	0.8	0.2	34.5	34.2	34.6	19	33.3	0.8	0.2	33.5	32.7	33.8
30-39歳	24	33.8	0.8	0.2	34.0	32.9	34.5	50	32.7	0.9	0.2	32.7	32.3	33.3
40-49歳	35	33.9	0.7	0.1	34.1	33.4	34.6	45	33.1	0.9	0.1	33.1	32.6	33.6
50-59歳	41	33.9	0.8	0.2	33.8	33.5	34.3	77	33.3	0.8	0.1	33.2	32.8	33.8
60-69歳	70	33.8	0.7	0.1	33.8	33.3	34.2	108	32.9	0.9	0.1	32.9	32.4	33.4
70歳以上	108	33.3	0.9	0.1	33.3	32.7	33.8	119	32.7	0.8	0.1	32.7	32.1	33.3
(再掲)20歳以上※	291	33.8	0.8	0.1	33.8	33.2	34.4	418	33.0	0.9	0.1	33.0	32.4	33.6
(再掲)40-74歳※	191	33.8	0.8	0.1	33.8	33.3	34.3	265	33.0	0.9	0.1	33.1	32.6	33.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

総たんぱく質値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	7.6	0.4	0.1	7.5	7.3	7.8	19	7.5	0.4	0.1	7.6	7.2	7.9
30-39歳	24	7.4	0.4	0.1	7.5	7.2	7.7	50	7.4	0.4	0.1	7.4	7.1	7.7
40-49歳	36	7.3	0.4	0.1	7.4	6.9	7.6	45	7.4	0.4	0.1	7.4	7.1	7.6
50-59歳	42	7.3	0.3	0.1	7.3	7.2	7.5	76	7.4	0.4	0.1	7.3	7.1	7.6
60-69歳	70	7.3	0.3	0.0	7.3	7.0	7.6	109	7.3	0.5	0.1	7.3	7.0	7.7
70歳以上	109	7.2	0.4	0.0	7.2	6.9	7.5	122	7.3	0.4	0.0	7.2	7.0	7.5
(再掲)20歳以上※	295	7.4	0.4	0.0	7.4	7.1	7.6	421	7.4	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6
(再掲)40-74歳※	193	7.3	0.4	0.0	7.3	7.0	7.5	266	7.3	0.4	0.0	7.3	7.0	7.6

アルブミン値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	4.8	0.2	0.1	4.8	4.7	5.1	19	4.5	0.4	0.1	4.6	4.3	4.8
30-39歳	24	4.8	0.2	0.0	4.8	4.7	4.9	50	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.6
40-49歳	36	4.6	0.3	0.0	4.5	4.4	4.8	45	4.4	0.3	0.0	4.4	4.2	4.6
50-59歳	42	4.5	0.2	0.0	4.5	4.4	4.6	76	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.6
60-69歳	70	4.4	0.3	0.0	4.4	4.2	4.6	109	4.4	0.2	0.0	4.4	4.2	4.5
70歳以上	109	4.2	0.3	0.0	4.2	4.0	4.4	122	4.2	0.3	0.0	4.2	4.1	4.4
(再掲)20歳以上※	295	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.7	421	4.4	0.3	0.0	4.4	4.2	4.6
(再掲)40-74歳※	193	4.5	0.3	0.0	4.5	4.3	4.6	266	4.4	0.3	0.0	4.4	4.2	4.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

ヘモグロビンA1c(NGSP)(%) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	5.3	0.2	0.1	5.2	5.1	5.5	19	5.4	0.2	0.1	5.4	5.2	5.6
30-39歳	24	5.4	0.3	0.1	5.4	5.3	5.6	50	5.4	0.3	0.1	5.4	5.2	5.5
40-49歳	36	5.6	0.9	0.1	5.5	5.4	5.7	45	5.4	0.2	0.0	5.4	5.2	5.6
50-59歳	41	5.8	0.7	0.1	5.6	5.4	6.0	77	5.6	0.3	0.0	5.5	5.4	5.8
60-69歳	70	5.9	0.7	0.1	5.7	5.5	6.1	107	5.9	0.6	0.1	5.8	5.5	6.1
70歳以上	108	6.0	0.7	0.1	5.8	5.6	6.2	119	5.9	0.6	0.1	5.8	5.6	6.1
(再掲)20歳以上※	293	5.7	0.7	0.0	5.6	5.3	5.8	417	5.7	0.5	0.0	5.6	5.4	5.8
(再掲)40-74歳※	192	5.8	0.7	0.0	5.6	5.4	6.0	264	5.7	0.5	0.0	5.6	5.4	5.9

ヘモグロビンA1c(NGSP値)(%) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	5.3	0.2	0.1	5.2	5.1	5.6	19	5.4	0.2	0.1	5.4	5.2	5.6
30-39歳	24	5.4	0.3	0.1	5.4	5.3	5.6	50	5.4	0.3	0.1	5.4	5.2	5.5
40-49歳	35	5.5	0.3	0.0	5.5	5.4	5.7	45	5.4	0.2	0.0	5.4	5.2	5.6
50-59歳	36	5.7	0.6	0.1	5.6	5.4	5.8	77	5.6	0.3	0.0	5.5	5.4	5.8
60-69歳	55	5.7	0.3	0.1	5.6	5.4	5.8	93	5.8	0.4	0.0	5.8	5.5	6.0
70歳以上	88	5.7	0.4	0.1	5.7	5.5	6.0	105	5.8	0.5	0.0	5.8	5.5	6.0
(再掲)20歳以上※	252	5.6	0.4	0.0	5.5	5.3	5.7	389	5.6	0.4	0.0	5.6	5.3	5.8
(再掲)40-74歳※	162	5.6	0.4	0.0	5.6	5.4	5.8	247	5.6	0.4	0.0	5.6	5.4	5.8

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

血糖値 (mg/dl) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	89.1	11.6	3.2	90.0	80.9	95.1	19	103.5	19.1	6.2	94.5	90.5	115.6
30-39歳	24	93.5	12.6	2.3	89.8	86.0	98.2	49	92.1	12.1	2.2	90.0	84.2	97.0
40-49歳	36	93.3	8.3	1.5	92.0	87.0	97.5	45	93.7	10.4	2.4	91.7	86.0	103.0
50-59歳	41	102.0	33.1	4.9	94.0	89.5	100.9	77	96.1	15.4	2.5	93.5	88.0	99.9
60-69歳	70	117.8	41.3	5.6	101.0	90.0	138.7	108	108.5	21.4	1.9	105.0	93.9	115.0
70歳以上	106	117.8	37.5	3.5	106.0	95.9	128.2	119	112.7	25.4	3.0	106.0	94.2	124.0
(再掲)20歳以上※	290	104.0	31.3	1.9	95.0	89.0	106.0	417	103.2	21.0	1.5	97.0	90.0	110.0
(再掲)40-74歳※	192	105.6	32.5	2.4	95.0	89.0	103.9	265	100.9	18.4	1.5	96.0	89.0	107.0

血糖値 (mg/dl) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	89.1	11.6	3.2	90.0	80.9	95.1	19	103.5	19.1	6.2	94.5	90.3	115.6
30-39歳	24	93.5	12.6	2.3	89.8	86.0	98.2	49	92.1	12.1	2.2	90.0	84.1	97.0
40-49歳	35	93.1	8.3	1.5	91.7	87.0	97.0	45	93.7	10.4	2.4	91.7	86.0	103.0
50-59歳	36	97.1	27.3	4.4	94.0	89.0	100.2	77	96.1	15.4	2.5	93.5	88.0	99.9
60-69歳	55	104.8	25.7	4.4	96.9	90.0	106.3	94	104.3	13.6	1.3	104.0	93.0	113.0
70歳以上	87	109.4	20.6	2.2	105.0	95.2	118.2	105	110.3	23.6	2.6	103.0	94.0	118.0
(再掲)20歳以上※	250	98.3	20.2	1.6	94.0	88.0	101.4	389	101.4	18.5	1.4	96.0	90.0	108.0
(再掲)40-74歳※	162	98.7	21.1	1.8	94.8	89.0	101.0	248	99.0	14.8	1.2	96.0	89.0	106.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

総コレステロール (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	191.6	24.0	7.8	193.4	174.3	210.4	19	176.4	31.0	6.5	169.0	156.0	195.8
30-39歳	24	189.4	25.5	5.0	194.1	170.3	206.1	50	190.8	28.8	4.0	185.1	166.4	219.8
40-49歳	36	206.4	67.5	9.0	191.6	177.1	222.0	45	199.8	27.7	6.1	202.3	175.5	214.1
50-59歳	42	210.4	40.5	5.3	208.7	188.2	228.8	77	213.6	33.4	4.5	213.3	190.6	238.0
60-69歳	70	198.6	30.7	2.8	200.5	175.0	218.3	108	210.6	35.3	4.1	210.6	190.0	238.0
70歳以上	109	184.8	36.2	4.8	186.0	163.4	202.7	121	202.2	32.4	4.5	196.0	180.9	220.3
(再掲)20歳以上※	295	196.3	40.8	2.9	195.0	174.0	215.0	420	199.9	33.8	3.1	196.0	173.1	220.0
(再掲)40-74歳※	193	203.0	46.9	3.3	198.0	176.0	222.0	266	209.1	33.5	3.6	207.8	186.7	231.6

総コレステロール (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	191.6	24.0	7.8	193.4	174.3	210.4	19	176.4	31.0	6.5	169.0	154.1	195.8
30-39歳	24	189.4	25.5	5.0	194.1	170.3	206.1	50	190.8	28.8	4.0	185.1	166.4	219.8
40-49歳	33	198.4	30.5	4.4	191.4	178.1	220.7	43	198.5	28.2	5.8	200.4	174.9	210.1
50-59歳	32	213.3	42.4	6.3	208.7	189.8	233.1	68	215.4	34.6	4.9	213.6	190.7	238.3
60-69歳	54	202.0	30.6	3.9	203.6	175.1	228.0	72	216.5	33.4	5.7	213.5	193.6	239.8
70歳以上	90	184.9	37.8	5.5	187.0	162.4	203.0	85	207.5	34.7	5.5	202.0	182.0	228.5
(再掲)20歳以上※	247	195.6	33.3	2.6	195.7	175.0	215.0	337	200.7	34.8	3.6	198.0	173.0	222.0
(再掲)40-74歳※	154	203.2	35.8	3.0	200.0	177.0	223.0	205	211.4	34.3	4.6	207.9	188.0	238.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

中性脂肪 (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	121.6	52.4	14.3	135.3	67.5	169.0	19	90.3	50.3	13.4	68.9	49.0	119.9
30-39歳	24	135.7	84.8	18.3	101.4	73.5	193.3	50	91.0	49.4	7.1	81.4	54.0	107.6
40-49歳	34	157.8	79.6	16.6	145.2	99.0	183.8	45	87.1	42.2	7.7	81.9	57.0	107.9
50-59歳	38	170.0	75.1	10.0	156.8	118.6	221.8	72	111.3	50.4	6.2	107.8	72.0	138.1
60-69歳	67	157.9	88.4	12.5	133.1	89.8	216.9	106	153.6	87.9	10.6	124.3	98.0	174.0
70歳以上	107	148.2	83.9	12.0	124.9	83.7	208.1	120	125.0	68.0	5.5	114.0	71.9	150.8
(再掲)20歳以上※	283	148.5	79.7	5.6	133.1	84.1	194.6	412	113.5	66.5	4.2	103.0	66.0	139.1
(再掲)40-74歳※	184	161.7	84.6	8.1	140.0	99.0	205.0	259	120.9	71.5	4.8	109.7	72.0	142.1

中性脂肪 (mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	121.6	52.4	14.3	135.3	67.5	169.0	19	90.3	50.3	13.4	68.9	49.0	119.9
30-39歳	24	135.7	84.8	18.3	101.4	73.5	193.3	50	91.0	49.4	7.1	81.4	54.0	107.6
40-49歳	32	160.5	80.5	17.5	145.4	102.4	185.5	43	86.3	43.6	8.1	73.1	55.3	107.6
50-59歳	28	164.3	73.7	10.8	149.4	109.7	214.3	65	107.5	51.9	7.2	98.0	68.2	128.2
60-69歳	53	154.5	89.9	15.7	130.1	86.0	217.1	70	148.9	89.1	13.4	120.1	98.2	166.6
70歳以上	88	145.9	88.0	14.7	119.0	80.0	202.2	85	126.2	71.4	5.6	114.9	70.0	151.6
(再掲)20歳以上※	238	145.9	80.1	6.0	132.9	80.2	186.0	332	109.0	65.2	4.4	99.0	62.9	132.0
(再掲)40-74歳※	148	161.0	86.3	9.1	140.0	98.4	205.0	200	114.4	71.6	5.7	101.8	65.8	138.5

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

HDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	58.2	16.7	4.7	52.5	47.4	76.8	19	61.1	17.5	4.2	58.2	46.9	69.8
30-39歳	24	54.9	9.8	2.1	57.0	48.7	58.0	50	66.7	14.2	1.7	66.1	57.0	73.2
40-49歳	36	52.4	10.8	1.6	50.5	47.0	58.5	45	74.4	10.3	0.8	75.0	69.0	81.4
50-59歳	42	52.9	11.4	1.7	50.9	46.2	59.3	77	70.9	14.8	1.8	71.0	59.0	79.6
60-69歳	70	57.2	16.1	2.0	56.0	45.0	65.7	108	62.4	15.7	1.8	61.0	50.0	73.0
70歳以上	109	52.3	12.7	1.0	52.3	43.0	60.2	121	62.3	17.1	1.9	60.0	50.0	71.0
(再掲)20歳以上※	295	54.6	13.3	1.0	53.0	46.0	61.0	420	65.6	16.1	0.9	65.0	53.0	76.0
(再掲)40-74歳※	193	54.5	13.2	0.8	52.0	46.0	60.8	266	68.7	15.6	1.0	69.0	58.0	78.0

HDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	58.2	16.7	4.7	52.5	47.4	76.8	19	61.1	17.5	4.2	58.2	46.9	69.8
30-39歳	24	54.9	9.8	2.1	57.0	48.7	58.0	50	66.7	14.2	1.7	66.1	57.0	73.2
40-49歳	33	53.0	10.8	1.5	50.9	47.0	59.7	43	74.9	10.4	1.1	75.0	70.0	83.0
50-59歳	32	53.1	11.1	1.8	51.0	46.6	59.6	68	71.7	14.6	1.8	71.7	61.9	80.0
60-69歳	54	58.3	16.7	2.1	57.0	45.2	65.9	72	64.0	15.3	2.4	62.6	51.8	74.0
70歳以上	90	51.5	12.3	1.4	52.0	42.2	59.0	85	62.5	18.7	2.4	59.0	49.1	74.0
(再掲)20歳以上※	247	54.7	13.3	1.1	53.0	47.0	61.0	337	66.4	16.3	1.3	66.0	53.6	77.0
(再掲)40-74歳※	154	54.6	13.1	0.8	52.0	46.6	61.0	205	70.5	15.4	1.6	71.0	60.0	79.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

LDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	114.9	24.5	6.2	116.8	89.8	132.8	19	103.5	22.7	3.9	102.7	86.0	121.0
30-39歳	24	115.9	20.5	3.9	116.2	104.3	132.5	50	109.3	26.9	4.5	105.2	88.7	129.1
40-49歳	36	120.9	30.9	4.2	114.8	99.0	137.8	45	109.8	28.2	6.3	110.6	88.7	134.5
50-59歳	42	127.8	37.3	5.2	130.5	106.3	140.3	77	122.3	31.9	4.5	118.0	98.0	141.8
60-69歳	70	115.1	28.1	2.6	111.0	95.6	142.8	108	120.1	29.9	3.0	121.0	101.0	137.9
70歳以上	109	106.5	29.3	3.9	106.0	85.6	122.0	121	114.7	26.9	2.8	109.0	93.0	134.9
(再掲)20歳以上※	295	116.1	29.5	1.6	114.0	97.0	133.4	420	113.8	28.3	2.0	110.0	93.4	132.0
(再掲)40-74歳※	193	119.1	32.7	1.8	114.0	97.6	137.7	266	118.2	30.4	2.9	117.0	98.0	136.0

LDLコレステロール(mg/dl) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	114.9	24.5	6.2	116.8	89.8	132.8	19	103.5	22.7	3.9	102.7	86.0	121.0
30-39歳	24	115.9	20.5	3.9	116.2	104.6	132.5	50	109.3	26.9	4.5	105.2	88.7	129.1
40-49歳	33	121.9	27.7	3.5	117.9	99.9	137.6	43	108.0	28.3	5.8	108.0	88.0	123.6
50-59歳	32	131.1	38.8	5.9	131.0	110.0	141.2	68	124.7	32.7	5.0	124.4	100.1	144.0
60-69歳	54	117.8	26.8	2.9	114.0	97.0	142.8	72	125.3	30.1	4.4	124.0	102.7	147.0
70歳以上	90	107.4	29.7	4.4	106.0	85.6	122.7	85	119.8	28.1	3.3	116.0	99.2	141.6
(再掲)20歳以上※	247	117.3	28.9	1.7	115.0	98.0	133.6	337	115.1	29.1	2.2	112.0	94.0	134.4
(再掲)40-74歳※	154	122.0	32.0	2.2	116.2	100.0	138.0	205	120.1	31.7	3.7	118.6	99.0	142.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

クレアチニン(mg/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	0.8	0.1	0.0	0.8	0.8	0.9	19	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.6
30-39歳	24	0.8	0.1	0.0	0.8	0.8	0.9	50	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
40-49歳	36	0.9	0.2	0.0	0.8	0.8	0.9	45	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
50-59歳	42	0.9	0.2	0.0	0.9	0.8	1.0	76	0.7	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
60-69歳	70	0.9	0.3	0.0	0.9	0.8	1.0	109	0.7	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
70歳以上	109	1.0	0.5	0.0	0.9	0.8	1.0	122	0.7	0.1	0.0	0.7	0.6	0.8
(再掲)20歳以上※	295	0.9	0.3	0.0	0.8	0.8	0.9	421	0.7	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
(再掲)40-74歳※	193	0.9	0.3	0.0	0.9	0.8	1.0	266	0.7	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7

推算GFR(ml/min/1.73m²)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	97.9	14.3	5.1	96.6	86.4	107.0	19	101.3	13.9	3.3	96.1	91.2	116.5
30-39歳	24	86.5	9.5	2.2	86.5	81.8	93.2	50	91.8	15.3	1.8	92.8	81.6	100.2
40-49歳	36	78.1	13.3	2.4	78.4	70.9	84.8	45	80.1	12.0	2.0	81.3	70.9	89.4
50-59歳	42	71.4	13.0	1.6	72.4	63.0	81.2	76	73.7	13.4	1.6	74.7	64.5	81.8
60-69歳	70	67.6	15.3	1.7	66.8	57.6	77.5	109	69.0	12.4	1.2	70.0	61.4	77.8
70歳以上	109	64.3	14.0	1.6	65.5	57.5	73.6	122	64.4	12.5	1.0	64.6	55.8	71.4
(再掲)20歳以上※	295	76.3	17.7	1.6	75.9	64.6	87.3	421	77.3	18.4	1.2	75.6	64.6	89.5
(再掲)40-74歳※	193	71.4	14.5	1.2	72.0	63.8	80.9	266	72.8	13.2	0.8	73.3	63.9	81.8

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

血清鉄

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	90.0	27.9	8.4	87.4	63.3	114.1	19	72.9	30.1	5.9	74.4	44.3	95.6
30-39歳	24	92.1	28.6	5.6	94.3	71.1	112.5	50	65.6	27.5	4.1	66.6	42.8	82.5
40-49歳	36	95.1	30.7	5.2	93.3	76.7	116.6	45	76.4	49.1	8.0	60.1	44.2	99.0
50-59歳	42	89.8	32.9	5.6	78.0	64.9	112.8	76	77.7	23.3	3.0	73.2	63.2	95.2
60-69歳	70	93.3	32.2	5.1	92.6	66.0	111.0	109	72.8	25.6	2.9	70.0	54.0	85.6
70歳以上	109	81.9	33.5	3.9	75.0	59.0	101.5	122	68.6	25.6	3.0	66.0	54.0	80.5
(再掲)20歳以上※	295	89.9	31.2	2.7	89.0	66.0	109.8	421	72.0	30.4	2.2	69.0	53.0	86.0
(再掲)40-74歳※	193	91.7	31.6	2.8	90.2	67.0	111.0	266	74.4	32.3	2.7	68.4	54.0	86.2

TIBC

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	336.8	51.0	10.3	321.7	301.8	345.1	19	370.3	53.3	7.7	358.2	339.2	404.0
30-39歳	24	335.4	42.1	8.5	331.6	307.8	362.1	50	360.0	57.2	7.2	352.1	320.5	395.2
40-49歳	36	330.5	35.0	6.0	328.7	302.5	349.4	45	360.9	58.0	8.6	338.8	317.1	407.0
50-59歳	42	328.8	38.0	6.5	327.0	299.0	349.4	76	329.0	39.7	3.9	320.0	299.0	360.1
60-69歳	70	319.4	33.9	3.4	319.0	298.2	335.8	109	330.8	38.5	4.3	326.0	299.9	356.5
70歳以上	109	304.5	40.0	3.3	303.3	279.3	323.2	122	334.1	46.0	5.1	326.0	307.0	353.9
(再掲)20歳以上※	295	324.1	41.3	2.8	320.0	297.1	344.9	421	344.8	50.6	2.4	337.0	309.0	372.0
(再掲)40-74歳※	193	323.1	36.4	2.8	322.3	297.4	342.0	266	338.8	47.7	3.9	326.9	304.0	363.2

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

GOT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	21.7	5.0	1.2	21.0	18.4	24.6	19	17.7	4.7	1.4	16.0	15.0	20.6
30-39歳	24	23.9	8.2	1.9	21.1	18.9	26.0	50	17.1	4.5	0.6	16.0	14.0	18.4
40-49歳	36	24.4	7.9	1.5	22.2	19.0	28.0	45	19.3	4.4	0.6	19.0	15.3	23.3
50-59歳	42	22.6	9.2	1.9	21.0	17.9	25.3	76	22.9	6.5	0.9	21.2	18.9	25.1
60-69歳	70	25.1	7.4	1.0	23.2	20.6	27.0	109	23.5	6.5	0.6	22.0	19.0	25.0
70歳以上	108	24.7	6.2	0.5	24.5	21.0	28.0	121	23.5	6.0	0.6	23.0	20.0	27.0
(再掲)20歳以上※	294	23.8	7.4	0.6	22.0	19.0	27.0	420	21.2	6.2	0.4	20.0	17.0	24.0
(再掲)40-74歳※	193	24.0	7.8	0.8	22.0	19.0	26.0	266	22.1	6.0	0.4	21.0	18.0	24.1

GPT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	21.5	11.2	3.0	20.0	13.0	27.8	19	14.8	6.1	1.3	13.0	12.0	16.5
30-39歳	24	29.9	30.4	5.0	21.0	16.2	25.0	50	14.2	7.0	0.9	12.8	10.0	17.8
40-49歳	36	30.0	20.0	3.5	23.5	18.3	34.4	45	15.2	7.2	0.8	13.0	11.0	16.0
50-59歳	42	23.7	10.6	1.9	19.8	16.0	27.3	76	20.7	9.2	1.3	18.0	15.0	23.1
60-69歳	70	24.2	10.6	1.6	22.4	17.0	28.4	109	20.9	9.6	0.9	18.0	13.7	26.0
70歳以上	109	20.5	8.6	0.9	19.0	14.5	25.3	122	17.6	7.0	0.8	16.0	13.0	20.0
(再掲)20歳以上※	295	24.6	16.3	1.1	21.0	16.0	27.0	421	17.5	8.1	0.3	15.0	12.0	20.0
(再掲)40-74歳※	193	25.3	13.7	1.3	22.0	16.1	29.0	266	18.9	8.7	0.6	16.1	13.0	22.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

γ GTP

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	25.9	12.9	3.8	23.1	16.9	29.4	19	15.0	8.0	1.7	12.0	11.0	17.8
30-39歳	24	26.3	12.1	1.9	23.9	16.0	33.1	50	15.0	7.2	1.0	12.0	10.0	19.8
40-49歳	36	46.7	42.0	8.8	29.1	20.0	61.8	45	19.5	14.2	1.8	15.2	12.0	20.5
50-59歳	42	57.7	82.3	13.9	24.0	16.6	55.7	76	28.9	31.6	4.0	20.1	14.0	29.0
60-69歳	70	38.0	35.4	4.3	26.8	19.0	50.0	109	24.9	19.2	1.3	18.8	14.0	27.7
70歳以上	109	28.8	25.5	2.4	22.0	16.0	34.0	122	18.7	11.8	1.1	15.0	12.0	20.9
(再掲)20歳以上※	295	36.9	42.6	3.5	24.0	18.0	38.0	421	20.4	17.5	0.9	15.0	12.0	22.0
(再掲)40-74歳※	193	44.0	52.1	5.2	25.0	18.6	46.9	266	23.8	21.3	1.5	17.8	13.0	24.4

尿酸

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	6.4	1.2	0.3	6.5	5.5	7.0	19	4.5	1.3	0.3	4.5	3.8	4.8
30-39歳	24	5.8	1.2	0.3	5.8	5.1	6.5	50	4.1	0.8	0.1	4.1	3.6	4.8
40-49歳	36	6.5	1.0	0.2	6.6	5.9	7.2	45	4.0	0.9	0.2	4.0	3.3	4.7
50-59歳	42	5.8	1.2	0.2	5.8	5.1	6.5	76	4.5	1.0	0.2	4.5	3.9	5.0
60-69歳	70	6.0	1.1	0.1	6.1	5.3	6.9	109	4.8	1.0	0.1	4.7	4.1	5.4
70歳以上	109	5.6	1.2	0.1	5.7	4.9	6.5	122	4.9	1.1	0.1	4.9	4.2	5.6
(再掲)20歳以上※	295	6.0	1.2	0.1	6.1	5.2	6.7	421	4.5	1.1	0.1	4.5	3.9	5.2
(再掲)40-74歳※	193	6.1	1.2	0.1	6.1	5.2	6.8	266	4.5	1.0	0.1	4.5	3.9	5.2

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

服薬の状況

「血圧を下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	304	109	195
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	39	4	35
	50-59歳	41	9	32
	60-69歳	70	35	35
	70歳以上	114	61	53
女性	総数	438	131	307
	20-29歳	19	0	19
	30-39歳	52	0	52
	40-49歳	50	3	47
	50-59歳	77	10	67
	60-69歳	111	39	72
	70歳以上	129	79	50

「脈の乱れを治す薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	304	19	285
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	39	0	39
	50-59歳	41	1	40
	60-69歳	70	8	62
	70歳以上	114	10	104
女性	総数	438	22	416
	20-29歳	19	0	19
	30-39歳	52	0	52
	40-49歳	50	0	50
	50-59歳	77	3	74
	60-69歳	111	3	108
	70歳以上	129	16	113

「インスリン注射または血糖を下げる薬」の服用状況(人) 「コレステロールを下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	304	41	263
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	39	1	38
	50-59歳	41	4	37
	60-69歳	70	15	55
	70歳以上	114	21	93
女性	総数	438	28	410
	20-29歳	19	0	19
	30-39歳	52	0	52
	40-49歳	50	0	50
	50-59歳	77	0	77
	60-69歳	111	13	98
	70歳以上	129	15	114

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	304	38	266
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	39	2	37
	50-59歳	41	9	32
	60-69歳	70	11	59
	70歳以上	114	16	98
女性	総数	438	80	358
	20-29歳	19	0	19
	30-39歳	52	0	52
	40-49歳	50	2	48
	50-59歳	77	8	69
	60-69歳	111	33	78
	70歳以上	129	37	92

「中性脂肪を下げる薬」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	304	19	285
	20-29歳	15	0	15
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	39	2	37
	50-59歳	41	4	37
	60-69歳	70	8	62
	70歳以上	114	5	109
女性	総数	438	22	416
	20-29歳	19	0	19
	30-39歳	52	0	52
	40-49歳	50	0	50
	50-59歳	77	2	75
	60-69歳	111	10	101
	70歳以上	129	10	119

「貧血治療のための薬(鉄剤)」の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	服用あり	服用なし
男性	総数	270	3	267
	20-29歳	11	1	10
	30-39歳	22	0	22
	40-49歳	37	0	37
	50-59歳	35	0	35
	60-69歳	65	0	65
	70歳以上	100	2	98
女性	総数	400	9	391
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	48	0	48
	40-49歳	46	1	45
	50-59歳	70	1	69
	60-69歳	103	3	100
	70歳以上	115	4	111