

## 身体状況調査・歩行数調査の結果

肥満とやせの状況(15歳以上)

性別	年齢区分	総数	肥満 (BMI $\geq$ 25)		やせ (BMI $<$ 18.5)		普通 割合
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	
男性	総数※1	529	28.1%	2.3%	6.0%	1.2%	65.9%
	15-19歳	24	5.4%	5.2%	18.3%	10.9%	76.3%
	20-29歳	39	25.2%	8.9%	11.3%	5.2%	63.4%
	30-39歳	69	30.3%	6.1%	2.6%	1.5%	67.1%
	40-49歳	89	25.5%	6.1%	2.0%	1.5%	72.6%
	50-59歳	99	40.4%	6.9%	1.4%	1.0%	58.1%
	60-69歳	89	22.5%	4.8%	6.1%	3.2%	71.4%
	70歳以上	120	32.4%	4.6%	8.5%	2.7%	59.1%
	(再掲)65-74歳	77	27.5%	4.1%	5.2%	3.1%	67.4%
	(再掲)75歳以上	76	31.7%	5.8%	8.1%	3.2%	60.3%
	(再掲)40-74歳※1	321	29.8%	3.1%	4.0%	1.4%	66.2%
	(再掲)40-74歳※2	321	30.6%	3.3%	3.8%	1.3%	65.7%
	(再掲)20歳以上※1	505	29.6%	2.4%	5.2%	1.2%	65.2%
	(再掲)20歳以上※2	505	29.8%	2.5%	5.2%	1.2%	65.0%
	(再掲)20-69歳※1	385	28.9%	2.9%	4.3%	1.4%	66.8%
	(再掲)20-69歳※2	385	29.3%	2.9%	4.5%	1.4%	66.2%
女性	総数	585	11.8%	1.8%	13.0%	1.4%	75.2%
	15-19歳	30	0.0%	0.0%	30.2%	9.8%	69.8%
	20-29歳	47	8.1%	3.8%	30.0%	7.4%	61.9%
	30-39歳	55	11.8%	4.5%	22.8%	7.2%	65.4%
	40-49歳	107	5.7%	2.2%	7.8%	2.4%	86.5%
	50-59歳	100	19.5%	5.5%	5.7%	2.5%	74.8%
	60-69歳	97	19.2%	4.3%	8.4%	2.6%	72.4%
	70歳以上	149	20.3%	3.5%	7.7%	2.2%	72.0%
	(再掲)65-74歳	88	17.7%	4.6%	4.9%	2.2%	77.4%
	(再掲)75歳以上	108	19.8%	4.2%	8.5%	2.8%	71.7%
	(再掲)40-74歳※1	345	15.9%	2.7%	7.1%	1.3%	76.9%
	(再掲)40-74歳※2	345	15.6%	2.7%	7.1%	1.3%	77.3%
	(再掲)20歳以上※1	555	15.3%	2.0%	12.0%	1.5%	72.6%
	(再掲)20歳以上※2	555	14.4%	2.0%	13.5%	1.7%	72.1%
	(再掲)20-39歳※1	102	10.3%	3.1%	25.6%	4.9%	64.0%
	(再掲)20-39歳※2	102	10.1%	3.0%	26.1%	4.8%	63.8%
(再掲)40-69歳※1	304	15.1%	2.7%	7.4%	1.3%	77.6%	
(再掲)40-69歳※2	304	15.1%	2.8%	7.2%	1.3%	77.7%	
総数	総数	1114	21.1%	1.3%	9.6%	0.9%	69.3%
	15-19歳	54	2.7%	2.7%	24.1%	8.1%	73.1%
	20-29歳	86	16.9%	4.9%	20.4%	4.3%	62.7%
	30-39歳	124	21.2%	4.0%	12.5%	3.7%	66.3%
	40-49歳	196	15.7%	3.6%	4.8%	1.3%	79.5%
	50-59歳	199	29.9%	3.6%	3.6%	1.4%	66.5%
	60-69歳	186	20.8%	3.2%	7.3%	2.1%	71.9%
	70歳以上	269	25.2%	3.0%	8.0%	1.8%	66.7%
	(再掲)65-74歳	165	23.8%	3.0%	5.0%	1.6%	71.2%
	(再掲)75歳以上	184	24.3%	3.3%	8.3%	2.0%	67.4%
	(再掲)40-74歳※1	666	22.8%	1.9%	5.6%	1.0%	71.6%
	(再掲)40-74歳※2	666	23.2%	1.9%	5.4%	0.9%	71.4%
	(再掲)20歳以上※1	1060	22.2%	1.4%	8.7%	0.9%	69.1%
	(再掲)20歳以上※2	1060	22.1%	1.4%	9.4%	1.0%	68.5%

注)

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

児童・生徒(6～14歳)の肥満の状況(学校保健統計調査方式) (人)

性別		総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
男性	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	2	0	2	0
	-20%以上-10%未満	11	1	5	5
	-10%以上0%未満	22	9	6	7
	0%以上+10%未満	9	2	1	6
	+10%以上+20%未満	6	1	1	4
	+20%以上+30%未満	2	1	1	0
	+30%以上+40%未満	2	1	1	0
	+40%以上	0	0	0	0
	総数		54	15	17
女性	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	1	0	1	0
	-20%以上-10%未満	21	4	7	10
	-10%以上0%未満	26	13	9	4
	0%以上+10%未満	17	5	5	7
	+10%以上+20%未満	2	1	1	0
	+20%以上+30%未満	3	0	3	0
	+30%以上+40%未満	0	0	0	0
	+40%以上	0	0	0	0
	総数		70	23	26
総数	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	3	0	3	0
	-20%以上-10%未満	32	5	12	15
	-10%以上0%未満	48	22	15	11
	0%以上+10%未満	26	7	6	13
	+10%以上+20%未満	8	2	2	4
	+20%以上+30%未満	5	1	4	0
	+30%以上+40%未満	2	1	1	0
	+40%以上	0	0	0	0
	総数		124	38	43

参考:日比式による肥満度判定 児童・生徒(6～14歳)の肥満の状況

性別		総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
男性	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	3	0	1	2
	-20%以上-10%未満	9	1	5	3
	-10%以上0%未満	26	8	7	11
	0%以上+10%未満	6	3	0	3
	+10%以上+20%未満	5	0	2	3
	+20%以上+30%未満	2	1	1	0
	+30%以上+40%未満	2	2	0	0
	+40%以上	1	0	1	0
	総数		54	15	17
女性	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	1	0	1	0
	-20%以上-10%未満	16	2	7	7
	-10%以上0%未満	28	14	9	5
	0%以上+10%未満	18	6	5	7
	+10%以上+20%未満	3	0	1	2
	+20%以上+30%未満	4	1	3	0
	+30%以上+40%未満	0	0	0	0
	+40%以上	0	0	0	0
	総数		70	23	26
総数	-30%未満	0	0	0	0
	-30%以上-20%未満	4	0	2	2
	-20%以上-10%未満	25	3	12	10
	-10%以上0%未満	54	22	16	16
	0%以上+10%未満	24	9	5	10
	+10%以上+20%未満	8	0	3	5
	+20%以上+30%未満	6	2	4	0
	+30%以上+40%未満	2	2	0	0
	+40%以上	1	0	1	0
	総数		124	38	43

身長・体重の平均値(男性)

区分	人数	身長						体重					
		平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
1-2歳	6	81.9	7.2	2.7	81.9	76.3	89.1	10.7	1.3	0.5	10.5	9.5	12.1
3-5歳	15	100.7	7.4	1.7	102.5	93.5	107.5	15.7	2.3	0.5	15.8	13.7	17.5
6-8歳	15	122.4	7.8	1.9	124.8	115.0	127.6	24.8	5.6	1.5	23.0	20.0	31.9
9-11歳	17	136.3	6.1	1.5	138.2	131.9	140.5	30.6	6.4	1.3	29.0	27.0	33.0
12-14歳	22	158.2	8.4	1.9	159.0	152.8	164.4	47.7	9.1	1.7	47.6	40.7	57.1
15-19歳	24	171.7	5.5	1.2	171.8	166.6	175.0	60.4	8.9	2.3	59.9	54.7	65.1
20-29歳	39	172.5	5.4	0.9	172.0	170.0	176.0	66.7	11.8	2.5	64.4	58.0	75.4
30-39歳	69	173.6	6.2	0.7	172.0	169.4	177.2	72.9	13.2	1.6	70.0	65.0	80.0
40-49歳	89	173.1	5.6	0.5	173.0	169.6	176.0	70.0	10.3	1.1	68.0	63.0	76.0
50-59歳	99	169.9	5.6	0.5	171.0	167.4	173.0	70.5	10.4	1.5	70.0	63.4	76.4
60-69歳	89	166.2	6.1	0.6	166.5	162.0	170.0	62.6	8.5	0.9	62.8	56.0	67.0
70歳以上	120	161.8	6.9	0.9	161.5	158.1	166.6	62.3	10.7	1.4	62.0	54.9	70.0
(再掲)40-74歳※1	321	168.8	6.8	0.5	169.2	164.0	173.0	67.0	10.5	0.7	66.0	59.4	74.0
(再掲)65-74歳	77	163.5	6.1	0.6	163.1	160.9	167.0	62.2	9.5	1.1	61.3	54.7	68.1
(再掲)75歳以上	76	161.1	6.8	1.1	160.2	157.4	166.0	61.6	10.5	1.6	61.9	56.3	66.3
(再掲)20歳以上※1	505	169.0	7.5	0.5	170.0	164.0	173.7	67.3	11.6	0.7	65.9	59.6	74.0
(再掲)20歳以上※2	505	169.4	7.4	0.5	170.0	165.0	174.0	67.6	11.6	0.7	66.0	60.0	75.0

注)

20歳以上の年齢階級の値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。(20歳未満は標本を単純に集計した値)

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口を基準にした重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準にした重み付けをして算出。

身長・体重の平均値(女性)

区分	人数	身長						体重					
		平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
1-2歳	8	82.5	6.5	2.4	80.9	76.4	89.1	11.0	1.7	0.6	10.5	9.6	12.4
3-5歳	14	102.1	6.2	1.4	102.2	97.2	105.7	15.3	2.7	0.6	15.0	13.8	16.8
6-8歳	23	123.1	8.6	1.4	121.1	116.5	130.7	23.5	4.1	0.7	22.7	20.0	27.0
9-11歳	26	138.1	8.1	1.4	137.3	131.0	144.2	32.2	6.5	1.3	30.0	27.4	36.2
12-14歳	21	152.1	5.6	0.9	152.2	149.0	155.5	42.9	6.7	1.2	42.0	38.1	48.5
15-19歳	30	155.9	4.2	1.0	156.4	153.0	158.0	48.1	5.3	1.1	47.6	44.8	50.2
20-29歳	47	157.8	4.8	0.5	157.4	154.3	160.1	51.3	7.4	1.4	49.8	46.4	56.0
30-39歳	55	157.8	4.7	0.7	157.8	153.9	160.7	52.4	7.6	1.0	50.3	47.5	55.5
40-49歳	107	158.3	4.8	0.5	158.0	154.8	162.0	53.4	6.2	0.6	52.2	49.0	57.0
50-59歳	100	156.6	4.5	0.6	157.0	154.0	159.7	55.9	9.4	1.4	53.6	50.1	58.9
60-69歳	97	152.2	5.3	0.6	152.5	148.3	156.0	52.6	6.9	0.7	52.1	48.3	57.0
70歳以上	149	147.7	5.3	0.6	148.0	144.4	151.4	49.6	7.3	0.7	50.0	46.0	54.2
(再掲)40-74歳※1	345	154.6	5.9	0.5	155.0	150.9	158.9	53.5	7.7	0.5	52.6	49.0	57.0
(再掲)65-74歳	88	150.1	5.0	0.6	150.1	146.7	154.1	51.5	6.8	0.7	51.1	48.3	55.0
(再掲)75歳以上	108	147.3	5.5	0.7	147.9	143.3	150.3	49.1	7.3	0.7	49.8	45.2	54.1
(再掲)20歳以上※1	555	153.9	6.6	0.5	154.5	149.7	158.7	52.2	7.7	0.3	51.6	47.8	56.0
(再掲)20歳以上※2	555	155.0	6.3	0.4	155.8	151.0	159.6	52.6	7.8	0.4	51.8	48.0	56.1

注)

20歳以上の年齢階級の値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。(20歳未満は標本を単純に集計した値)

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口を基準にした重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準にした重み付けをして算出。

## BMIの平均値(男性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
15-19歳	24	20.5	2.5	0.6	20.5	18.6	22.1
20-29歳	39	22.5	4.0	0.8	21.8	19.8	25.2
30-39歳	69	24.2	4.1	0.5	23.7	21.7	26.3
40-49歳	89	23.3	2.7	0.3	23.1	21.6	25.1
50-59歳	99	24.4	3.0	0.5	24.4	22.3	26.1
60-69歳	89	22.6	2.8	0.3	22.7	20.6	24.8
70歳以上	120	23.8	3.8	0.5	23.6	21.3	26.4
(再掲)65-74歳	77	23.3	3.4	0.4	22.9	20.4	25.6
(再掲)75歳以上	76	23.7	3.8	0.6	23.5	21.5	26.0
(再掲)20歳以上※1	505	23.5	3.5	0.2	23.1	21.3	25.5
(再掲)20歳以上※2	505	23.5	3.5	0.2	23.0	21.3	25.6
(再掲)40-74歳※1	321	23.5	3.1	0.2	23.2	21.3	25.3
(再掲)40-74歳※2	321	23.6	3.1	0.2	23.3	21.4	25.4
(再掲)20-69歳※1	385	23.5	3.4	0.2	23.0	21.3	25.4
(再掲)20-69歳※2	385	23.5	3.5	0.2	22.9	21.4	25.5

## BMIの平均値(女性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
15-19歳	30	19.8	2.0	0.4	19.2	18.1	21.4
20-29歳	47	20.6	3.2	0.5	19.9	18.2	22.1
30-39歳	55	21.1	3.1	0.4	20.4	18.6	22.6
40-49歳	107	21.3	2.3	0.2	21.2	19.7	22.6
50-59歳	100	22.8	3.6	0.6	21.7	20.6	24.5
60-69歳	97	22.7	3.0	0.3	22.6	20.8	24.7
70歳以上	149	22.7	3.2	0.3	23.0	20.8	24.5
(再掲)65-74歳	88	22.9	3.0	0.3	22.8	20.8	24.8
(再掲)75歳以上	108	22.7	3.2	0.3	23.0	20.7	24.5
(再掲)20歳以上※1	555	22.1	3.2	0.2	21.7	19.9	23.9
(再掲)20歳以上※2	555	21.9	3.2	0.2	21.5	19.7	23.7
(再掲)40-74歳※1	345	22.4	3.1	0.2	22.2	20.5	24.1
(再掲)40-74歳※2	345	22.4	3.1	0.2	22.0	20.4	24.1
(再掲)20-39歳※1	102	20.9	3.1	0.4	20.3	18.5	22.5
(再掲)20-39歳※2	102	20.9	3.1	0.4	20.2	18.5	22.4
(再掲)40-69歳※1	304	22.3	3.1	0.2	21.9	20.4	24.0
(再掲)40-69歳※2	304	22.3	3.1	0.2	21.9	20.3	24.0

注)

値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

高血圧・正常高値の人の割合

性別	年齢区分	総数	高血圧及び正常高値		高血圧		正常高値	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	14	24.1%	10.6%	19.4%	10.7%	4.7%	4.7%
	30-39歳	25	24.2%	11.5%	6.4%	4.1%	17.8%	10.8%
	40-49歳	40	67.9%	5.6%	45.9%	8.5%	22.0%	5.2%
	50-59歳	42	77.9%	10.2%	44.1%	11.4%	33.8%	10.8%
	60-69歳	54	73.8%	11.7%	50.3%	12.5%	23.5%	8.5%
	70歳以上	80	86.8%	6.6%	76.9%	5.8%	9.9%	3.9%
	(再掲)65-74歳	56	83.6%	7.5%	71.5%	8.3%	12.1%	6.7%
	(再掲)75歳以上	46	77.8%	12.9%	64.1%	11.3%	13.7%	6.1%
	(再掲)40-74歳※1	136	73.2%	6.0%	46.9%	6.6%	26.3%	5.7%
	(再掲)40-74歳※2	136	73.5%	6.0%	46.6%	6.6%	26.9%	5.9%
	(再掲)20歳以上※1	255	61.4%	5.5%	42.4%	4.9%	19.0%	3.6%
	(再掲)20歳以上※2	255	58.8%	5.5%	40.0%	4.9%	18.9%	3.7%
女性	20-29歳	18	2.7%	2.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.1%
	30-39歳	28	10.6%	7.0%	7.6%	6.9%	2.9%	2.2%
	40-49歳	68	27.7%	8.8%	7.7%	5.1%	20.0%	5.8%
	50-59歳	54	44.8%	8.0%	34.3%	9.5%	10.5%	6.4%
	60-69歳	73	62.3%	8.4%	40.5%	10.9%	21.8%	5.7%
	70歳以上	80	83.6%	4.7%	72.1%	5.6%	11.5%	4.7%
	(再掲)65-74歳	67	67.0%	4.6%	47.0%	6.3%	19.9%	6.1%
	(再掲)75歳以上	53	88.5%	6.1%	76.7%	7.2%	11.8%	4.8%
	(再掲)40-74歳※1	195	45.9%	4.2%	28.2%	5.4%	17.6%	3.8%
	(再掲)40-74歳※2	195	44.9%	4.2%	27.9%	5.5%	17.0%	3.9%
	(再掲)20歳以上※1	321	46.8%	3.1%	34.6%	3.3%	12.2%	2.1%
	(再掲)20歳以上※2	321	39.2%	2.9%	27.9%	3.2%	11.3%	2.0%
総数	20-29歳	32	13.7%	6.7%	10.0%	6.0%	3.7%	2.5%
	30-39歳	53	17.9%	8.1%	7.0%	3.5%	11.0%	5.1%
	40-49歳	108	48.0%	4.9%	27.0%	5.5%	21.0%	3.7%
	50-59歳	96	61.3%	7.3%	39.2%	9.1%	22.1%	6.1%
	60-69歳	127	68.0%	9.6%	45.4%	10.7%	22.6%	6.1%
	70歳以上	160	84.9%	3.1%	74.1%	3.4%	10.8%	2.9%
	(再掲)65-74歳	123	74.5%	4.3%	58.1%	6.2%	16.4%	5.3%
	(再掲)75歳以上	99	83.5%	7.2%	70.8%	6.3%	12.7%	3.1%
	(再掲)40-74歳※1	331	59.5%	4.8%	37.6%	5.6%	22.0%	3.7%
	(再掲)40-74歳※2	331	59.2%	4.8%	37.3%	5.6%	21.9%	3.7%
	(再掲)20歳以上※1	576	53.9%	3.6%	38.4%	3.6%	15.5%	2.2%
	(再掲)20歳以上※2	576	49.1%	3.7%	34.0%	3.6%	15.1%	2.2%

注)

- ・高血圧、正常高値の判定は日本高血圧学会(2009年)による血圧の分類で判定。
- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重

血圧の平均値(20歳以上)

最低血圧 ※血圧を下げる薬服用者を含む。

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	75.9	7.6	2.2	76.0	69.1	80.0	18	71.3	10.3	3.7	69.0	65.2	81.2
30-39歳	25	81.6	7.3	1.2	80.9	77.8	84.0	28	66.3	7.3	1.6	65.5	62.2	71.0
40-49歳	40	86.6	9.4	1.5	87.6	79.6	92.0	68	76.1	8.4	1.7	79.0	70.0	83.2
50-59歳	42	83.6	9.1	1.7	81.2	76.0	92.0	54	78.3	9.9	1.9	78.0	70.4	83.0
60-69歳	54	84.4	9.9	2.7	86.0	80.5	90.0	73	77.9	8.3	1.5	76.3	71.0	83.9
70歳以上	80	79.3	10.4	1.6	78.0	74.0	87.0	80	76.3	9.9	1.7	74.0	69.0	83.5
(再掲)40-74歳※1	136	84.9	9.5	1.2	85.2	79.0	91.0	195	77.5	8.9	1.0	77.1	71.0	83.7
(再掲)40-74歳※2	136	84.8	9.5	1.2	85.0	79.0	91.0	195	77.5	9.0	1.0	78.0	71.0	83.6
(再掲)20歳以上※1	255	82.1	9.6	0.8	82.0	76.0	88.0	321	74.8	9.9	1.0	74.0	69.0	81.0
(再掲)20歳以上※2	255	81.9	9.5	0.8	81.0	76.0	88.0	321	74.3	10.0	1.0	74.0	69.0	80.0

最高血圧 ※血圧を下げる薬服用者を含む。

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	115.6	13.7	3.7	108.6	108.0	122.6	18	111.2	9.6	2.5	116.0	102.8	116.5
30-39歳	25	120.9	9.0	2.5	119.6	116.2	126.6	28	104.7	8.1	1.6	105.0	99.2	109.0
40-49歳	40	125.9	12.1	1.8	126.0	119.1	136.0	68	116.7	12.3	2.0	113.0	109.3	124.3
50-59歳	42	133.9	11.6	1.9	135.0	125.7	144.0	54	122.7	13.9	2.0	122.2	112.5	129.5
60-69歳	54	127.9	18.1	5.2	131.4	119.0	141.8	73	130.7	16.5	2.5	134.0	119.2	140.0
70歳以上	80	140.9	13.3	1.7	140.0	131.0	150.0	80	139.2	18.0	2.9	135.2	128.0	148.8
(再掲)40-74歳※1	136	129.2	14.7	2.2	130.0	120.0	138.6	195	123.7	15.5	1.1	122.0	112.0	133.9
(再掲)40-74歳※2	136	129.5	14.4	2.0	130.0	120.3	138.6	195	123.3	15.3	1.1	121.0	111.3	133.0
(再掲)20歳以上※1	255	128.5	15.4	1.3	128.0	118.3	139.0	321	124.0	18.9	1.6	121.0	109.3	135.0
(再掲)20歳以上※2	255	127.7	15.3	1.3	127.0	117.0	138.0	321	121.0	17.9	1.4	117.0	108.0	132.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



血圧の平均値(20歳以上)

最低血圧 ※血圧を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性						女 性							
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	75.9	7.6	2.2	75.4	69.1	80.0	18	71.3	10.3	3.7	69.0	65.2	81.2
30-39歳	23	80.6	5.5	1.1	80.8	77.7	84.0	27	65.9	7.5	1.9	65.7	63.0	70.7
40-49歳	38	86.6	9.5	1.5	87.4	79.4	92.0	68	76.1	8.4	1.7	79.0	70.0	84.0
50-59歳	36	83.3	9.3	1.9	80.8	75.8	92.4	42	77.7	9.9	2.1	77.0	70.2	82.9
60-69歳	39	83.4	10.3	3.1	85.5	76.0	89.6	50	77.0	8.1	1.7	77.0	70.4	84.0
70歳以上	34	78.3	9.3	1.6	77.7	73.4	86.2	34	74.8	9.8	2.1	72.1	68.0	82.0
(再掲)40-74歳※1	113	84.5	9.7	1.4	85.8	79.0	90.7	160	76.9	8.7	1.1	77.0	71.0	83.5
(再掲)40-74歳※2	113	84.5	9.7	1.3	85.0	78.6	91.0	160	76.9	8.8	1.1	77.0	71.0	83.1
(再掲)20歳以上※1	184	81.8	9.2	1.0	81.0	76.0	88.0	239	73.8	9.8	1.0	72.0	67.3	80.0
(再掲)20歳以上※2	184	81.5	9.1	1.0	81.0	76.0	87.0	239	73.4	9.9	1.1	72.0	66.0	79.0

最高血圧 ※血圧を下げる薬服用者を除外。

年齢階級	男 性						女 性							
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	14	115.6	13.7	3.7	108.6	106.2	122.6	18	111.2	9.6	2.5	115.2	102.8	116.5
30-39歳	23	119.7	7.4	2.6	119.4	116.1	126.4	27	105.0	8.4	1.6	105.0	99.0	108.8
40-49歳	38	125.6	12.2	1.8	125.3	118.6	134.9	68	116.7	12.3	2.0	113.0	110.0	124.3
50-59歳	36	133.7	11.8	2.3	135.0	124.7	144.0	42	121.0	12.7	1.8	121.2	111.0	125.0
60-69歳	39	125.1	17.8	6.0	129.4	118.2	139.4	50	127.7	15.5	2.2	130.6	112.3	137.0
70歳以上	34	139.9	14.8	2.5	140.7	128.0	151.0	34	132.7	13.8	2.5	130.6	125.0	143.0
(再掲)40-74歳※1	113	128.0	14.6	2.4	128.9	119.4	138.2	160	121.6	14.2	1.1	120.2	111.0	130.0
(再掲)40-74歳※2	113	128.4	14.3	2.2	130.0	120.0	138.4	160	121.3	14.0	1.1	120.2	111.0	129.0
(再掲)20歳以上※1	184	125.9	14.8	1.3	126.0	117.0	135.8	239	118.9	15.4	1.1	116.3	108.0	129.0
(再掲)20歳以上※2	184	125.3	14.7	1.3	125.0	116.2	135.0	239	117.1	14.7	1.0	115.4	107.0	125.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血圧の分布(15歳以上)

最低血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。 (人)

性別	区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	0	0	0	1	0	0	6	7	1
	60-69	4	3	3	1	2	1	7	17	4
	70-79	2	5	5	8	8	12	25	63	28
	80-89	0	4	14	13	15	26	34	106	54
	90-99	0	2	2	14	15	12	5	50	41
	100-109	0	0	1	2	2	3	3	11	7
	100-119	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		6	14	25	40	42	54	80	255	136
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	3	2	4	2	0	0	1	9	2
	60-69	6	6	9	16	10	7	18	66	33
	70-79	4	6	12	30	22	28	30	128	80
	80-89	1	4	3	19	10	29	23	88	58
	90-99	0	0	0	0	10	6	6	22	16
	100-109	0	0	0	0	2	3	2	7	5
	100-119	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		14	18	28	68	54	73	80	321	195

最高血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。 (人)

性別	区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	90mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90-99	0	0	1	0	0	1	0	2	1
	100-109	4	6	1	4	1	4	1	17	9
	110-119	2	1	9	7	5	8	5	35	20
	120-129	0	5	10	16	7	12	13	63	35
	130-139	0	1	3	8	14	17	21	64	39
	140-149	0	1	1	2	10	6	19	39	18
	150-159	0	0	0	3	4	4	15	26	11
	160-169	0	0	0	0	1	2	3	6	3
	170-179	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		6	14	25	40	42	54	80	255
女性	90mmHg未満	0	0	2	0	0	0	0	2	0
	90-99	7	2	6	6	3	1	0	18	10
	100-109	6	8	11	13	6	5	1	44	24
	110-119	1	5	7	23	11	8	7	61	42
	120-129	0	3	0	17	20	11	14	65	48
	130-139	0	0	2	4	7	24	26	63	35
	140-149	0	0	0	3	2	16	13	34	21
	150-159	0	0	0	0	4	3	8	15	7
	160-169	0	0	0	1	1	2	6	10	4
	170-179	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	180mmHg以上	0	0	0	1	0	3	2	6	4
	総数		14	18	28	68	54	73	80	321

血圧の分布(15歳以上)

最低血圧 ※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。 (人)

性別	区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	0	0	0	1	0	0	3	4	1
	60-69	4	3	3	1	2	1	2	12	4
	70-79	2	5	5	8	7	9	14	48	24
	80-89	0	4	13	12	13	20	12	74	45
	90-99	0	2	2	13	12	7	3	39	32
	100-109	0	0	0	2	2	2	0	6	6
	100-119	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		6	14	23	38	36	39	34	184
女性	40mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-59	3	2	4	2	0	0	0	8	2
	60-69	6	6	9	16	8	6	8	53	30
	70-79	4	6	11	30	18	19	14	98	67
	80-89	1	4	3	19	9	20	8	63	48
	90-99	0	0	0	0	6	3	2	11	9
	100-109	0	0	0	0	1	2	2	5	3
	100-119	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	120-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数		14	18	27	68	42	50	34	239

最高血圧の分布 ※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。 (人)

性別	区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 40-74歳
男性	90mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90-99	0	0	1	0	0	1	0	2	1
	100-109	4	6	1	4	1	3	1	16	8
	110-119	2	1	9	7	5	6	3	31	18
	120-129	0	5	10	16	5	11	7	54	32
	130-139	0	1	2	6	12	10	9	40	28
	140-149	0	1	0	2	10	5	6	24	17
	150-159	0	0	0	3	2	2	6	13	7
	160-169	0	0	0	0	1	1	1	3	2
	170-179	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	180mmHg以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		6	14	23	38	36	39	34	184	113
女性	90mmHg未満	0	0	2	0	0	0	0	2	0
	90-99	7	2	6	6	3	1	0	18	10
	100-109	6	8	10	13	4	5	1	41	22
	110-119	1	5	7	23	9	7	6	57	39
	120-129	0	3	0	17	19	7	6	52	43
	130-139	0	0	2	4	4	16	11	37	24
	140-149	0	0	0	3	0	9	5	17	12
	150-159	0	0	0	0	3	2	3	8	5
	160-169	0	0	0	1	0	1	1	3	2
	170-179	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	180mmHg以上	0	0	0	1	0	2	0	3	3
総数		14	18	27	68	42	50	34	239	160

血圧の状況(各分類に該当する人)

※血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外。

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	15-19歳	6	6	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	14	7	3	1	3	0	0	1
	30-39歳	25	5	11	6	2	1	0	0
	40-49歳	40	6	8	9	14	2	1	0
	50-59歳	42	3	5	13	18	3	0	4
	60-69歳	54	6	11	17	16	4	0	5
	70歳以上	80	4	12	23	32	9	0	33
	(再掲)20歳以上	255	31	50	69	85	19	1	43
	(再掲)40-74歳	136	15	24	39	48	9	1	9
女性	15-19歳	14	13	1	0	0	0	0	0
	20-29歳	18	12	4	2	0	0	0	0
	30-39歳	28	25	1	2	0	0	0	0
	40-49歳	68	38	16	9	3	1	1	4
	50-59歳	54	18	18	5	10	3	0	1
	60-69歳	73	13	9	24	21	3	3	18
	70歳以上	80	7	14	26	20	11	2	25
	(再掲)20歳以上	321	113	62	68	54	18	6	48
	(再掲)40-74歳	195	69	43	38	34	7	4	23
総数	15-19歳	20	19	1	0	0	0	0	0
	20-29歳	32	19	7	3	3	0	0	1
	30-39歳	53	30	12	8	2	1	0	0
	40-49歳	108	44	24	18	17	3	2	4
	50-59歳	96	21	23	18	28	6	0	5
	60-69歳	127	19	20	41	37	7	3	23
	70歳以上	160	11	26	49	52	20	2	58
	(再掲)20歳以上	576	144	112	137	139	37	7	91
	(再掲)40-74歳	331	84	67	77	82	16	5	32

血圧の状況(各分類に該当する人)

※血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外。

(人)

性別	年齢区分	総数(人)	至適血圧	正常	正常高値	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	(再掲) 収縮期高血圧
男性	15-19歳	6	6	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	14	7	3	1	3	0	0	1
	30-39歳	23	5	11	5	2	0	0	0
	40-49歳	38	6	8	8	13	2	1	0
	50-59歳	36	3	4	11	15	3	0	4
	60-69歳	39	5	9	13	10	2	0	3
	70歳以上	34	3	7	10	12	2	0	11
	(再掲)20歳以上	184	29	42	48	55	9	1	19
	(再掲)40-74歳	113	14	21	32	38	7	1	7
女性	15-19歳	14	13	1	0	0	0	0	0
	20-29歳	18	12	4	2	0	0	0	0
	30-39歳	27	24	1	2	0	0	0	0
	40-49歳	68	38	16	9	3	1	1	4
	50-59歳	42	14	17	4	6	1	0	0
	60-69歳	50	12	7	16	11	2	2	10
	70歳以上	34	6	7	10	7	4	0	7
	(再掲)20歳以上	239	106	52	43	27	8	3	21
	(再掲)40-74歳	160	64	40	29	20	4	3	14
総数	15-19歳	20	19	1	0	0	0	0	0
	20-29歳	32	19	7	3	3	0	0	1
	30-39歳	50	29	12	7	2	0	0	0
	40-49歳	106	44	24	17	16	3	2	4
	50-59歳	78	17	21	15	21	4	0	4
	60-69歳	89	17	16	29	21	4	2	13
	70歳以上	68	9	14	20	19	6	0	18
	(再掲)20歳以上	423	135	94	91	82	17	4	40
	(再掲)40-74歳	273	78	61	61	58	11	4	21

糖尿病が強く疑われる人及び予備群の人の割合（予備群をHbA1c5.5以上6.1未満で判定）

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる※1		予備群※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30-39歳	23	14.6%	13.5%	0.0%	0.0%	14.6%	13.5%
	40-49歳	39	4.0%	3.2%	0.0%	0.0%	4.0%	3.2%
	50-59歳	42	21.0%	7.5%	7.6%	5.3%	13.4%	6.6%
	60-69歳	54	31.8%	11.1%	5.8%	2.5%	26.0%	10.9%
	70歳以上	75	48.7%	10.7%	17.4%	6.3%	31.3%	7.1%
	(再掲)65-74歳	56	40.5%	8.3%	16.0%	7.2%	24.5%	9.5%
	(再掲)75歳以上	41	54.6%	12.0%	9.8%	4.2%	44.8%	13.2%
	(再掲)40-74歳 ※3	169	23.4%	5.1%	8.0%	2.9%	15.3%	5.0%
	(再掲)40-74歳 ※4	169	22.7%	5.1%	7.8%	2.9%	14.9%	4.9%
	(再掲)20歳以上 ※3	246	22.5%	4.6%	5.9%	1.8%	16.6%	3.8%
(再掲)20歳以上 ※4	246	20.6%	4.5%	5.4%	1.7%	15.3%	3.8%	
女性	20-29歳	16	4.4%	4.5%	0.0%	0.0%	4.4%	4.5%
	30-39歳	26	13.0%	7.3%	1.8%	1.8%	11.2%	7.2%
	40-49歳	66	14.2%	5.6%	0.9%	0.9%	13.4%	5.6%
	50-59歳	54	22.7%	7.2%	5.7%	2.6%	17.0%	7.0%
	60-69歳	70	28.1%	5.3%	5.8%	2.9%	22.3%	4.7%
	70歳以上	75	45.4%	8.3%	10.7%	4.8%	34.7%	8.7%
	(再掲)65-74歳	61	33.6%	5.7%	11.8%	5.3%	21.8%	5.8%
	(再掲)75歳以上	51	33.8%	8.6%	5.3%	2.7%	28.5%	8.4%
	(再掲)40-74歳 ※3	214	29.8%	4.1%	7.0%	2.5%	22.7%	4.5%
	(再掲)40-74歳 ※4	214	26.8%	3.8%	6.1%	2.0%	20.8%	3.9%
	(再掲)20歳以上 ※3	307	25.5%	3.1%	5.2%	1.6%	20.2%	2.9%
(再掲)20歳以上 ※4	307	21.8%	3.0%	4.3%	1.3%	17.5%	2.6%	
総数	20-29歳	29	2.2%	2.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.0%
	30-39歳	49	13.8%	7.4%	0.9%	0.9%	12.9%	7.4%
	40-49歳	105	9.1%	3.5%	0.4%	0.4%	8.7%	3.5%
	50-59歳	96	21.9%	6.2%	6.6%	2.9%	15.2%	6.0%
	60-69歳	124	29.9%	5.1%	5.8%	1.8%	24.1%	5.0%
	70歳以上	150	47.1%	8.9%	14.1%	3.9%	33.0%	7.1%
	(再掲)65-74歳	117	36.8%	5.5%	13.7%	3.5%	23.1%	4.7%
	(再掲)75歳以上	92	43.2%	8.5%	7.3%	2.6%	35.9%	8.9%
	(再掲)40-74歳 ※3	383	26.6%	4.0%	7.5%	1.6%	19.1%	3.5%
	(再掲)40-74歳 ※4	383	24.7%	3.9%	6.9%	1.5%	17.8%	3.5%
	(再掲)20歳以上 ※3	553	24.0%	3.2%	5.6%	1.0%	18.5%	2.8%
(再掲)20歳以上 ※4	553	21.2%	3.1%	4.8%	0.9%	16.4%	2.7%	

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる:HbA1c6.1以上またはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用している人

※2 予備群:HbA1c5.5以上6.1未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

糖尿病が強く疑われる人及び予備群の人の割合（予備群をHbA1c5.6以上6.1未満で判定）

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる※1		予備群※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30-39歳	23	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40-49歳	39	3.2%	3.1%	0.0%	0.0%	3.2%	3.1%
	50-59歳	42	20.2%	7.5%	7.6%	5.3%	12.6%	6.5%
	60-69歳	54	31.4%	11.1%	5.8%	2.5%	25.7%	10.9%
	70歳以上	75	36.9%	11.5%	17.4%	6.3%	19.5%	6.3%
	(再掲)65-74歳	56	32.4%	8.6%	16.0%	7.2%	17.8%	9.8%
	(再掲)75歳以上	41	46.5%	10.8%	9.8%	4.2%	36.8%	11.5%
	(再掲)40-74歳 ※3	169	20.2%	5.1%	8.0%	2.9%	12.2%	4.9%
	(再掲)40-74歳 ※4	169	19.8%	5.1%	7.8%	2.9%	12.0%	4.8%
	(再掲)20歳以上 ※3	246	17.2%	4.3%	5.9%	1.8%	11.3%	3.4%
	(再掲)20歳以上 ※4	246	15.6%	4.1%	5.4%	1.7%	10.2%	3.2%
女性	20-29歳	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30-39歳	26	3.1%	2.3%	1.8%	1.8%	1.3%	1.4%
	40-49歳	66	11.4%	5.6%	0.9%	0.9%	10.5%	5.6%
	50-59歳	54	10.7%	4.0%	5.7%	2.6%	5.0%	2.7%
	60-69歳	70	22.5%	5.3%	5.8%	2.9%	16.8%	5.2%
	70歳以上	75	31.0%	6.7%	10.7%	4.8%	20.3%	5.7%
	(再掲)65-74歳	61	18.8%	7.3%	11.8%	5.3%	5.4%	3.4%
	(再掲)75歳以上	51	33.8%	8.6%	5.3%	2.7%	28.6%	8.4%
	(再掲)40-74歳 ※3	214	17.3%	3.1%	7.0%	2.5%	10.2%	2.5%
	(再掲)40-74歳 ※4	214	16.0%	2.9%	6.1%	2.0%	10.0%	2.5%
	(再掲)20歳以上 ※3	307	16.3%	1.9%	5.2%	1.6%	11.1%	1.7%
	(再掲)20歳以上 ※4	307	13.3%	1.7%	4.3%	1.3%	9.0%	1.4%
総数	20-29歳	29	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30-39歳	49	1.5%	1.1%	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%
	40-49歳	105	7.2%	3.5%	0.4%	0.4%	6.8%	3.5%
	50-59歳	96	15.5%	4.2%	6.6%	2.9%	8.8%	3.6%
	60-69歳	124	26.9%	4.9%	5.8%	1.8%	21.1%	5.0%
	70歳以上	150	33.4%	5.3%	14.1%	3.9%	20.0%	4.2%
	(再掲)65-74歳	117	25.2%	5.4%	13.7%	3.5%	11.2%	5.5%
	(再掲)75歳以上	92	38.3%	7.4%	7.3%	2.6%	31.5%	7.5%
	(再掲)40-74歳 ※3	383	18.7%	2.9%	7.5%	1.6%	11.2%	2.7%
	(再掲)40-74歳 ※4	383	17.9%	2.9%	6.9%	1.5%	11.0%	2.7%
	(再掲)20歳以上 ※3	553	16.8%	2.2%	5.6%	1.0%	11.2%	1.9%
	(再掲)20歳以上 ※4	553	14.4%	2.2%	4.8%	0.9%	9.6%	1.8%

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる:HbA1c6.1以上またはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用している人

※2 予備群:HbA1c5.6以上6.1未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

脂質異常症が疑われる人の割合

性別	年齢区分	総数	脂質異常症が疑われる人※1	標準誤差
男性	20-29歳	13	2.2%	2.3%
	30-39歳	23	0.6%	0.7%
	40-49歳	39	15.0%	6.7%
	50-59歳	42	15.5%	6.0%
	60-69歳	54	13.5%	6.1%
	70歳以上	75	20.5%	5.3%
	(再掲)65-74歳	56	14.6%	6.1%
	(再掲)75歳以上	41	28.2%	9.1%
	(再掲)40-74歳※2	169	14.4%	3.3%
	(再掲)40-74歳※3	169	14.5%	3.4%
	(再掲)20歳以上※2	246	12.1%	2.3%
	(再掲)20歳以上※3	246	11.3%	2.2%
女性	20-29歳	16	0.0%	0.0%
	30-39歳	26	2.3%	2.4%
	40-49歳	66	0.0%	0.0%
	50-59歳	54	10.0%	6.1%
	60-69歳	70	18.9%	6.2%
	70歳以上	75	22.6%	8.2%
	(再掲)65-74歳	61	33.2%	5.3%
	(再掲)75歳以上	51	15.5%	5.5%
	(再掲)40-74歳※2	214	14.6%	3.6%
	(再掲)40-74歳※3	214	12.6%	3.2%
	(再掲)20歳以上※2	307	11.5%	2.5%
	(再掲)20歳以上※3	307	9.2%	2.2%
総数	20-29歳	29	1.1%	1.2%
	30-39歳	49	1.5%	1.2%
	40-49歳	105	7.6%	4.0%
	50-59歳	96	12.7%	4.1%
	60-69歳	124	16.3%	4.6%
	70歳以上	150	21.7%	4.2%
	(再掲)65-74歳	117	24.6%	4.1%
	(再掲)75歳以上	92	21.3%	5.3%
	(再掲)40-74歳※2	383	14.5%	2.1%
	(再掲)40-74歳※3	383	13.6%	2.1%
	(再掲)20歳以上※2	553	11.7%	1.6%
	(再掲)20歳以上※3	553	10.3%	1.6%

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬を服用または中性脂肪を下げる薬を服用

※2 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口に合わせるための重み付けをした値。

※3 ※2同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

メタボリックシンドロームが強く疑われる人及び予備群の人の割合

性別	年齢区分	総数	「強く疑われる」及び「予備群」		強く疑われる※1		予備群※2	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-29歳	13	13.3%	9.4%	0.0%	0.0%	13.3%	9.4%
	30-39歳	23	10.1%	5.6%	0.0%	0.0%	10.1%	5.6%
	40-49歳	39	44.8%	7.1%	12.6%	6.1%	32.3%	7.3%
	50-59歳	42	60.0%	10.1%	23.8%	7.6%	36.2%	8.4%
	60-69歳	54	45.0%	10.4%	27.8%	10.4%	17.2%	5.2%
	70歳以上	75	63.8%	6.4%	39.0%	8.5%	24.7%	7.4%
	(再掲)65-74歳	56	57.0%	7.6%	35.7%	8.1%	21.3%	7.1%
	(再掲)75歳以上	41	60.3%	12.7%	39.6%	12.5%	20.7%	8.0%
	(再掲)40-74歳 ※3	169	52.7%	4.5%	24.5%	5.0%	28.2%	3.9%
	(再掲)40-74歳 ※4	169	53.1%	4.6%	24.2%	5.0%	28.9%	4.0%
	(再掲)20歳以上 ※3	246	41.7%	4.9%	19.1%	4.0%	22.6%	3.0%
	(再掲)20歳以上 ※4	246	39.9%	5.0%	17.5%	3.9%	22.4%	3.1%
女性	20-29歳	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30-39歳	26	4.2%	3.1%	4.2%	3.1%	0.0%	0.0%
	40-49歳	66	1.2%	0.9%	0.0%	0.0%	1.2%	0.9%
	50-59歳	54	11.0%	4.3%	4.5%	2.3%	6.5%	3.5%
	60-69歳	70	25.1%	5.0%	7.2%	2.8%	17.9%	5.9%
	70歳以上	75	25.9%	5.7%	11.6%	3.8%	14.3%	5.3%
	(再掲)65-74歳	61	25.4%	5.3%	10.6%	4.4%	14.8%	5.8%
	(再掲)75歳以上	51	29.9%	6.6%	13.5%	5.3%	16.5%	6.1%
	(再掲)40-74歳 ※3	214	14.2%	2.8%	4.8%	1.6%	9.4%	2.5%
	(再掲)40-74歳 ※4	214	13.2%	2.6%	4.4%	1.4%	8.7%	2.3%
	(再掲)20歳以上 ※3	307	14.1%	2.5%	5.8%	1.5%	8.3%	1.9%
	(再掲)20歳以上 ※4	307	11.4%	2.2%	4.7%	1.2%	6.7%	1.6%
総数	20-29歳	29	3.8%	3.1%	0.0%	0.0%	3.8%	3.1%
	30-39歳	49	6.7%	3.4%	2.4%	1.7%	4.2%	2.2%
	40-49歳	105	8.8%	3.1%	2.2%	1.3%	6.6%	2.6%
	50-59歳	96	33.6%	7.2%	13.4%	4.1%	20.2%	5.2%
	60-69歳	124	32.8%	5.8%	15.2%	5.2%	17.6%	3.1%
	70歳以上	150	45.2%	4.3%	25.6%	5.4%	19.6%	5.1%
	(再掲)65-74歳	117	40.1%	4.7%	22.3%	4.5%	17.8%	3.0%
	(再掲)75歳以上	92	43.7%	6.7%	25.3%	7.2%	18.4%	5.2%
	(再掲)40-74歳 ※3	383	33.3%	3.4%	14.6%	2.6%	18.7%	2.3%
	(再掲)40-74歳 ※4	383	33.5%	3.6%	14.5%	2.7%	19.0%	2.4%
	(再掲)20歳以上 ※3	553	27.3%	3.4%	12.2%	2.3%	15.1%	2.1%
	(再掲)20歳以上 ※4	553	25.7%	3.4%	11.1%	2.2%	14.6%	2.1%

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 強く疑われる: HbA1c6.1以上またはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用している人

※2 予備群: HbA1c5.5以上6.1未満で※1以外の人

※3 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※4 ※3と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けした値。

メタボリックシンドロームの疑い判定基準(国民健康・栄養調査と同様の判定基準)

※1メタボリックシンドロームが強く疑われる人

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用

②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用

③HbA1c5.5%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用

※2予備群と考えられる人

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記の3項目のうち1項目以上に該当する人



血液検査結果

血色素量(g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	15.0	1.4	0.4	15.5	13.2	16.2	16	13.2	1.0	0.3	13.4	12.4	13.7
30-39歳	23	14.7	1.5	0.6	15.0	13.8	15.5	27	12.7	1.0	0.2	12.8	12.0	13.2
40-49歳	39	15.6	0.9	0.1	15.5	14.9	16.2	66	13.0	1.4	0.2	13.5	12.2	14.0
50-59歳	42	15.1	1.0	0.2	15.2	14.6	15.7	54	13.4	1.0	0.2	13.4	12.9	13.9
60-69歳	54	14.8	1.1	0.2	14.7	14.2	15.7	69	13.5	0.8	0.1	13.4	12.8	14.1
70歳以上	75	14.2	1.1	0.1	14.2	13.6	14.8	75	13.0	1.0	0.2	13.0	12.3	13.7
(再掲)20歳以上※1	246	14.9	1.2	0.1	14.9	14.2	15.7	307	13.1	1.1	0.1	13.2	12.4	13.7
(再掲)20歳以上※2	246	14.9	1.3	0.2	15.0	14.2	15.8	307	13.1	1.1	0.1	13.2	12.5	13.7
(再掲)40-74歳※1	169	15.0	1.1	0.1	15.1	14.3	15.8	213	13.3	1.0	0.1	13.4	12.6	14.0
(再掲)40-74歳※2	169	15.1	1.1	0.1	15.1	14.3	15.8	213	13.3	1.0	0.1	13.4	12.6	14.0

赤血球数(万個/ $\mu$ l)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	497.9	41.0	14.6	502.5	451.6	535.1	16	455.3	45.1	17.3	459.3	407.4	483.2
30-39歳	23	483.7	48.4	15.5	476.4	447.6	514.7	27	437.3	19.7	3.8	431.3	428.2	453.6
40-49歳	39	499.3	38.0	6.2	499.0	477.6	525.1	66	443.7	30.9	6.4	440.0	425.4	472.0
50-59歳	42	484.9	31.6	5.7	489.7	464.3	501.2	54	448.5	30.8	5.1	452.0	422.0	470.4
60-69歳	54	467.4	38.8	9.1	473.1	437.4	491.1	69	443.9	30.9	4.7	440.6	424.6	464.0
70歳以上	75	452.1	35.2	4.8	462.0	433.0	465.0	75	424.8	33.9	5.1	421.4	405.7	451.7
(再掲)20歳以上※1	246	478.5	42.1	4.4	478.2	451.4	510.8	307	439.4	33.3	3.2	436.0	417.4	462.4
(再掲)20歳以上※2	246	480.4	41.9	4.6	479.0	451.7	512.4	307	441.9	33.4	3.4	440.0	421.0	465.1
(再掲)40-74歳※1	169	479.8	38.2	4.5	479.7	457.5	501.0	213	440.9	30.5	2.8	440.0	420.0	461.7
(再掲)40-74歳※2	169	480.6	37.8	4.3	480.0	458.8	503.1	213	442.7	30.7	3.0	440.8	422.0	464.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

ヘマトクリット値(%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	44.3	3.9	1.1	45.7	39.8	47.2	16	40.1	3.0	1.1	39.9	37.5	42.8
30-39歳	23	43.9	3.8	1.3	44.7	40.7	45.5	27	38.9	2.4	0.5	39.1	37.6	40.1
40-49歳	39	45.8	2.5	0.4	45.9	44.0	47.4	66	39.7	3.4	0.6	40.4	37.9	42.2
50-59歳	42	45.1	2.6	0.5	45.3	44.1	46.6	54	41.0	2.4	0.4	41.2	39.6	42.5
60-69歳	54	44.8	3.2	0.7	44.5	43.1	47.1	69	41.1	2.4	0.3	41.1	39.6	42.9
70歳以上	75	43.1	2.9	0.4	43.5	41.9	44.8	75	40.0	2.8	0.5	39.6	38.1	41.9
(再掲)20歳以上※1	246	44.5	3.2	0.4	44.7	42.7	46.6	307	40.1	2.8	0.3	40.1	38.2	42.2
(再掲)20歳以上※2	246	44.5	3.2	0.4	44.8	42.7	46.6	307	40.1	2.8	0.3	40.1	38.3	42.1
(再掲)40-74歳※1	169	45.0	2.8	0.3	44.8	43.2	46.7	213	40.5	2.7	0.2	40.8	38.5	42.4
(再掲)40-74歳※2	169	45.0	2.8	0.3	45.1	43.2	46.7	213	40.5	2.7	0.3	40.9	38.7	42.4

平均赤血球容積(MCV) (fl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	89.0	4.0	1.2	88.6	85.5	90.9	16	88.4	3.6	1.2	87.4	84.8	91.3
30-39歳	23	90.9	3.2	1.0	90.5	89.3	93.9	27	89.0	4.3	0.8	89.0	87.6	90.5
40-49歳	39	92.1	5.2	1.1	91.4	89.0	94.7	66	89.7	6.2	1.3	91.7	87.5	94.0
50-59歳	42	93.1	3.1	0.6	93.0	91.5	95.0	54	91.6	4.8	0.7	91.4	88.7	94.1
60-69歳	54	95.9	4.8	1.1	95.7	91.6	100.1	69	92.7	3.7	0.5	91.7	89.9	95.7
70歳以上	75	95.7	5.1	0.9	95.3	92.7	98.2	75	94.3	3.9	0.5	94.3	92.0	96.9
(再掲)20歳以上※1	246	93.1	4.9	0.6	92.9	90.2	95.7	307	91.5	4.9	0.4	91.7	88.7	94.5
(再掲)20歳以上※2	246	92.8	4.9	0.6	92.4	89.9	95.5	307	91.0	4.9	0.4	91.2	88.2	94.0
(再掲)40-74歳※1	169	94.0	4.6	0.5	93.5	90.7	96.8	213	92.0	4.9	0.5	92.4	89.8	94.8
(再掲)40-74歳※2	169	93.9	4.6	0.5	93.4	90.7	96.5	213	91.7	5.0	0.5	91.7	89.7	94.3

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

平均赤血球血色素量(MCH) (pg)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	30.1	1.6	0.5	29.6	29.0	31.0	16	29.0	1.6	0.6	29.5	27.1	30.4
30-39歳	23	30.5	1.5	0.5	30.5	29.0	31.6	27	29.0	2.0	0.4	28.8	28.1	30.3
40-49歳	39	31.3	1.8	0.4	31.4	29.9	32.3	66	29.4	2.6	0.5	30.1	28.6	31.3
50-59歳	42	31.0	1.3	0.2	31.2	30.0	31.9	54	30.0	1.9	0.2	29.9	29.2	30.9
60-69歳	54	31.7	1.5	0.4	32.0	30.7	32.6	69	30.4	1.4	0.2	30.3	29.6	31.5
70歳以上	75	31.5	1.8	0.4	31.3	30.6	32.6	75	30.8	1.4	0.2	30.9	29.7	31.8
(再掲)20歳以上※1	246	31.1	1.7	0.2	31.1	29.8	32.2	307	29.9	1.9	0.1	30.2	29.1	31.2
(再掲)20歳以上※2	246	31.0	1.7	0.2	31.0	29.7	32.1	307	29.8	2.0	0.1	30.1	28.8	31.0
(再掲)40-74歳※1	169	31.4	1.5	0.2	31.4	30.4	32.5	213	30.1	2.0	0.2	30.3	29.2	31.3
(再掲)40-74歳※2	169	31.4	1.5	0.2	31.4	30.4	32.3	213	30.0	2.0	0.2	30.2	29.2	31.3

平均赤血球血色素濃度(MCHC) (%)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	33.8	0.7	0.2	33.7	33.1	34.5	16	32.9	0.9	0.3	33.1	31.9	33.5
30-39歳	23	33.5	0.9	0.4	33.4	33.0	34.3	27	32.6	0.9	0.2	32.3	32.1	33.6
40-49歳	39	34.0	0.6	0.1	33.9	33.7	34.3	66	32.7	1.1	0.1	32.9	32.2	33.3
50-59歳	42	33.3	0.8	0.2	33.2	32.7	33.9	54	32.7	0.8	0.1	32.6	32.5	33.3
60-69歳	54	33.1	0.8	0.2	32.9	32.4	33.5	69	32.8	0.6	0.1	32.9	32.5	33.2
70歳以上	75	32.9	0.9	0.2	33.1	32.2	33.5	75	32.6	0.7	0.1	32.6	32.2	33.1
(再掲)20歳以上※1	246	33.4	0.9	0.1	33.4	32.8	33.9	307	32.7	0.8	0.1	32.7	32.2	33.2
(再掲)20歳以上※2	246	33.4	0.9	0.1	33.4	32.9	34.0	307	32.7	0.8	0.1	32.7	32.2	33.3
(再掲)40-74歳※1	169	33.4	0.8	0.1	33.4	32.9	33.9	213	32.7	0.8	0.1	32.8	32.4	33.2
(再掲)40-74歳※2	169	33.4	0.8	0.1	33.4	32.9	33.9	213	32.7	0.8	0.1	32.8	32.4	33.2

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

フェリチンの分布 (ng/ml)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	86.9	21.2	6.8	89.6	78.6	102.4	16	75.8	18.9	5.4	70.9	65.5	94.4
30-39歳	23	86.4	21.4	3.7	85.0	71.4	96.5	27	78.1	28.7	6.2	86.0	63.3	96.8
40-49歳	39	100.4	28.4	5.3	100.9	80.6	117.0	66	66.5	32.2	3.9	69.4	47.0	91.7
50-59歳	42	86.8	22.7	3.3	85.0	72.0	94.7	54	84.1	27.0	4.3	82.0	64.0	102.3
60-69歳	54	90.2	30.0	4.2	81.0	74.9	100.7	69	76.2	24.6	5.2	73.1	61.0	90.8
70歳以上	75	83.1	30.7	4.9	75.0	60.5	102.0	75	70.7	22.7	3.5	65.3	52.0	83.4
(再掲)20歳以上※1	246	88.8	26.9	1.9	85.1	70.5	102.0	307	74.7	26.2	2.2	71.0	60.0	91.2
(再掲)20歳以上※2	246	88.7	26.3	1.9	85.5	71.4	102.0	307	75.5	26.4	2.3	73.0	61.0	93.0
(再掲)40-74歳※1	169	92.8	29.0	2.5	86.0	74.0	111.1	213	75.5	27.2	2.7	75.0	60.0	93.0
(再掲)40-74歳※2	169	92.5	28.6	2.4	86.0	73.7	111.0	213	76.0	27.9	2.9	75.0	60.0	94.0

※貧血治療のための薬服用者を除外。妊婦を含まない。

総たんぱく質値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	7.6	0.4	0.1	7.7	7.1	8.0	16	7.5	0.4	0.2	7.3	7.2	7.9
30-39歳	23	7.5	0.3	0.1	7.4	7.3	7.5	27	7.4	0.4	0.1	7.4	7.0	7.6
40-49歳	39	7.5	0.5	0.1	7.4	7.2	7.8	66	7.4	0.3	0.0	7.4	7.2	7.6
50-59歳	42	7.4	0.4	0.1	7.4	7.2	7.6	54	7.5	0.4	0.1	7.6	7.2	7.7
60-69歳	54	7.3	0.3	0.1	7.2	7.0	7.5	69	7.4	0.5	0.1	7.4	7.0	7.6
70歳以上	75	7.3	0.4	0.1	7.3	6.9	7.5	75	7.2	0.4	0.1	7.2	7.0	7.4
(再掲)20歳以上※1	246	7.4	0.4	0.0	7.4	7.1	7.6	307	7.4	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6
(再掲)20歳以上※2	246	7.4	0.4	0.0	7.4	7.2	7.7	307	7.4	0.4	0.0	7.4	7.1	7.6
(再掲)40-74歳※1	169	7.4	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6	213	7.4	0.4	0.1	7.4	7.1	7.6
(再掲)40-74歳※2	169	7.4	0.4	0.0	7.3	7.1	7.6	213	7.4	0.4	0.0	7.4	7.1	7.6

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

アルブミン値 (g/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	4.8	0.3	0.1	4.9	4.6	5.0	16	4.6	0.2	0.1	4.6	4.5	4.7
30-39歳	23	4.7	0.2	0.1	4.8	4.5	4.9	27	4.4	0.2	0.0	4.4	4.3	4.6
40-49歳	39	4.7	0.2	0.0	4.7	4.6	4.8	66	4.4	0.2	0.0	4.4	4.3	4.6
50-59歳	42	4.5	0.2	0.0	4.5	4.4	4.7	54	4.5	0.2	0.0	4.5	4.4	4.7
60-69歳	54	4.4	0.2	0.0	4.5	4.2	4.6	69	4.4	0.2	0.1	4.4	4.2	4.6
70歳以上	75	4.3	0.2	0.0	4.3	4.2	4.4	75	4.2	0.2	0.0	4.2	4.1	4.4
(再掲)20歳以上※1	246	4.6	0.3	0.0	4.5	4.4	4.7	307	4.4	0.2	0.0	4.4	4.2	4.6
(再掲)20歳以上※2	246	4.6	0.3	0.0	4.6	4.4	4.8	307	4.4	0.2	0.0	4.4	4.3	4.6
(再掲)40-74歳※1	169	4.5	0.2	0.0	4.5	4.4	4.7	213	4.4	0.2	0.0	4.4	4.2	4.6
(再掲)40-74歳※2	169	4.5	0.2	0.0	4.5	4.4	4.7	213	4.4	0.2	0.0	4.4	4.3	4.6

ヘモグロビンA1c (%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	4.9	0.2	0.1	4.9	4.8	5.1	16	5.0	0.2	0.1	5.0	4.9	5.2
30-39歳	23	5.0	0.3	0.1	4.9	4.9	5.2	27	5.0	0.3	0.1	5.0	4.8	5.1
40-49歳	39	5.0	0.3	0.1	5.0	4.8	5.2	66	5.1	0.4	0.1	5.1	4.9	5.3
50-59歳	42	5.1	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2	54	5.2	0.4	0.1	5.2	4.9	5.4
60-69歳	54	5.3	0.5	0.1	5.2	5.1	5.6	69	5.3	0.5	0.1	5.3	5.1	5.5
70歳以上	75	5.7	0.9	0.2	5.4	5.2	5.8	75	5.5	0.6	0.1	5.4	5.2	5.6
(再掲)20歳以上※1	246	5.2	0.6	0.1	5.1	4.9	5.4	307	5.2	0.5	0.0	5.2	5.0	5.5
(再掲)20歳以上※2	246	5.2	0.5	0.1	5.0	4.9	5.3	307	5.2	0.4	0.0	5.1	4.9	5.4
(再掲)40-74歳※1	169	5.2	0.6	0.1	5.1	4.9	5.3	213	5.3	0.5	0.0	5.3	5.0	5.5
(再掲)40-74歳※2	169	5.2	0.6	0.1	5.1	4.9	5.3	213	5.3	0.5	0.0	5.2	5.0	5.5

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

ヘモグロビンA1c(%) ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	4.9	0.2	0.1	4.9	4.8	5.1	16	5.0	0.2	0.1	5.1	4.8	5.2
30-39歳	23	5.0	0.3	0.1	4.9	4.9	5.2	26	5.0	0.3	0.1	5.0	4.8	5.1
40-49歳	39	5.0	0.3	0.1	5.0	4.8	5.2	65	5.1	0.3	0.0	5.1	4.9	5.3
50-59歳	41	5.1	0.3	0.1	5.0	4.9	5.2	52	5.2	0.4	0.1	5.2	4.9	5.4
60-69歳	52	5.3	0.5	0.1	5.2	5.1	5.6	67	5.3	0.5	0.1	5.3	5.1	5.5
70歳以上	64	5.4	0.4	0.1	5.3	5.1	5.7	68	5.4	0.3	0.0	5.4	5.2	5.6
(再掲)20歳以上※1	232	5.1	0.4	0.0	5.1	4.9	5.3	294	5.2	0.4	0.0	5.2	5.0	5.4
(再掲)20歳以上※2	232	5.1	0.4	0.0	5.0	4.9	5.3	294	5.2	0.4	0.0	5.1	4.9	5.4
(再掲)40-74歳※1	160	5.2	0.4	0.1	5.1	4.9	5.3	204	5.2	0.4	0.0	5.3	5.0	5.5
(再掲)40-74歳※2	160	5.1	0.4	0.0	5.1	4.9	5.3	204	5.2	0.4	0.0	5.2	5.0	5.4

血糖値 (mg/dl) 食後3時間以上の人のみ ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	88.1	6.9	2.5	88.2	82.0	93.0	16	88.7	6.4	2.0	91.1	81.9	92.2
30-39歳	23	92.9	6.9	2.2	93.0	86.6	98.5	27	89.9	6.6	1.7	90.0	83.0	95.0
40-49歳	39	90.0	11.1	1.9	88.0	82.3	96.0	66	95.7	14.0	1.7	94.0	90.0	97.0
50-59歳	42	97.6	8.0	1.3	95.0	92.7	105.0	54	93.9	13.4	2.2	92.0	87.0	97.0
60-69歳	54	98.2	16.5	3.7	99.0	89.0	108.8	69	109.4	24.9	4.7	103.0	95.0	110.0
70歳以上	75	123.4	42.7	7.9	107.0	95.0	140.9	75	114.6	20.8	2.9	110.0	100.0	122.9
(再掲)20歳以上※1	246	100.0	25.0	2.2	93.5	88.0	104.0	307	101.5	20.0	1.7	95.0	90.0	108.0
(再掲)20歳以上※2	246	98.8	23.4	2.1	93.0	88.0	102.5	307	98.7	18.5	1.5	95.0	89.0	102.0
(再掲)40-74歳※1	169	100.5	24.7	2.1	95.0	88.0	106.0	213	102.9	20.4	2.0	97.0	92.0	110.0
(再掲)40-74歳※2	169	100.0	23.6	2.0	95.0	88.0	105.5	213	101.2	19.7	1.9	96.0	91.0	107.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

血糖値 (mg/dl) 食後3時間以上の人のみ ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	88.1	6.9	2.5	88.2	82.0	93.0	16	88.7	6.4	2.0	91.0	81.9	92.2
30-39歳	23	92.9	6.9	2.2	92.8	86.6	98.5	26	89.9	6.7	1.8	90.0	83.0	94.3
40-49歳	39	90.0	11.1	1.9	88.0	82.3	96.0	65	94.7	8.1	1.4	94.0	90.0	97.0
50-59歳	41	97.9	8.2	1.4	96.7	92.0	105.0	52	92.7	9.1	1.9	92.0	87.0	97.0
60-69歳	52	98.1	16.5	3.8	98.9	89.0	108.5	67	109.2	24.7	4.7	103.0	95.9	110.0
70歳以上	64	115.2	32.1	5.4	105.6	93.5	136.0	68	112.4	18.7	3.0	110.0	99.3	121.0
(再掲)20歳以上※1	232	97.8	19.2	1.5	93.0	88.0	103.0	294	100.3	18.1	1.7	95.0	90.0	106.6
(再掲)20歳以上※2	232	96.9	18.1	1.5	93.0	88.0	101.0	294	97.7	16.7	1.5	94.0	89.0	101.0
(再掲)40-74歳※1	160	98.1	20.4	2.0	95.0	88.0	105.0	204	101.2	17.6	1.8	97.0	92.0	108.0
(再掲)40-74歳※2	160	97.8	19.6	1.9	95.0	88.0	105.0	204	99.7	17.0	1.7	96.0	90.1	105.0

総コレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	171.5	23.2	6.7	164.5	151.3	195.8	16	182.5	25.5	7.1	187.4	170.3	200.4
30-39歳	23	216.5	33.7	10.8	206.7	188.5	253.3	27	184.0	29.4	6.6	186.7	163.9	196.8
40-49歳	39	212.1	27.7	4.2	212.0	192.0	226.4	66	211.9	30.2	5.2	212.0	194.7	234.4
50-59歳	42	212.4	27.4	5.1	218.7	190.5	236.3	54	229.5	34.1	5.4	239.1	207.7	254.5
60-69歳	54	207.1	23.8	3.6	211.8	193.0	222.0	69	218.4	29.9	4.3	220.0	203.0	239.4
70歳以上	75	188.5	24.1	3.0	188.0	174.7	199.0	75	208.2	31.7	5.2	206.1	181.5	232.1
(再掲)20歳以上※1	246	202.5	30.4	3.4	199.0	181.1	224.0	307	207.5	34.1	2.4	205.0	186.0	231.0
(再掲)20歳以上※2	246	201.8	31.0	3.7	198.0	179.9	224.0	307	206.0	34.7	2.8	202.0	186.1	229.0
(再掲)40-74歳※1	169	206.7	27.0	2.7	208.4	187.0	227.0	213	218.3	32.2	2.2	219.0	199.0	242.0
(再掲)40-74歳※2	169	207.3	27.1	2.8	209.3	188.0	227.0	213	219.4	32.4	2.4	219.0	199.0	242.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

総コレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	171.5	23.2	6.7	164.5	151.3	195.8	16	182.5	25.5	7.1	187.4	170.3	200.4
30-39歳	23	216.5	33.7	10.8	206.7	188.5	253.3	27	184.0	29.4	6.6	186.7	163.9	199.0
40-49歳	37	211.9	28.4	4.5	210.8	192.0	227.0	66	211.9	30.2	5.2	212.0	194.7	234.2
50-59歳	37	214.0	26.7	4.6	222.1	197.0	236.2	48	230.9	34.0	5.8	239.5	209.7	254.4
60-69歳	51	207.9	23.6	3.5	212.0	194.2	222.0	51	221.9	29.7	4.7	221.8	208.5	247.5
70歳以上	66	188.6	24.0	3.1	184.7	176.0	198.9	60	212.4	31.5	4.3	211.9	186.2	236.0
(再掲)20歳以上※1	227	202.8	30.6	3.4	199.0	182.0	224.0	268	208.5	34.5	3.0	206.8	187.0	233.7
(再掲)20歳以上※2	227	202.1	31.2	3.8	199.0	181.0	224.0	268	206.5	35.2	3.3	202.0	187.0	230.0
(再掲)40-74歳※1	156	207.0	27.2	2.7	208.7	188.0	227.0	181	221.9	31.3	2.8	220.0	203.0	245.5
(再掲)40-74歳※2	156	207.7	27.3	2.7	209.9	188.0	227.0	181	222.2	31.8	3.0	220.0	203.0	246.3

中性脂肪 (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	155.1	193.7	41.4	116.1	50.0	131.2	16	86.5	38.8	9.8	74.0	62.4	109.1
30-39歳	23	131.8	66.5	18.4	139.5	74.7	163.6	27	84.3	52.0	12.5	74.3	47.0	107.5
40-49歳	39	180.7	152.8	25.0	128.7	89.7	206.3	66	78.6	29.4	4.5	77.0	52.0	92.6
50-59歳	42	167.6	129.0	23.3	136.0	83.1	228.8	54	118.9	86.7	12.9	87.5	68.1	138.0
60-69歳	54	135.5	63.3	11.1	133.6	73.2	179.1	69	131.2	63.3	9.7	126.6	75.0	167.0
70歳以上	75	136.8	80.5	13.3	127.0	81.0	166.9	75	155.9	85.9	13.1	140.5	94.1	192.7
(再掲)20歳以上※1	246	150.0	115.9	8.1	129.0	78.1	171.7	307	117.0	73.7	6.4	99.0	70.0	153.5
(再掲)20歳以上※2	246	150.9	120.9	9.3	129.0	77.0	171.0	307	110.1	70.0	5.7	89.0	68.0	138.0
(再掲)40-74歳※1	169	154.6	113.3	12.0	132.9	81.7	179.4	213	120.5	73.8	7.4	93.0	71.0	159.3
(再掲)40-74歳※2	169	156.3	115.7	12.7	133.3	82.3	179.7	213	116.6	73.0	6.5	88.0	70.0	145.8

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



血液検査結果

中性脂肪 (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	155.1	193.7	41.4	116.1	49.1	131.2	16	86.5	38.8	9.8	74.0	62.4	109.1
30-39歳	23	131.8	66.5	18.4	139.5	74.7	163.6	27	84.3	52.0	12.5	74.3	46.5	107.5
40-49歳	37	179.0	156.2	24.8	123.9	88.1	195.9	66	78.6	29.4	4.5	76.9	52.0	92.6
50-59歳	37	175.2	134.5	24.8	139.3	93.8	270.3	48	111.9	67.7	13.6	89.8	68.9	137.8
60-69歳	51	134.3	63.5	11.3	132.3	71.8	177.9	51	126.5	61.4	11.5	123.0	75.0	166.8
70歳以上	66	138.3	78.0	14.3	129.4	81.0	169.0	60	155.4	90.7	14.8	139.5	93.2	188.5
(再掲)20歳以上※1	227	150.7	117.6	8.2	129.0	78.1	171.2	268	112.1	70.0	6.5	93.2	70.0	142.4
(再掲)20歳以上※2	227	151.7	122.7	9.4	128.7	76.1	170.5	268	105.5	64.7	5.7	87.1	67.1	129.0
(再掲)40-74歳※1	156	154.8	115.1	12.3	132.7	81.4	177.3	181	112.6	66.5	6.7	87.5	70.0	143.0
(再掲)40-74歳※2	156	157.0	117.9	13.0	133.4	81.8	179.1	181	109.3	64.0	6.3	86.0	70.0	137.6

HDLコレステロール(mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	58.7	14.3	4.0	61.4	43.7	70.0	16	66.5	13.5	4.5	76.2	52.9	78.0
30-39歳	23	57.9	11.4	2.7	56.0	49.4	64.4	27	65.9	9.7	2.4	66.8	58.4	72.9
40-49歳	39	56.0	15.0	3.3	55.0	45.2	61.9	66	69.4	13.0	2.4	70.4	60.5	76.8
50-59歳	42	58.3	16.3	3.3	55.0	47.3	65.9	54	71.2	15.2	2.7	71.1	59.0	82.5
60-69歳	54	63.2	17.2	3.5	66.0	47.3	77.4	69	63.1	16.7	2.9	59.8	50.0	72.0
70歳以上	75	52.7	13.5	2.1	50.0	43.0	62.2	75	61.3	14.5	1.7	56.0	50.0	73.8
(再掲)20歳以上※1	246	57.6	14.9	0.9	56.0	45.0	66.7	307	65.5	14.4	1.3	65.0	54.0	75.0
(再掲)20歳以上※2	246	57.7	14.8	1.0	56.0	45.0	67.0	307	66.2	14.2	1.4	66.0	55.0	76.1
(再掲)40-74歳※1	169	58.5	16.1	1.4	56.0	45.0	67.2	213	66.7	15.3	1.2	66.0	54.0	76.0
(再掲)40-74歳※2	169	58.5	16.1	1.4	56.0	45.0	67.0	213	67.4	15.3	1.4	67.0	55.0	77.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

HDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	58.7	14.3	4.0	62.5	43.7	70.0	16	66.5	13.5	4.5	76.5	52.9	78.0
30-39歳	23	57.9	11.4	2.7	54.9	54.0	64.4	27	65.9	9.7	2.4	66.8	58.4	72.9
40-49歳	37	56.7	15.0	3.1	55.7	45.9	63.5	66	69.4	13.0	2.4	70.0	61.0	76.8
50-59歳	37	57.2	17.1	3.8	55.0	42.8	64.0	48	71.1	15.1	3.0	71.0	59.0	82.7
60-69歳	51	63.9	17.1	3.4	66.0	47.9	78.0	51	63.8	17.8	3.4	60.2	50.0	72.0
70歳以上	66	52.5	13.6	2.2	50.0	43.0	61.6	60	62.0	14.5	1.9	58.0	49.0	74.6
(再掲)20歳以上※1	227	57.7	15.1	1.0	56.0	45.0	66.7	268	66.0	14.4	1.6	66.0	55.0	76.0
(再掲)20歳以上※2	227	57.7	15.0	1.0	56.0	45.0	66.7	268	66.6	14.1	1.6	67.0	56.0	77.0
(再掲)40-74歳※1	156	58.6	16.4	1.4	56.0	45.0	69.8	181	67.4	15.5	1.7	67.0	55.0	77.0
(再掲)40-74歳※2	156	58.5	16.4	1.5	56.0	45.0	67.2	181	68.0	15.4	1.8	68.2	56.8	77.9

LDLコレステロール (mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	96.9	23.8	8.0	102.0	75.3	118.7	16	100.1	23.6	7.4	106.0	82.6	116.5
30-39歳	23	135.2	30.6	9.3	139.5	108.9	162.1	27	102.8	27.9	5.1	98.5	87.3	105.3
40-49歳	39	130.2	26.0	4.1	129.0	115.2	147.6	66	127.0	28.7	5.8	126.0	108.0	145.3
50-59歳	42	122.0	25.3	4.8	125.0	98.0	147.2	54	131.2	31.0	4.9	136.2	112.9	145.5
60-69歳	54	116.0	23.2	3.7	113.6	102.1	125.9	69	128.3	32.2	3.2	128.0	99.6	149.0
70歳以上	75	109.7	21.9	3.0	109.1	98.0	119.0	75	115.9	27.9	4.2	111.0	93.0	134.7
(再掲)20歳以上※1	246	119.1	27.6	3.0	117.1	101.1	139.2	307	118.4	30.7	1.9	118.0	93.0	137.0
(再掲)20歳以上※2	246	118.7	28.0	3.2	118.0	100.6	139.0	307	117.6	31.0	2.1	115.0	92.4	137.0
(再掲)40-74歳※1	169	120.2	25.0	2.3	118.0	102.0	138.9	213	126.9	31.3	2.9	127.0	104.0	145.2
(再掲)40-74歳※2	169	120.6	25.1	2.4	118.3	102.0	140.1	213	127.7	31.0	2.6	128.0	106.2	145.7

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

LDLコレステロール(mg/dl) ※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	96.9	23.8	8.0	102.0	75.3	118.7	16	100.1	23.6	7.4	106.0	87.0	116.5
30-39歳	23	135.2	30.6	9.3	139.5	108.9	162.1	27	102.8	27.9	5.1	98.5	87.3	105.3
40-49歳	37	129.5	26.4	4.4	124.0	114.0	146.7	66	127.0	28.7	5.8	125.8	108.0	145.3
50-59歳	37	123.6	25.0	4.5	125.3	101.3	149.0	48	132.9	30.2	5.4	136.4	114.3	145.8
60-69歳	51	116.5	23.6	3.9	114.0	102.4	132.0	51	131.3	33.2	4.0	131.7	110.1	152.1
70歳以上	66	110.3	21.1	3.1	109.7	98.3	118.8	60	119.4	27.9	3.2	122.3	93.0	134.9
(再掲)20歳以上※1	227	119.5	27.6	3.1	118.0	102.0	140.0	268	119.6	31.0	1.9	118.0	93.0	137.0
(再掲)20歳以上※2	227	119.0	28.1	3.3	118.0	101.6	139.1	268	118.3	31.2	2.3	116.0	93.0	137.0
(再掲)40-74歳※1	156	120.4	25.1	2.4	118.0	103.0	138.2	181	130.7	30.6	2.6	131.0	112.0	148.0
(再掲)40-74歳※2	156	120.9	25.2	2.4	118.9	103.0	140.0	181	130.6	30.5	2.7	132.6	112.0	148.0

クレアチニン(mg/dl)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	0.8	0.1	0.0	0.8	0.8	0.9	16	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.6
30-39歳	23	0.9	0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	27	0.6	0.1	0.0	0.5	0.5	0.6
40-49歳	39	0.8	0.1	0.0	0.8	0.8	0.9	66	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6
50-59歳	42	1.0	1.2	0.1	0.8	0.8	1.0	54	0.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.7
60-69歳	54	0.8	0.1	0.0	0.8	0.7	0.9	69	0.6	0.2	0.0	0.6	0.5	0.7
70歳以上	75	0.8	0.2	0.0	0.8	0.7	0.9	75	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.7
(再掲)20歳以上※1	246	0.9	0.5	0.0	0.8	0.8	0.9	307	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.7
(再掲)20歳以上※2	246	0.9	0.5	0.0	0.8	0.8	0.9	307	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.6
(再掲)40-74歳※1	169	0.9	0.6	0.0	0.8	0.8	0.9	213	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.7
(再掲)40-74歳※2	169	0.9	0.7	0.0	0.8	0.8	0.9	213	0.6	0.1	0.0	0.6	0.5	0.7

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

推算GFR (ml/min/1.73m<sup>2</sup>)

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	104.4	18.1	5.5	101.0	93.1	109.3	16	103.4	16.6	3.9	105.3	93.7	112.0
30-39歳	23	78.8	10.7	3.0	78.1	67.7	84.7	27	100.1	13.5	4.0	102.9	87.4	108.3
40-49歳	39	83.1	10.6	1.6	82.3	78.1	87.3	66	83.6	10.3	1.4	82.2	78.4	91.9
50-59歳	42	73.4	12.7	2.3	78.7	63.7	80.8	54	80.2	14.5	2.4	78.6	70.4	89.3
60-69歳	54	76.2	13.4	2.0	71.8	67.3	86.6	69	79.0	12.8	1.6	78.0	70.5	86.8
70歳以上	75	71.4	14.9	1.9	71.9	62.7	80.1	75	70.5	13.0	2.1	68.6	59.6	81.0
(再掲)20歳以上※1	246	79.5	16.4	1.7	79.0	68.8	86.9	307	83.1	17.5	1.6	82.2	70.4	93.8
(再掲)20歳以上※2	246	80.6	17.1	2.0	79.3	69.3	87.2	307	85.9	17.9	1.6	85.2	73.1	99.6
(再掲)40-74歳※1	169	76.5	13.2	1.4	78.2	68.1	83.6	213	78.9	13.2	1.0	79.1	70.4	86.8
(再掲)40-74歳※2	169	76.4	13.2	1.5	78.6	68.1	83.3	213	79.6	13.2	1.0	79.6	70.4	88.4

血清鉄

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	86.9	21.2	6.8	89.6	78.6	102.4	16.0	75.8	18.9	5.4	70.9	65.5	94.4
30-39歳	23	86.4	21.4	3.7	85.0	71.4	96.5	27.0	78.1	28.7	6.2	86.0	63.1	96.8
40-49歳	39	100.4	28.4	5.3	100.9	80.6	117.0	66.0	66.8	32.0	3.8	69.5	47.2	91.7
50-59歳	42	86.5	22.0	3.2	81.4	73.0	93.6	54.0	84.3	27.0	4.3	82.0	64.3	102.4
60-69歳	54	90.2	30.0	4.2	81.0	74.9	100.7	69.0	76.0	24.4	5.1	71.5	61.0	91.0
70歳以上	75	83.1	30.7	4.9	74.8	62.0	102.0	75.0	70.6	22.3	3.4	65.2	52.0	83.0
(再掲)20歳以上※1	246	88.7	26.8	1.9	85.0	71.0	102.0	307.0	74.7	26.1	2.2	71.0	60.0	91.0
(再掲)20歳以上※2	246	88.6	26.1	1.9	85.5	71.8	102.0	307.0	75.5	26.3	2.3	73.0	61.0	93.0
(再掲)40-74歳※1	169	92.6	28.8	2.5	86.0	74.0	111.0	213.0	75.5	27.1	2.6	75.0	60.0	93.0
(再掲)40-74歳※2	169	92.3	28.4	2.4	85.9	74.0	110.5	213.0	76.0	27.7	2.8	75.0	60.0	93.2

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

TIBC

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	328.9	56.6	18.6	320.2	287.4	389.6	16	392.6	59.1	19.4	371.2	363.1	459.3
30-39歳	23	366.3	36.7	10.9	369.4	342.7	391.2	27	354.8	53.1	16.9	351.0	299.0	391.7
40-49歳	39	336.0	42.6	6.8	339.6	306.3	371.0	66	360.5	48.4	9.6	349.6	317.5	388.8
50-59歳	42	337.3	40.1	6.6	343.4	311.0	362.7	54	338.7	40.6	7.5	335.3	317.0	356.6
60-69歳	54	316.6	34.3	6.4	310.5	290.5	343.4	69	326.0	41.0	3.5	328.5	295.9	349.7
70歳以上	75	307.9	41.1	7.3	309.0	280.2	336.4	75	306.2	49.4	8.7	302.0	275.0	332.8
(再掲)20歳以上※1	246	331.2	45.1	5.2	329.9	298.0	363.3	307	338.4	54.8	5.3	333.8	300.2	369.0
(再掲)20歳以上※2	246	332.6	45.6	5.6	330.2	299.2	365.0	307	345.4	55.3	5.6	341.0	303.4	378.0
(再掲)40-74歳※1	169	326.8	39.2	3.6	323.3	297.3	352.6	213	334.0	46.2	4.0	331.0	301.0	357.7
(再掲)40-74歳※2	169	327.9	39.4	3.7	326.5	297.9	353.0	213	337.0	45.9	4.0	334.6	303.7	363.8

GOT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	19.0	7.2	1.4	16.4	15.4	20.2	16	18.1	2.7	0.6	17.6	16.3	19.5
30-39歳	23	25.3	8.4	2.0	24.7	18.9	30.3	27	18.8	11.2	1.8	18.0	15.0	19.0
40-49歳	39	26.3	9.4	1.6	23.7	20.0	30.0	66	19.1	4.1	0.6	18.0	16.0	21.6
50-59歳	42	23.5	4.6	0.8	24.0	21.0	26.0	54	22.5	4.2	0.8	22.0	21.0	24.7
60-69歳	54	25.1	8.4	1.2	24.0	21.0	28.0	69	23.2	8.7	0.9	22.3	18.9	25.0
70歳以上	75	24.8	8.6	1.3	23.0	19.0	28.0	75	23.9	8.6	1.2	22.4	20.0	25.5
(再掲)20歳以上※1	246	24.3	8.2	0.7	23.0	19.0	28.0	307	21.5	7.9	0.6	20.0	18.0	23.0
(再掲)20歳以上※2	246	24.1	8.1	0.7	22.0	19.0	28.0	307	21.0	7.6	0.6	20.0	17.0	23.0
(再掲)40-74歳※1	169	24.9	7.6	0.7	24.0	21.0	28.0	213	22.2	8.1	0.7	21.8	18.0	24.0
(再掲)40-74歳※2	169	24.9	7.4	0.7	24.0	21.0	28.0	213	22.0	7.4	0.6	21.9	18.0	24.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

GPT

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	18.3	14.4	2.9	14.3	13.0	16.2	16	18.1	7.4	2.2	19.8	9.9	21.9
30-39歳	23	26.7	15.5	2.8	23.0	19.8	31.1	27	17.6	24.1	3.9	13.0	11.0	16.0
40-49歳	39	35.0	22.6	3.8	29.0	18.0	45.7	66	16.0	8.2	0.8	14.0	12.0	18.1
50-59歳	42	25.1	9.7	1.5	23.0	19.0	32.4	54	19.5	7.8	1.3	17.0	15.3	20.0
60-69歳	54	23.1	14.7	2.3	19.0	16.0	25.3	69	19.6	13.5	1.4	16.0	15.0	19.0
70歳以上	75	21.8	9.1	1.0	21.0	15.0	26.0	75	19.5	12.2	1.7	17.0	14.0	20.0
(再掲)20歳以上※1	246	25.2	15.4	1.1	22.0	16.0	28.0	307	18.6	13.5	0.9	16.0	13.0	20.0
(再掲)20歳以上※2	246	25.0	15.4	1.1	22.0	16.0	28.6	307	18.4	13.6	1.0	16.0	13.0	20.0
(再掲)40-74歳※1	169	27.0	16.1	1.5	23.0	18.0	30.3	213	19.2	12.4	1.1	16.2	14.0	19.4
(再掲)40-74歳※2	169	27.0	15.9	1.5	23.0	18.0	31.2	213	18.9	11.5	0.9	16.0	14.0	19.3

γ GTP

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	22.4	18.3	4.1	14.4	12.1	21.0	16	17.1	11.4	2.9	13.5	9.2	20.0
30-39歳	23	33.8	33.1	6.0	20.0	20.0	29.9	27	17.4	25.3	4.1	12.0	12.0	15.0
40-49歳	39	44.8	24.6	4.1	36.5	27.1	57.1	66	16.3	6.7	0.8	15.0	12.0	19.0
50-59歳	42	54.4	62.0	9.0	33.8	23.5	63.0	54	32.6	33.3	8.0	17.8	15.2	32.0
60-69歳	54	43.5	32.6	6.2	34.0	20.0	48.5	69	21.7	11.2	1.6	19.0	15.0	26.0
70歳以上	75	34.4	27.2	2.6	26.0	21.0	42.8	75	18.0	7.1	1.2	16.4	14.0	20.0
(再掲)20歳以上※1	246	39.5	36.8	2.7	28.0	20.0	47.0	307	20.4	18.5	1.3	16.0	13.0	20.0
(再掲)20歳以上※2	246	39.2	37.6	2.9	28.0	20.0	47.0	307	20.8	20.0	1.5	15.0	12.0	20.0
(再掲)40-74歳※1	169	45.0	40.1	3.1	33.2	23.0	53.0	213	22.7	19.6	2.3	17.0	15.0	22.0
(再掲)40-74歳※2	169	45.8	41.9	3.3	33.5	23.0	53.9	213	23.5	21.4	2.8	17.2	15.0	22.0

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血液検査結果

尿酸

年齢階級	男 性							女 性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
20-29歳	13	5.2	1.5	0.4	5.2	4.6	6.1	16	4.7	1.1	0.3	4.6	4.4	5.2
30-39歳	23	6.7	1.6	0.6	6.4	5.5	8.0	27	3.6	1.1	0.3	3.7	3.1	4.0
40-49歳	39	6.1	1.4	0.2	5.9	5.3	7.2	66	3.9	0.8	0.2	4.0	3.2	4.6
50-59歳	42	6.3	0.9	0.2	6.2	5.6	6.9	54	4.6	0.9	0.1	4.6	4.2	4.9
60-69歳	54	5.6	1.2	0.2	5.4	4.7	6.6	69	4.2	1.1	0.2	4.1	3.5	5.0
70歳以上	75	5.9	1.2	0.2	5.9	5.5	6.4	75	4.7	1.1	0.1	4.7	3.9	5.6
(再掲)20歳以上※1	246	6.0	1.4	0.2	5.9	5.3	6.8	307	4.3	1.1	0.1	4.2	3.6	5.0
(再掲)20歳以上※2	246	6.0	1.4	0.2	5.9	5.3	6.8	307	4.3	1.1	0.1	4.3	3.6	5.0
(再掲)40-74歳※1	169	6.0	1.2	0.1	6.0	5.3	6.8	213	4.3	1.0	0.1	4.3	3.6	4.9
(再掲)40-74歳※2	169	6.0	1.2	0.1	6.0	5.3	6.8	213	4.3	1.0	0.1	4.3	3.6	4.9

注)

・妊婦は含まれていない

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

血色素量の分布(人) ※貧血治療のための薬服用者を除外。

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	10.0未満	0	0	0	0	0	0	0
	10.0-11.0未満	0	0	0	0	0	1	1
	11.0-12.0	0	0	0	0	0	2	2
	12.0-13.0	0	1	0	1	3	9	14
	13.0-14.0	2	0	1	5	10	15	33
	14.0-15.0	1	6	9	13	16	28	73
	15.0-16.0	4	12	14	15	13	15	73
	16.0-17.0	5	3	12	8	12	5	45
	17.0-18.0	1	0	3	0	0	0	4
18.0以上	0	1	0	0	0	0	1	
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	10.0未満	0	1	2	1	0	1	5
	10.0-11.0未満	0	2	3	1	1	0	7
	11.0-12.0	0	1	4	2	1	5	13
	12.0-13.0	5	7	21	9	18	27	87
	13.0-14.0	8	11	22	27	27	29	124
	14.0-15.0	2	3	12	12	19	9	57
	15.0-16.0	0	1	2	2	3	4	12
	16.0-17.0	1	0	0	0	0	0	1
	17.0-18.0	0	0	0	0	0	0	0
18.0以上	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	16	26	66	54	69	75	306

赤血球数の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	400万個/ $\mu$ l未満	0	0	0	1	2	8	11
	400-450未満	2	2	2	6	12	22	46
	450-500	2	8	18	21	32	36	117
	500-550	8	12	14	14	7	9	64
	550-600	1	0	5	0	1	0	7
	600万個/ $\mu$ l以上	0	1	0	0	0	0	1
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	400万個/ $\mu$ l未満	1	1	3	2	7	14	28
	400-450未満	5	12	33	24	31	42	147
	450-500	8	13	28	25	27	16	117
	500-550	2	0	2	3	4	3	14
	550-600	0	0	0	0	0	0	0
	600万個/ $\mu$ l以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数	16	26	66	54	69	75	306

ヘマトクリット値の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	25.0%未満	0	0	0	0	0	0.0	0
	25.0-30.0未満	0	0	0	0	0	0	0
	30.0-35.0	0	0	0	0	0	2	2
	35.0-40.0	2	1	0	3	4	10	20
	40.0-45.0	2	8	16	16	26	48	116
	45.0-50.0	8	13	20	22	22	14	99
	50.0-55.0	1	0	3	1	2	1	8
	55.0%以上	0	1	0	0	0	0	1
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	25.0%未満	0	0	1	0	0	0	1
	25.0-30.0未満	0	1	0	0	0	1	2
	30.0-35.0	0	1	4	2	1	2	10
	35.0-40.0	7	14	29	14	20	36	120
	40.0-45.0	8	10	28	36	43	31	156
	45.0-50.0	1	0	4	2	5	5	17
	50.0-55.0	0	0	0	0	0	0	0
	55.0%以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数	16	26	66	54	69	75	306



平均赤血球容積(MCV)の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	70fl未満	0	0	0	0	0	0.0	0
	70-75.0未満	0	0	0	0	0	0	0
	75.0-80.0	0	0	0	0	0	1	1
	80.0-85.0	3	0	4	1	0	1	9
	85.0-90.0	5	7	10	7	6	5	40
	90.0-95.0	3	14	17	22	22	28	106
	95.0-100	2	2	5	11	20	29	69
	100-105	0	0	3	1	6	8	18
	105-110	0	0	0	0	0	2	2
	110-115	0	0	0	0	0	0	0
	115~119	0	0	0	0	0	1	1
	120fl以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数		13	23	39	42	54	75
女性	70fl未満	0	1	1	1	0	0.0	3
	70-75.0未満	0	0	1	0	0	0	1
	75.0-80.0	0	1	4	1	0	0	6
	80.0-85.0	2	1	9	3	0	2	17
	85.0-90.0	8	15	15	17	16	6	77
	90.0-95.0	6	6	29	23	33	36	133
	95.0-100	0	2	7	7	18	28	62
	100-105	0	0	0	2	2	3	7
	105-110	0	0	0	0	0	0	0
	110-115	0	0	0	0	0	0	0
	115~119	0	0	0	0	0	0	0
	120fl以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数		16	26	66	54	69	75

平均赤血球血色素量(MCH)の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	20pg未満	0	0	0	0	0	0.0	0
	20.0-25.0未満	0	0	0	0	0	1	1
	25.0-27.0	0	0	0	0	0	1	1
	27.0-29.0	1	3	4	5	1	2	16
	29.0~31.0	9	9	13	12	16	21	80
	31.0-33.0	2	10	15	22	32	37	118
	33.0~35.0	1	1	6	3	5	12	28
	35.0~40.0	0	0	1	0	0	1	2
	40.0pg以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数		13	23	39	42	54	75
女性	20pg未満	0	1	1	1	0	0	3
	20.0-25.0未満	0	1	5	1	0	1	8
	25.0-27.0	1	1	6	2	1	1	12
	27.0-29.0	4	9	9	9	8	5	44
	29.0~31.0	10	9	32	27	36	30	144
	31.0-33.0	1	5	12	12	21	35	86
	33.0~35.0	0	0	1	2	3	3	9
	35.0~40.0	0	0	0	0	0	0	0
	40.0pg以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数		16	26	66	54	69	75

平均赤血球血色素濃度(MCHC)の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	24~25.9	0	0	0	0	0	0	0
	26~27.9	0	0	0	0	0	0.0	0
	28~29.9	0	0	0	0	0	0	0
	30~31.9	0	0	0	1	2	7	10
	32~33.9	5	14	22	30	40	58	169
	34以上	8	9	17	11	12	10	67
総数		13	23	39	42	54	75	246
女性	24~25.9	0	0	1	0	0	0	1
	26~27.9	0	0	0	0	0	0	0
	28~29.9	0	1	0	2	0	0	3
	30~31.9	1	4	13	5	7	13	43
	32~33.9	11	21	47	42	59	59	239
	34以上	3	0	5	5	2	3	18
総数		15	26	66	54	68	75	304

フェリチンの分布(人)

※貧血治療のための薬服用者を除外。

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	9未満	0	0	0	0	0	0	0
	10-19	0	0	0	0	0	0	0
	20-29	0	0	0	0	0	1	1
	30-39	0	0	0	0	1	2	3
	40-49	1	4	0	1	1	1	8
	50-59	1	2	2	4	5	16	30
	60-69	0	3	4	4	3	10	24
	70-79	2	1	3	8	8	15	37
	80-89	3	3	7	10	8	7	38
	90-99	3	4	2	4	9	7	29
	100-110	2	2	4	2	5	3	18
	110-119	0	2	7	4	3	5	21
	120-129	1	0	3	1	2	2	9
	130-139	0	1	3	2	1	5	12
	140-149	0	1	2	0	6	0	9
	150-159	0	0	0	1	0	0	1
	160-169	0	0	1	0	1	0	2
	170-179	0	0	1	1	0	0	2
	180-189	0	0	0	0	0	0	0
	190-199	0	0	0	0	1	1	2
200以上	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	9未満	0	1	2	0	0	0	3
	10-19	0	1	4	1	0	0	6
	20-29	0	0	5	2	0	1	8
	30-39	0	5	2	1	2	1	11
	40-49	3	1	6	2	7	9	28
	50-59	2	2	12	4	11	16	47
	60-69	3	9	7	11	16	15	61
	70-79	3	1	9	9	12	11	45
	80-89	1	2	7	9	6	12	37
	90-99	2	3	5	6	6	3	25
	100-110	2	0	5	5	3	2	17
	110-119	0	0	0	1	2	4	7
	120-129	0	0	0	0	2	0	2
	130-139	0	0	0	1	1	0	2
	140-149	0	1	0	1	0	1	3
	150-159	0	1	1	0	1	0	3
	160-169	0	0	0	1	0	0	1
	170-179	0	0	0	0	0	0	0
	180-189	0	0	0	0	0	0	0
	190-199	0	0	0	0	0	0	0
200以上	0	0	1	0	0	0	1	
	総数	16	27	66	54	69	75	307

総たんぱく質値の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	6.0g/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	6.0-6.5未満	0	0	0	0	0	1	1
	6.5-7.0	1	0	2	4	10	15	32
	7.0-7.5	4	7	18	20	25	31	105
	7.5-8.0	3	11	15	14	16	24	83
	8.0-8.5	5	4	3	4	3	3	22
	8.5g/dl以上	0	1	1	0	0	1	3
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	6.0g/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	6.0-6.5未満	0	0	0	1	0	1	2
	6.5-7.0	0	1	3	7	8	13	32
	7.0-7.5	8	14	33	18	29	33	135
	7.5-8.0	6	10	21	23	29	23	112
	8.0-8.5	1	1	9	2	3	5	21
	8.5g/dl以上	1	0	0	3	1	0	5
	総数	16	26	66	54	70	75	307

アルブミン値の分布(人)

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	3.0g/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	3.0-3.2未満	0	0	0	0	0	0	0
	3.2-3.4	0	0	0	0	0	0	0
	3.4-3.6	0	0	0	0	0	0	0
	3.6-3.8	0	0	0	0	0	2	2
	3.8-4.0	0	0	0	0	0	4	4
	4.0-4.2	0	0	0	2	6	8	16
	4.2-4.4	1	0	1	5	12	25	44
	4.4-4.6	0	5	8	15	16	27	71
	4.6-4.8	3	3	22	12	16	7	63
	4.8-5.0	3	10	6	8	4	2	33
	5.0-5.2	6	5	2	0	0	0	13
	5.2g/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
総数	13	23	39	42	54	75	246	
女性	3.0g/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	3.0-3.2未満	0	0	0	0	0	0	0
	3.2-3.4	0	0	0	0	0	0	0
	3.4-3.6	0	0	1	0	0	0	1
	3.6-3.8	0	0	0	0	0	2	2
	3.8-4.0	0	0	1	1	0	4	6
	4.0-4.2	0	1	3	2	6	17	29
	4.2-4.4	3	7	13	12	16	19	70
	4.4-4.6	3	6	25	19	21	19	93
	4.6-4.8	4	9	19	13	19	9	73
	4.8-5.0	6	2	3	5	7	5	28
	5.0-5.2	0	1	1	2	1	0	5
	5.2g/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
総数	16	26	66	54	70	75	307	

ヘモグロビンA1cの分布 ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	4.0%未満	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	0	0	1	0	0	0	1
	4.4-4.5	0	1	1	1	1	0	4
	4.6-4.7	3	4	6	5	2	3	23
	4.8-4.9	4	5	10	8	5	3	35
	5.0-5.1	4	6	11	12	13	12	58
	5.2	0	4	4	4	6	6	24
	5.3	0	1	3	3	7	8	22
	5.4	2	1	1	0	3	8	15
	5.5	0	1	1	1	1	9	13
	5.6	0	0	0	3	4	1	8
	5.7	0	0	0	2	3	2	7
	5.8	0	0	0	0	1	3	4
	5.9	0	0	0	1	0	2	3
	6	0	0	1	0	2	3	6
	6.1	0	0	0	0	2	1	3
	6.2-6.3	0	0	0	1	2	4	7
	6.4-6.5	0	0	0	1	0	4	5
	6.6-6.7	0	0	0	0	0	1	1
	6.8-6.9	0	0	0	0	1	3	4
	7.0-7.1	0	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	0	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	0	0	0	0	1	0	1
	7.6-7.7	0	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	0	0	0	0	0	1	1
	8.0-8.1	0	0	0	0	0	1	1
	8.2-8.3	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	0	0	0	0	0	0	0
8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	0	0	0	0	0	0	0	
9.0%以上	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	4.0%未満	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	1	1	0	0	0	1	3
	4.6-4.7	2	4	5	3	5	1	20
	4.8-4.9	4	5	10	8	2	2	31
	5.0-5.1	6	9	19	5	11	11	61
	5.2	2	1	8	8	5	10	34
	5.3	0	2	11	4	12	12	41
	5.4	0	0	3	10	11	9	33
	5.5	1	2	5	8	7	5	28
	5.6	0	0	4	1	5	6	16
	5.7	0	2	0	1	3	3	9
	5.8	0	0	0	1	3	3	7
	5.9	0	0	0	1	0	0	1
	6	0	0	0	0	1	4	5
	6.1	0	0	0	0	1	1	2
	6.2-6.3	0	0	0	3	2	2	7
	6.4-6.5	0	0	0	0	0	0	0
	6.6-6.7	0	0	0	0	0	1	1
	6.8-6.9	0	0	0	0	0	2	2
	7.0-7.1	0	0	0	1	0	1	2
	7.2-7.3	0	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	0	0	0	0	0	0	0
	7.6-7.7	0	0	1	0	0	0	1
	7.8-7.9	0	0	0	0	0	0	0
	8.0-8.1	0	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	0	0	0	0	1	0	1
8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	0	0	0	0	0	0	0	
9.0%以上	0	0	0	0	0	1	1	
	総数	16	26	66	54	69	75	306

ヘモグロビンA1cの分布 ※インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除外

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	4.0%未満	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	0	0	1	0	0	0	1
	4.4-4.5	0	1	1	1	1	0	4
	4.6-4.7	3	4	6	4	2	3	22
	4.8-4.9	4	5	10	8	5	3	35
	5.0-5.1	4	6	11	12	13	11	57
	5.2	0	4	4	4	6	6	24
	5.3	0	1	3	3	7	8	22
	5.4	2	1	1	0	3	8	15
	5.5	0	1	1	1	1	9	13
	5.6	0	0	0	3	4	1	8
	5.7	0	0	0	2	3	2	7
	5.8	0	0	0	0	1	3	4
	5.9	0	0	0	1	0	2	3
	6	0	0	1	0	2	2	5
	6.1	0	0	0	0	1	1	2
	6.2-6.3	0	0	0	1	2	2	5
	6.4-6.5	0	0	0	1	0	2	3
	6.6-6.7	0	0	0	0	0	1	1
	6.8-6.9	0	0	0	0	0	0	0
	7.0-7.1	0	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	0	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	0	0	0	0	1	0	1
	7.6-7.7	0	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	0	0	0	0	0	0	0
	8.0-8.1	0	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	0	0	0	0	0	0	0
8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	0	0	0	0	0	0	0	
9.0%以上	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	13	23	39	41	52	64	232
女性	4.0%未満	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	1	1	0	0	0	1	3
	4.6-4.7	2	4	5	3	5	1	20
	4.8-4.9	4	5	10	8	2	2	31
	5.0-5.1	6	9	19	5	11	11	61
	5.2	2	1	8	8	5	10	34
	5.3	0	2	11	4	11	12	40
	5.4	0	0	3	10	11	9	33
	5.5	1	2	5	8	7	5	28
	5.6	0	0	4	1	5	6	16
	5.7	0	1	0	1	3	3	8
	5.8	0	0	0	1	3	2	6
	5.9	0	0	0	1	0	0	1
	6	0	0	0	0	1	4	5
	6.1	0	0	0	0	1	0	1
	6.2-6.3	0	0	0	2	1	1	4
	6.4-6.5	0	0	0	0	0	0	0
	6.6-6.7	0	0	0	0	0	1	1
	6.8-6.9	0	0	0	0	0	0	0
	7.0-7.1	0	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	0	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	0	0	0	0	0	0	0
	7.6-7.7	0	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	0	0	0	0	0	0	0
	8.0-8.1	0	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	0	0	0	0	1	0	1
8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	0	0	0	0	0	0	0	
9.0%以上	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	16	25	65	52	67	68	293

血糖値の分布		食後3時間以上の人のみ						インスリン注射又は血糖下げる薬服用者を含む
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	0	0	0	0	0	0	0
	60-80	1	1	5	1	3	2	13
	80-100	12	19	26	28	23	29	137
	100-120	0	3	6	12	22	23	66
	120-140	0	0	2	1	3	8	14
	140-160	0	0	0	0	3	6	9
	160-180	0	0	0	0	0	2	2
	180-200	0	0	0	0	0	2	2
	200-220	0	0	0	0	0	0	0
	220-240	0	0	0	0	0	0	0
	240-260	0	0	0	0	0	1	1
	260mg/dl以上	0	0	0	0	0	2	2
	再掲) 110mg/dl以_	0	1	3	3	12	34	53
総数		13	23	39	42	54	75	246
女性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	0	0	0	0	0	0	0
	60-80	1	2	3	0	0	0	6
	80-100	14	21	50	40	27	26	178
	100-120	1	3	12	11	31	30	88
	120-140	0	0	0	2	7	12	21
	140-160	0	0	0	0	2	4	6
	160-180	0	0	0	0	1	1	2
	180-200	0	0	0	1	0	1	2
	200-220	0	0	1	0	0	1	2
	220-240	0	0	0	0	0	0	0
	240-260	0	0	0	0	1	0	1
	260mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
	再掲) 110mg/dl以_	0	1	6	7	19	28	61
総数		16	26	66	54	69	75	306

血糖値の分布		食後3時間以上の人のみ						※インスリン注射又は血糖下げる薬服用者を除外
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	0	0	0	0	0	0	0
	60-80	1	1	5	1	3	1	12
	80-100	12	19	26	27	22	29	135
	100-120	0	3	6	12	21	18	60
	120-140	0	0	2	1	3	6	12
	140-160	0	0	0	0	3	6	9
	160-180	0	0	0	0	0	2	2
	180-200	0	0	0	0	0	1	1
	200-220	0	0	0	0	0	0	0
	220-240	0	0	0	0	0	0	0
	240-260	0	0	0	0	0	1	1
	260mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
	再掲) 110mg/dl以_	0	1	3	3	11	27	45
総数		13	23	39	41	52	64	232
女性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	0	0	0	0	0	0	0
	60-80	1	2	3	0	0	0	6
	80-100	14	20	50	40	26	26	176
	100-120	1	3	12	10	31	29	86
	120-140	0	0	0	2	7	9	18
	140-160	0	0	0	0	1	2	3
	160-180	0	0	0	0	1	1	2
	180-200	0	0	0	0	0	1	1
	200-220	0	0	0	0	0	0	0
	220-240	0	0	0	0	0	0	0
	240-260	0	0	0	0	1	0	1
	260mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
	再掲) 110mg/dl以_	0	1	5	5	18	22	51
総数		16	25	65	52	67	68	293

総コレステロール (mg/dl)		※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む						
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	120mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	120-140未満	1	0	0	0	1	0	2
	140-160	3	3	1	1	1	4	13
	160-180	3	3	4	6	8	19	43
	180-200	5	6	11	7	15	22	66
	200-220	0	4	10	10	13	11	48
	220-240	1	1	6	10	9	5	32
	240-260	0	3	4	6	4	2	19
	260-280	0	2	3	1	1	1	8
	280-300	0	1	0	0	0	0	1
	300mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
総数		13	23	39	41	52	64	232
女性	120mg/dl未満	1	0	1	0	0	0	2
	120-140未満	0	0	2	0	1	0	3
	140-160	2	7	2	2	3	2	18
	160-180	6	7	12	1	8	7	41
	180-200	4	6	16	7	11	17	61
	200-220	3	2	14	14	15	20	68
	220-240	0	1	10	6	17	14	48
	240-260	0	1	4	13	7	6	31
	260-280	0	0	4	6	4	2	16
	280-300	0	1	0	2	1	0	4
	300mg/dl以上	0	0	0	1	0	0	1
総数		16	25	65	52	67	68	293

総コレステロール (mg/dl)		※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外						
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	120mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	120-140未満	1	0	0	0	1	1	3
	140-160	3	3	1	1	1	6	15
	160-180	3	3	4	5	9	20	44
	180-200	5	6	11	7	14	22	65
	200-220	0	4	8	10	12	10	44
	220-240	1	1	6	8	9	4	29
	240-260	0	3	4	5	4	2	18
	260-280	0	2	3	1	1	1	8
	280-300	0	1	0	0	0	0	1
	300mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
総数		13	23	37	37	51	66	227
女性	120mg/dl未満	1	0	1	0	0	0	2
	120-140未満	0	0	2	0	1	0	3
	140-160	2	7	2	2	2	2	17
	160-180	6	7	12	1	5	5	36
	180-200	4	6	16	6	6	15	53
	200-220	3	3	15	12	13	17	63
	220-240	0	1	10	7	13	12	43
	240-260	0	1	4	11	6	6	28
	260-280	0	0	4	6	4	3	17
	280-300	0	1	0	2	1	0	4
	300mg/dl以上	0	0	0	1	0	0	1
総数		16	26	66	48	51	60	267

中性脂肪の分布

※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	20mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	20-50	2	2	1	1	4	8	18
	50-80	4	7	6	9	9	15	50
	80-110	1	1	10	8	10	16	46
	110-140	3	4	4	5	7	14	37
	140-170	1	2	6	3	9	7	28
	170-200	0	1	1	4	5	7	18
	200mg/dl以上	2	6	11	12	10	8	49
	再掲)150以上	2	8	15	18	20	21	84
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	20mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	20-50	4	5	11	4	4	4	32
	50-80	7	11	28	16	14	16	92
	80-110	1	4	15	15	14	14	63
	110-140	3	1	10	8	14	14	50
	140-170	0	2	1	2	12	5	22
	170-200	0	1	1	2	4	9	17
	200mg/dl以上	1	2	0	7	8	13	31
	再掲)150以上	1	5	1	10	18	26	61
	総数	16	26	66	54	70	75	307

中性脂肪の分布

※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	20mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	20-50	2	2	1	1	4	6	16
	50-80	4	7	6	8	8	13	46
	80-110	1	1	10	6	10	15	43
	110-140	3	4	4	5	7	11	34
	140-170	1	2	5	3	9	7	27
	170-200	0	1	1	2	4	7	15
	200mg/dl以上	2	6	10	12	9	7	46
	再掲)150以上	2	8	14	16	18	20	78
	総数	13	23	37	37	51	66	227
女性	20mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	20-50	4	5	11	4	4	2	30
	50-80	7	11	28	13	12	13	84
	80-110	1	4	15	14	10	12	56
	110-140	3	1	10	8	8	10	40
	140-170	0	2	1	2	9	4	18
	170-200	0	1	1	2	3	9	16
	200mg/dl以上	1	2	0	5	5	10	23
	再掲)150以上	1	5	1	8	14	22	51
	総数	16	26	66	48	51	60	267



HDL-コレステロール値の分布		※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む						
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	30mg/dl未満	0	0	1	0	0	2	3
	30-40	1	1	4	3	6	9	24
	40-50	2	6	10	9	8	17	52
	50-60	2	7	11	15	7	18	60
	60-70	2	4	5	8	17	15	51
	70-80	5	1	5	3	9	12	35
	80-90	0	4	2	1	4	2	13
	90-100	1	0	1	1	1	0	4
	100mg/dl以上	0	0	0	2	2	0	4
	総数		13	23	39	42	54	75
女性	30mg/dl未満	0	0	0	0	0	1	1
	30-40	0	1	0	0	2	4	7
	40-50	2	1	4	4	10	12	33
	50-60	3	8	15	16	23	23	88
	60-70	4	9	18	11	12	12	66
	70-80	7	5	17	12	15	15	71
	80-90	0	2	7	3	5	5	22
	90-100	0	0	2	6	2	2	12
	100mg/dl以上	0	0	3	2	1	1	7
	総数		16	26	66	54	70	75

HDL-コレステロール値の分布		※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外						
性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	30mg/dl未満	0	0	1	0	0	2	3
	30-40	1	1	3	3	6	8	22
	40-50	2	6	10	9	7	16	50
	50-60	2	7	10	15	6	15	55
	60-70	2	4	5	5	16	13	45
	70-80	5	1	5	1	9	10	31
	80-90	0	4	2	1	4	2	13
	90-100	1	0	1	1	1	0	4
	100mg/dl以上	0	0	0	2	2	0	4
	総数		13	23	37	37	51	66
女性	30mg/dl未満	0	0	0	0	0	1	1
	30-40	0	1	0	0	2	3	6
	40-50	2	1	4	3	8	12	30
	50-60	3	8	15	15	15	16	72
	60-70	4	9	18	10	8	10	59
	70-80	7	5	17	10	11	13	63
	80-90	0	2	7	3	4	4	20
	90-100	0	0	2	5	2	1	10
	100mg/dl以上	0	0	3	2	1	0	6
	総数		16	26	66	48	51	60

## LDL-コレステロール値の分布

※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を含む

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-50	0	0	0	0	0	0	0
	50-60	2	1	0	0	1	2	6
	60-70	0	1	0	1	2	0	4
	70-80	2	0	1	2	2	4	11
	80-90	2	2	2	3	3	11	23
	90-100	1	1	3	8	4	11	28
	100-110	1	4	2	2	13	16	38
	110-120	3	4	4	3	10	14	38
	120-130	2	1	9	7	7	8	34
	130-140	0	1	5	4	3	1	14
	140-150	0	1	4	3	5	5	18
	150-160	0	1	1	5	2	1	10
	160-170	0	1	3	3	2	1	10
	170-180	0	3	4	1	0	0	8
	180-190	0	1	1	0	0	1	3
	190-200	0	1	0	0	0	0	1
	200-210	0	0	0	0	0	0	0
	210-220	0	0	0	0	0	0	0
	220mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-50	0	0	1	0	0	0	1
	50-60	0	0	0	0	0	1	1
	60-70	3	1	1	1	1	1	8
	70-80	1	5	2	2	6	2	18
	80-90	3	4	7	1	5	8	28
	90-100	2	2	7	3	6	7	27
	100-110	2	3	9	3	3	12	32
	110-120	3	5	6	7	6	8	35
	120-130	1	4	11	11	15	7	49
	130-140	1	0	9	4	8	13	35
	140-150	0	0	6	5	8	8	27
	150-160	0	0	2	6	4	5	17
	160-170	0	1	3	4	1	0	9
	170-180	0	0	0	1	5	1	7
	180-190	0	0	1	2	1	1	5
	190-200	0	0	1	2	0	1	4
	200-210	0	0	0	1	0	0	1
	210-220	0	0	0	1	1	0	2
	220mg/dl以上	0	1	0	0	0	0	1
	総数	16	26	66	54	70	75	307

## LDL-コレステロール値の分布

※コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者を除外

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-50	0	0	0	0	0	0	0
	50-60	2	1	0	0	1	1	5
	60-70	0	1	0	1	2	0	4
	70-80	2	0	1	2	2	4	11
	80-90	2	2	2	3	3	8	20
	90-100	1	1	3	6	4	11	26
	100-110	1	4	2	2	11	15	35
	110-120	3	4	4	3	9	13	36
	120-130	2	1	9	6	7	6	31
	130-140	0	1	5	3	3	1	13
	140-150	0	1	2	3	5	4	15
	150-160	0	1	1	4	2	1	9
	160-170	0	1	3	3	2	1	10
	170-180	0	3	4	1	0	0	8
	180-190	0	1	1	0	0	1	3
	190-200	0	1	0	0	0	0	1
	200-210	0	0	0	0	0	0	0
	210-220	0	0	0	0	0	0	0
	220mg/dl以上	0	0	0	0	0	0	0
	総数	13	23	37	37	51	66	227
女性	40mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	40-50	0	0	1	0	0	0	1
	50-60	0	0	0	0	0	1	1
	60-70	3	1	1	0	1	1	7
	70-80	1	5	2	2	4	2	16
	80-90	3	4	7	1	3	5	23
	90-100	2	2	7	2	3	6	22
	100-110	2	3	9	2	2	9	27
	110-120	3	5	6	7	5	7	33
	120-130	1	4	11	9	11	5	41
	130-140	1	0	9	4	5	11	30
	140-150	0	0	6	5	6	6	23
	150-160	0	0	2	6	3	4	15
	160-170	0	1	3	3	1	0	8
	170-180	0	0	0	1	5	1	7
	180-190	0	0	1	2	1	1	5
	190-200	0	0	1	2	0	1	4
	200-210	0	0	0	1	0	0	1
	210-220	0	0	0	1	1	0	2
	220mg/dl以上	0	1	0	0	0	0	1
	総数	16	26	66	48	51	60	267

クレアチニンの分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	0.4mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	0.4-0.5	0	0	0	0	0	0	0
	0.5-0.6	1	1	0	0	2	3	7
	0.6-0.7	1	0	3	3	7	15	29
	0.7-0.8	7	4	15	14	15	10	65
	0.8-0.9	2	12	16	11	19	23	83
	0.9-1.0	2	4	3	7	7	13	36
	1.0-1.2	0	2	1	6	1	7	17
	1.2-1.4	0	0	1	0	1	1	3
	1.4-1.6	0	0	0	0	0	1	1
	1.6-1.8	0	0	0	0	0	0	0
	1.8-2.0	0	0	0	0	0	0	0
2.0mg/dl以上	0	0	0	1	0	0	1	
総数		13	23	39	42	52	73	242
女性	0.4mg/dl未満	0	0	0	0	0	0	0
	0.4-0.5	0	1	3	5	6	10	25
	0.5-0.6	9	9	30	20	26	19	113
	0.6-0.7	4	12	20	20	27	24	107
	0.7-0.8	2	4	12	5	8	16	47
	0.8-0.9	0	0	1	3	1	4	9
	0.9-1.0	0	0	0	0	0	1	1
	1.0-1.2	1	0	0	0	0	1	2
	1.2-1.4	0	0	0	0	0	0	0
	1.4-1.6	0	0	0	0	0	0	0
	1.6-1.8	0	0	0	0	0	0	0
	1.8-2.0	0	0	0	0	0	0	0
2.0mg/dl以上	0	0	0	0	1	0	1	
総数		16	26	66	53	69	75	305

推算GFR(ml/min/1.73m<sup>2</sup>) の分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	15ml/min/1.73mm <sup>2</sup> 未満	0	0	0	1	0	0	1
	15-29	0	0	0	0	0	0	0
	30-59	0	0	1	1	4	15	21
	60-89	2	19	27	36	43	50	177
	90ml/min/1.73mm <sup>2</sup> 以上	11	4	11	4	7	10	47
	総数	13	23	39	42	54	75	246
女性	15ml/min/1.73mm <sup>2</sup> 未満	0	0	0	0	0	0	0
	15-29	0	0	0	0	1	0	1
	30-59	1	0	1	3	3	20	28
	60-89	3	15	41	39	55	49	202
	90ml/min/1.73mm <sup>2</sup> 以上	12	11	24	12	11	6	76
	総数	16	26	66	54	70	75	307

血清鉄の分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	9未満	0	0	0	0	0	0	0
	10-19	0	0	0	0	0	0	0
	20-29	0	0	0	0	0	1	1
	30-39	0	0	0	0	1	2	3
	40-49	1	4	0	1	1	1	8
	50-59	1	2	2	4	5	16	30
	60-69	0	3	4	4	3	10	24
	70-79	2	1	3	8	8	15	37
	80-89	3	3	7	10	8	7	38
	90-99	3	4	2	4	9	7	29
	100-110	2	2	4	2	5	3	18
	110-119	0	2	7	4	3	5	21
	120-129	1	0	3	1	2	2	9
	130-139	0	1	3	2	1	5	12
	140-149	0	1	2	0	6	0	9
	150-159	0	0	0	1	0	0	1
	160-169	0	0	1	0	1	0	2
	170-179	0	0	1	1	0	0	2
	180-189	0	0	0	0	0	0	0
	190-199	0	0	0	0	1	1	2
200以上	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	13	23	39	42	54	75	246
女性	9未満	0	1	2	0	0	0	3
	10-19	0	1	4	1	0	0	6
	20-29	0	0	5	2	0	1	8
	30-39	0	5	2	1	2	1	11
	40-49	3	1	6	2	7	9	28
	50-59	2	2	12	4	11	16	47
	60-69	3	9	7	11	16	15	61
	70-79	3	1	9	9	12	11	45
	80-89	1	2	7	9	6	12	37
	90-99	2	3	5	6	6	3	25
	100-110	2	0	5	5	3	2	17
	110-119	0	0	0	1	2	4	7
	120-129	0	0	0	0	2	0	2
	130-139	0	0	0	1	1	0	2
	140-149	0	1	0	1	0	1	3
	150-159	0	1	1	0	1	0	3
	160-169	0	0	0	1	0	0	1
	170-179	0	0	0	0	0	0	0
	180-189	0	0	0	0	0	0	0
	190-199	0	0	0	0	0	0	0
200以上	0	0	1	0	0	0	1	
	合計	16	27	66	54	69	75	307

## TIBCの分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	210未満	0	0	0	0	0	1	1
	210-219	0	0	0	0	0	1	1
	220-229	0	0	0	1	0	0	1
	230-239	0	0	0	1	0	1	2
	240-249	1	0	1	0	0	4	6
	250-259	0	0	0	0	1	0	1
	260-269	0	1	1	0	3	5	10
	270-279	0	1	2	1	0	4	8
	280-289	1	1	1	2	3	4	12
	290-299	1	0	3	3	6	9	22
	300-309	1	1	2	2	10	10	26
	310-319	1	0	4	3	5	6	19
	320-329	2	2	4	5	8	4	25
	330-339	0	3	1	6	3	7	20
	340-349	1	5	5	6	4	3	24
	350-359	0	5	4	3	2	5	19
	360-369	1	0	2	3	3	4	13
	370-379	1	1	4	2	1	3	12
	380-389	0	0	2	1	3	0	6
	390-399	0	1	0	1	1	0	3
400-409	2	1	1	0	0	1	5	
410-419	1	1	1	0	1	0	4	
420-429	0	0	0	0	0	0	0	
430-439	0	0	0	0	0	1	1	
440-449	0	0	1	2	0	1	4	
450-459	0	0	0	0	0	0	0	
460-469	0	0	0	0	0	0	0	
470-	0	0	0	0	0	1	1	
合計		13	23	39	42	54	75	246
女性	210未満	0	0	0	0	0	0	0
	210-219	0	0	0	0	0	1	1
	220-229	0	0	0	0	0	0	0
	230-239	0	0	0	0	0	3	3
	240-249	0	0	0	2	0	2	4
	250-259	0	0	0	0	2	1	3
	260-269	0	0	0	1	3	4	8
	270-279	1	0	1	0	2	6	10
	280-289	0	0	2	3	5	5	15
	290-299	1	3	3	1	4	6	18
	300-309	0	2	2	4	4	10	22
	310-319	1	1	5	5	6	7	25
	320-329	1	3	4	6	5	6	25
	330-339	0	1	6	6	8	2	23
	340-349	1	1	5	4	11	10	32
	350-359	0	5	2	3	8	2	20
	360-369	3	1	6	2	3	3	18
	370-379	2	2	3	5	2	0	14
	380-389	1	2	4	1	2	1	11
	390-399	1	0	5	1	1	1	9
400-409	0	0	3	4	1	1	9	
410-419	0	1	5	2	0	1	9	
420-429	1	1	3	2	1	0	8	
430-439	0	0	1	1	0	1	3	
440-449	1	2	1	0	0	0	4	
450-459	0	0	1	1	0	2	4	
460-469	2	1	2	0	0	0	5	
470-	0	1	2	0	0	0	3	
合計		16	27	66	54	69	75	307

GOTの分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	10未満	0	0	0	1	0	0	1
	10-11	1	0	0	0	0	0	1
	12-13	0	0	0	0	0	0	0
	14-15	2	2	1	0	2	2	9
	16-17	3	1	5	3	5	5	22
	18-19	4	5	2	4	3	9	27
	20-21	1	2	5	9	10	9	36
	22-23	0	1	5	8	7	9	30
	24-25	0	2	3	6	5	8	24
	26-27	0	3	3	6	7	9	28
	28-29	0	2	5	2	7	7	23
	30-31	1	3	2	0	3	3	12
	32-33	0	0	2	0	1	4	7
	34-35	0	0	3	2	1	2	8
	36-37	1	0	0	1	0	2	4
	38-39	0	0	0	0	1	3	4
	40-44	0	0	1	0	0	0	1
	45-49	0	0	0	0	0	1	1
	50-54	0	0	1	0	0	1	2
	55-59	0	1	1	0	0	0	2
60-64	0	1	0	0	0	0	1	
65-69	0	0	0	0	1	0	1	
70以上	0	0	0	0	1	1	2	
	合計	13	23	39	42	54	75	246
女性	10未満	0	0	0	0	1	0	1
	10-11	0	1	0	0	0	0	1
	12-13	0	2	1	1	0	0	4
	14-15	3	7	13	2	3	0	28
	16-17	3	4	19	4	9	3	42
	18-19	3	7	10	3	8	12	43
	20-21	5	3	6	15	10	14	53
	22-23	1	1	8	10	13	11	44
	24-25	1	0	1	6	7	11	26
	26-27	0	0	2	4	6	7	19
	28-29	0	0	1	3	4	7	15
	30-31	0	1	1	5	3	5	15
	32-33	0	0	1	1	1	0	3
	34-35	0	0	1	0	2	1	4
	36-37	0	0	1	0	0	2	3
	38-39	0	0	1	0	0	0	1
	40-44	0	0	0	0	1	0	1
	45-49	0	0	0	0	0	1	1
	50-54	0	0	0	0	0	0	0
	55-59	0	0	0	0	0	0	0
60-64	0	0	0	0	0	0	0	
65-69	0	0	0	0	0	0	0	
70以上	0	1	0	0	1	1	3	
	合計	16	27	66	54	69	75	307

## GPTの分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	10未満	2	0	0	2	1	1	6
	10-11	1	0	0	0	1	3	5
	12-13	3	1	1	1	3	6	15
	14-15	2	1	3	3	4	8	21
	16-17	2	2	4	6	7	10	31
	18-19	1	1	3	6	10	10	31
	20-21	0	0	2	5	4	6	17
	22-23	0	4	3	4	4	7	22
	24-25	0	3	2	2	5	5	17
	26-27	0	5	0	2	5	8	20
	28-29	0	0	3	0	4	1	8
	30-31	0	1	2	1	0	2	6
	32-33	0	2	2	2	1	2	9
	34-35	0	0	0	2	0	1	3
	36-37	0	0	0	2	1	1	4
	38-39	0	0	2	0	1	0	3
	40-44	0	0	2	2	1	1	6
	45-49	0	0	2	0	0	0	2
	50-54	1	0	2	1	0	1	5
	55-59	1	1	1	1	0	0	4
60-64	0	0	0	0	0	2	2	
65-69	0	0	0	0	0	0	0	
70以上	0	2	5	0	2	0	9	
合計		13	23	39	42	54	75	246
女性	10未満	2	3	5	1	1	2	14
	10-11	2	6	10	1	2	5	26
	12-13	1	7	15	3	7	4	37
	14-15	0	2	11	10	17	17	57
	16-17	1	4	4	9	12	14	44
	18-19	3	1	5	7	10	10	36
	20-21	2	0	3	7	5	7	24
	22-23	1	1	1	1	5	1	10
	24-25	0	1	2	3	3	4	13
	26-27	0	0	0	2	0	6	8
	28-29	1	1	4	4	1	2	13
	30-31	1	0	1	1	0	1	4
	32-33	1	0	0	0	1	0	2
	34-35	1	0	2	0	1	0	4
	36-37	0	0	0	0	0	0	0
	38-39	0	0	1	1	0	0	2
	40-44	0	0	0	1	0	0	1
	45-49	0	0	1	2	2	0	5
	50-54	0	0	0	1	1	1	3
	55-59	0	0	0	0	0	0	0
60-64	0	0	0	0	0	0	0	
65-69	0	0	0	0	0	0	0	
70以上	0	1	1	0	1	1	4	
合計		16	27	66	54	69	75	307



γ GTPの分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	10未満	0	0	0	0	0	0	0
	10-11	1	0	0	0	0	1	2
	12-13	3	0	0	2	1	6	12
	14-15	2	0	1	0	4	2	9
	16-17	0	3	2	3	2	5	15
	18-19	0	1	2	4	3	4	14
	20-21	4	4	1	2	6	10	27
	22-23	0	1	2	2	3	4	12
	24-25	0	0	2	2	3	6	13
	26-27	0	0	1	0	3	5	9
	28-29	0	1	3	1	2	4	11
	30-31	1	1	3	4	1	2	12
	32-33	0	1	0	2	1	0	4
	34-35	0	2	2	1	4	3	12
	36-37	0	0	3	2	0	0	5
	38-39	0	0	0	0	1	0	1
	40-44	0	0	2	2	2	4	10
	45-49	0	1	4	2	4	7	18
	50-54	0	4	2	1	1	2	10
	55-59	0	0	0	1	1	2	4
60-64	1	0	3	4	1	1	10	
65-69	0	0	0	1	1	0	2	
70以上	1	4	6	6	10	7	34	
合計		13	23	39	42	54	75	246
女性	10未満	2	4	4	0	0	3	13
	10-11	1	4	9	3	7	6	30
	12-13	1	10	14	2	8	9	44
	14-15	2	2	10	13	11	10	48
	16-17	1	2	6	9	3	14	35
	18-19	1	1	7	3	12	10	34
	20-21	2	1	3	4	5	5	20
	22-23	1	0	2	4	4	3	14
	24-25	0	0	2	1	2	4	9
	26-27	0	1	0	1	5	3	10
	28-29	1	0	3	2	2	1	9
	30-31	0	0	1	1	1	4	7
	32-33	1	0	1	4	0	1	7
	34-35	0	0	1	2	1	0	4
	36-37	0	0	0	0	0	0	0
	38-39	0	1	0	0	1	0	2
	40-44	1	0	0	0	0	1	2
	45-49	1	0	2	0	2	1	6
	50-54	1	0	1	1	2	0	5
	55-59	0	0	0	1	2	0	3
60-64	0	0	0	0	0	0	0	
65-69	0	0	0	0	0	0	0	
70以上	0	1	0	3	1	0	5	
合計		16	27	66	54	69	75	307

## 尿酸値の分布

性別		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上
男性	3未満	1	0	0	0	1	2	4
	3.0-3.1	0	0	0	0	0	1	1
	3.2-3.3	0	0	0	0	0	1	1
	3.4-3.5	0	0	0	0	0	1	1
	3.6-3.7	0	0	2	0	0	2	4
	3.8-3.9	0	0	1	0	1	1	3
	4.0-4.1	1	1	1	0	1	3	7
	4.2-4.3	0	0	0	0	4	2	6
	4.4-4.5	0	1	1	2	2	2	8
	4.6-4.7	1	0	0	0	2	3	6
	4.8-4.9	0	2	0	0	1	0	3
	5.0-5.1	1	1	3	2	3	4	14
	5.2-5.3	2	1	4	2	5	3	17
	5.4-5.5	0	3	5	2	5	6	21
	5.6-5.7	0	2	1	8	0	4	15
	5.8-5.9	0	0	1	2	5	13	21
	6.0-6.1	2	0	4	5	1	3	15
	6.2-6.3	1	1	1	6	5	5	19
	6.4-6.5	0	2	2	4	1	4	13
	6.6-6.7	2	0	0	0	4	1	7
	6.8-6.9	1	3	2	4	5	1	16
7.0-7.1	0	0	1	0	4	4	9	
7.2-7.3	0	2	2	1	0	1	6	
7.4-7.5	0	1	2	2	0	2	7	
7.6-7.7	0	1	1	1	0	1	4	
7.8-7.9	0	1	0	0	1	0	2	
8-	1	1	5	1	3	5	16	
合計		13	23	39	42	54	75	246
女性	3未満	1	2	5	2	2	4	16
	3.0-3.1	1	2	3	1	1	2	10
	3.2-3.3	0	2	7	6	3	4	22
	3.4-3.5	1	1	2	2	5	1	12
	3.6-3.7	0	3	6	2	8	3	22
	3.8-3.9	1	3	10	2	3	5	24
	4.0-4.1	1	5	6	0	9	7	28
	4.2-4.3	2	2	4	8	4	0	20
	4.4-4.5	2	0	5	5	6	3	21
	4.6-4.7	1	0	8	4	3	7	23
	4.8-4.9	1	3	1	7	3	4	19
	5.0-5.1	1	2	5	4	8	4	24
	5.2-5.3	2	0	2	2	3	4	13
	5.4-5.5	1	0	2	2	2	6	13
	5.6-5.7	0	1	0	1	1	7	10
	5.8-5.9	0	0	0	1	0	5	6
	6.0-6.1	0	0	0	1	3	4	8
	6.2-6.3	0	0	0	1	1	1	3
	6.4-6.5	0	0	0	1	3	0	4
	6.6-6.7	0	0	0	2	0	0	2
	6.8-6.9	0	0	0	0	0	1	1
7.0-7.1	0	0	0	0	0	1	1	
7.2-7.3	0	0	0	0	0	0	0	
7.4-7.5	0	1	0	0	0	2	3	
7.6-7.7	0	0	0	0	1	0	1	
7.8-7.9	0	0	0	0	0	0	0	
8-	1	0	0	0	0	0	1	
合計		16	27	66	54	69	75	307

服薬の状況

血圧を下げる薬の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	71	184
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	2	23
	40-49歳	40	2	38
	50-59歳	42	6	36
	60-69歳	54	15	39
	70歳以上	80	46	34
女性	総数	321	82	239
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	1	27
	40-49歳	68	0	68
	50-59歳	54	12	42
	60-69歳	73	23	50
	70歳以上	80	46	34

脈の乱れを治す薬の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	8	247
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	42	2	40
	60-69歳	54	2	52
	70歳以上	80	4	76
女性	総数	321	11	310
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	0	28
	40-49歳	68	0	68
	50-59歳	54	3	51
	60-69歳	73	5	68
	70歳以上	80	3	77

インスリン注射または血糖を下げる薬の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	14	241
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	42	1	41
	60-69歳	54	2	52
	70歳以上	80	11	69
女性	総数	321	15	306
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	1	27
	40-49歳	68	1	67
	50-59歳	54	2	52
	60-69歳	73	3	70
	70歳以上	80	8	72

コレステロールを下げる薬の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	15	240
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	2	38
	50-59歳	42	4	38
	60-69歳	54	1	53
	70歳以上	80	8	72
女性	総数	321	40	281
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	0	28
	40-49歳	68	0	68
	50-59歳	54	6	48
	60-69歳	73	19	54
	70歳以上	80	15	65

中性脂肪を下げる薬の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	9	246
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	42	2	40
	60-69歳	54	2	52
	70歳以上	80	5	75
女性	総数	321	8	313
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	0	28
	40-49歳	68	0	68
	50-59歳	54	1	53
	60-69歳	73	4	69
	70歳以上	80	3	77

貧血治療のための薬(鉄剤)の服用状況(人)

性別	年齢階級	総数	使用あり	使用なし
男性	総数	255	1	254
	20-29歳	14	0	14
	30-39歳	25	0	25
	40-49歳	40	0	40
	50-59歳	42	1	41
	60-69歳	54	0	54
	70歳以上	80	0	80
女性	総数	321	10	311
	20-29歳	18	0	18
	30-39歳	28	0	28
	40-49歳	68	2	66
	50-59歳	54	1	53
	60-69歳	73	2	71
	70歳以上	80	5	75

注)妊婦除外

開眼片足立ち時間20秒以上可能な人の割合

年齢	年齢	人数	割合	標準誤差
男性	40-49歳	31	100.0%	0.0%
	50-59歳	30	100.0%	0.0%
	60-69歳	37	97.3%	2.6%
	70歳以上	55	62.8%	4.8%
	(再掲)40歳以上※1	155	88.5%	3.9%
	(再掲)40歳以上※2	155	89.6%	3.7%
	(再掲)65-74歳	35	90.3%	5.0%
	(再掲)65-74歳※2	35	90.3%	5.0%
	(再掲)75歳以上	33	44.7%	11.3%
	(再掲)75歳以上※2	33	44.7%	11.3%
女性	40-49歳	58	97.9%	2.2%
	50-59歳	46	98.6%	1.5%
	60-69歳	49	91.6%	4.0%
	70歳以上	46	63.7%	9.6%
	(再掲)40歳以上※1	202	88.9%	3.6%
	(再掲)40歳以上※2	202	88.5%	3.7%
	(再掲)65-74歳	38	85.1%	5.5%
	(再掲)65-74歳※2	38	87.3%	5.4%
	(再掲)75歳以上	32	54.4%	8.2%
	(再掲)75歳以上※2	32	56.1%	9.9%
総数	40-49歳	89	98.2%	1.8%
	50-59歳	76	99.0%	1.0%
	60-69歳	86	93.1%	3.1%
	70歳以上	101	63.5%	7.0%
	(再掲)40歳以上※1	357	88.8%	2.9%
	(再掲)40歳以上※2	357	89.0%	2.6%
	(再掲)65-74歳	73	86.6%	4.0%
	(再掲)65-74歳※2	73	88.8%	3.6%
	(再掲)75歳以上	65	51.9%	6.9%
	(再掲)75歳以上※2	65	50.7%	7.7%

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

運動習慣がある人の割合

性別	年齢区分	人数	平均	標準誤差
男性	20-29歳	14	23.6%	13.6%
	30-39歳	25	56.3%	16.0%
	40-49歳	40	7.5%	3.0%
	50-59歳	42	35.1%	8.6%
	60-69歳	54	45.0%	11.1%
	70歳以上	80	47.4%	10.5%
	(再掲)65-74歳	56	50.2%	8.2%
	(再掲)75以上	46	43.8%	11.9%
	(再掲)40-74歳※1	170	33.3%	4.8%
	(再掲)40-74歳※2	170	32.8%	4.8%
	(再掲)20以上※1	255	37.7%	5.1%
	(再掲)20歳以上※2	255	37.0%	5.3%
女性	20-29歳	18	8.0%	6.0%
	30-39歳	28	32.4%	13.9%
	40-49歳	68	20.7%	5.8%
	50-59歳	54	26.4%	8.9%
	60-69歳	73	35.9%	9.2%
	70歳以上	80	37.7%	10.0%
	(再掲)65-74歳	67	51.9%	12.8%
	(再掲)75以上	53	24.6%	10.3%
	(再掲)40-74歳※1	222	33.7%	5.4%
	(再掲)40-74歳※2	222	31.3%	4.8%
	(再掲)20以上※1	321	29.4%	5.3%
	(再掲)20歳以上※2	321	27.3%	5.0%
総数	20-29歳	32	16.0%	8.7%
	30-39歳	53	45.3%	11.7%
	40-49歳	108	14.1%	3.6%
	50-59歳	96	30.7%	7.4%
	60-69歳	127	40.4%	6.1%
	70歳以上	160	41.6%	9.5%
	(再掲)65-74歳	123	51.2%	8.4%
	(再掲)75以上	99	33.5%	8.8%
	(再掲)40-74歳※1	392	33.5%	3.8%
	(再掲)40-74歳※2	392	32.1%	3.7%
	(再掲)20以上※1	576	33.4%	3.9%
	(再掲)20歳以上※2	576	32.2%	3.7%

注)

・運動習慣があるとは、現在、継続的に「実施頻度週2日以上」「持続時間30分以上」「継続期間1年以上」の3項目全てに該当する場合。

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

## 歩行数

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	15-19歳	20	6095	3463	557	1247	2433	2786	3151	4275	8606	11747	12941	12998
	20-29歳	29	7451	3220	812	1850	2215	3338	4935	6676	9594	11092	16343	17287
	30-39歳	57	10091	6619	1160	1638	2935	3512	5716	8001	12304	20975	24772	26932
	40-49歳	79	7674	4816	650	203	2249	2849	4636	6899	9231	12241	18066	25285
	50-59歳	79	7601	3853	594	1242	2026	3133	5168	6813	9665	12743	15847	19838
	60-69歳	89	7689	3839	482	1061	1997	3294	5290	7206	10136	11914	15807	19600
	70歳以上	99	5260	2848	305	150	698	2025	3119	4734	7021	8733	9911	17000
	(再掲)40-74歳※1	285	7487	3990	290	1035	2200	2920	5026	6924	9244	12089	15920	22266
	(再掲)40-74歳※2	285	7502	4001	294	1046	2202	2912	5027	6924	9251	12226	15915	22222
	(再掲)20歳以上※1	432	7527	4583	290	727	2013	2725	4518	6790	9264	12482	17431	25564
	(再掲)20歳以上※2	432	7636	4610	322	735	2029	2874	4657	6816	9510	12519	17423	25765
	(再掲)20-64歳※1	302	8282	4884	398	1472	2317	3287	5164	7180	10057	14330	19011	26161
	(再掲)20-64歳※2	302	8249	4834	406	1574	2326	3319	5159	7149	10045	14110	18744	26153
	(再掲)65-79歳※1	96	6112	2822	345	150	2265	2964	4139	6054	7582	9517	11059	17000
	(再掲)65-79歳)※2	96	6093	2786	337	150	2295	2977	4154	6060	7555	9432	11025	17000
女性	15-19歳	23	8884	4259	1047	859	2109	4608	5254	7162	12252	14611	18431	18701
	20-29歳	38	5617	1877	294	1542	2121	3358	4502	5240	6672	8339	8692	11323
	30-39歳	52	8023	3671	621	1309	2572	3604	5927	7218	10845	12421	15001	18108
	40-49歳	96	7282	3277	465	2449	3557	4069	4873	6478	9116	11976	15144	19384
	50-59歳	90	6994	3031	400	1013	3023	3191	4686	6652	8702	10972	12226	17251
	60-69歳	90	6419	3246	399	1480	1536	2423	4053	5985	8253	9759	12320	18000
	70歳以上	109	4377	3537	412	111	334	732	1672	3679	5646	10245	12581	15313
	(再掲)40-74歳※1	307	6841	3426	221	951	1994	3084	4484	6238	8815	11333	13517	17518
	(再掲)40-74歳※2	307	6879	3334	208	980	2212	3236	4596	6421	8793	11253	13388	17479
	(再掲)20歳以上※1	475	6391	3436	157	283	1475	2243	4107	5865	8269	11232	12717	17578
	(再掲)20歳以上※2	475	6458	3389	143	376	1502	2355	4265	5957	8278	11265	12542	17956
	(再掲)20-64歳※1	322	6966	3166	164	1542	3055	3496	4795	6413	8461	11437	12909	17593
	(再掲)20-64歳※2	322	6926	3137	165	1470	2953	3527	4797	6336	8381	11323	12588	17579
	(再掲)65-79歳※1	117	5818	3720	466	302	799	1483	3150	4856	7823	10649	13166	17766
	(再掲)65-79歳)※2	117	5864	3736	474	327	827	1484	3151	4870	8018	10649	13221	17786

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

・20-64歳、65-79歳は県健康増進計画の指標を設定している階級。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。