

20 死 因 順 位 ， 年 次 別（長 野 県） 昭和22年～平成28年

年 次	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率
昭 和 22 年	脳血管疾患	3,216	156.1	肺炎及び気管支炎	3,136	152.2	全結核	2,980	144.7	胃腸炎	2,511	121.9	老衰	2,080	101.0
23	〃	3,080	148.1	全結核	3,043	146.8	胃腸炎	2,010	96.6	肺炎及び気管支炎	1,827	87.8	〃	1,700	81.7
24	〃	3,218	151.0	〃	2,609	122.4	肺炎及び気管支炎	1,890	88.7	老衰	1,700	79.8	心疾患	1,603	75.2
25	〃	3,647	177.0	〃	2,183	105.9	悪性新生物	1,864	90.4	心疾患	1,628	79.0	肺炎及び気管支炎	1,645	79.8
26	〃	3,445	168.1	悪性新生物	1,895	92.5	心疾患	1,715	83.7	全結核	1,523	74.3	〃	1,484	72.4
27	〃	3,650	179.3	〃	1,897	93.2	〃	1,522	74.8	〃	1,343	66.0	全結核	1,205	59.2
28	〃	3,968	195.8	〃	1,924	94.9	〃	1,806	89.2	〃	1,544	76.2	肺炎及び気管支炎	1,324	65.3
29	〃	3,765	186.0	〃	2,092	103.4	〃	1,498	74.0	〃	1,320	65.2	〃	965	47.7
30	〃	3,872	191.6	〃	2,133	105.5	〃	1,718	85.0	〃	1,311	64.9	〃	995	49.2
31	〃	4,163	206.7	〃	2,134	106.0	〃	1,707	84.8	〃	1,568	77.9	〃	872	43.3
32	〃	4,319	215.9	〃	2,127	106.3	〃	1,975	98.7	〃	1,617	80.8	〃	1,156	57.8
33	〃	4,273	214.0	〃	2,235	111.9	〃	1,805	90.4	〃	1,128	56.5	〃	918	46.0
34	〃	4,553	228.7	〃	2,269	114.0	〃	1,749	87.9	〃	1,261	63.3	〃	930	46.7
35	〃	4,841	244.3	〃	2,323	117.2	〃	1,910	96.4	〃	1,267	63.9	〃	1,010	51.0
36	〃	4,785	242.2	〃	2,424	122.7	〃	1,943	98.3	〃	1,128	57.1	〃	871	44.1
37	〃	5,143	261.2	〃	2,298	116.7	〃	2,074	105.3	〃	1,089	55.3	〃	994	50.5
38	〃	5,047	256.7	〃	2,350	119.5	〃	1,866	94.9	〃	1,005	51.1	〃	755	38.4
39	〃	5,378	273.3	〃	2,511	127.6	〃	1,964	99.8	〃	1,061	53.9	〃	780	39.6
40	〃	5,595	285.7	〃	2,499	127.6	〃	2,181	111.4	〃	1,083	55.3	〃	841	43.0
41	〃	5,298	271.4	〃	2,510	128.6	〃	1,847	94.6	〃	880	45.1	不慮の事故	794	40.7
42	〃	5,321	272.5	〃	2,451	125.5	〃	2,009	102.9	〃	870	44.5	〃	798	40.9
43	〃	5,290	270.2	〃	2,679	136.8	〃	2,024	103.4	〃	804	41.1	〃	702	35.9
44	〃	5,346	272.6	〃	2,599	132.5	〃	2,083	106.2	不慮の事故	761	38.8	老衰	742	37.8
45	〃	5,374	275.3	〃	2,685	137.5	〃	2,232	114.3	老衰	783	40.1	肺炎及び気管支炎	782	40.1
46	〃	5,253	268.4	〃	2,602	133.0	〃	2,118	108.2	不慮の事故	764	39.0	老衰	714	36.5
47	〃	5,136	260.4	〃	2,802	142.1	〃	2,034	103.1	〃	750	38.0	〃	669	33.9
48	〃	5,284	266.2	〃	2,932	147.7	〃	2,253	113.5	〃	792	39.9	肺炎及び気管支炎	718	36.2
49	〃	5,343	267.2	〃	3,023	151.2	〃	2,278	113.9	肺炎及び気管支炎	734	36.7	老衰	709	35.5
50	〃	4,929	244.9	〃	2,970	147.6	〃	2,291	113.8	〃	826	41.0	〃	723	31.0
51	〃	4,942	243.7	〃	2,919	143.9	〃	2,319	114.3	〃	726	35.8	〃	633	31.2
52	〃	4,794	234.8	〃	3,183	155.9	〃	2,236	109.5	〃	692	33.9	〃	623	30.5
53	〃	4,695	228.5	〃	3,186	155.0	〃	2,250	109.5	〃	725	35.3	〃	625	30.4
54	〃	4,382	212.0	〃	3,358	162.5	〃	2,359	114.1	精神病の記載のない老衰	646	31.3	肺炎及び気管支炎	577	27.9
55	〃	4,454	214.3	〃	3,407	163.9	〃	2,594	124.8	肺炎及び気管支炎	755	36.3	精神病の記載のない老衰	716	34.4
56	〃	4,196	201.1	〃	3,418	163.8	〃	2,657	127.3	〃	743	35.6	〃	630	30.2
57	〃	4,034	192.6	〃	3,461	165.2	〃	2,507	119.7	〃	746	35.6	〃	624	29.8
58	〃	3,816	181.5	〃	3,550	168.7	〃	2,686	127.7	〃	833	39.6	〃	659	31.3
59	悪性新生物	3,845	181.7	脳血管疾患	3,738	176.5	〃	2,910	137.5	〃	904	42.7	〃	721	34.1
60	〃	3,762	176.5	〃	3,629	170.3	〃	3,076	144.3	〃	1,019	47.8	〃	670	31.4
61	〃	3,677	172.0	〃	3,456	161.6	〃	2,972	139.0	〃	1,042	48.7	〃	702	32.8
62	〃	3,937	183.6	〃	3,401	158.6	〃	2,882	134.4	〃	1,053	49.1	〃	668	31.2
63	〃	3,926	182.9	〃	3,591	167.3	〃	3,271	152.4	〃	1,227	57.2	〃	751	35.0
平 成 元 年	〃	4,108	191.0	〃	3,274	152.2	〃	3,102	144.2	〃	1,253	58.3	〃	682	31.7
2	〃	4,011	186.7	〃	3,413	158.9	〃	3,232	150.4	〃	1,434	66.8	〃	703	32.7
3	〃	4,130	192.0	心疾患	3,413	158.7	脳血管疾患	3,175	147.6	〃	1,504	69.9	〃	706	32.8
4	〃	4,355	202.0	〃	3,601	167.0	〃	3,195	148.2	〃	1,607	74.5	〃	730	33.9
5	〃	4,259	198.5	〃	3,719	172.1	〃	3,185	147.4	〃	1,559	72.1	〃	706	32.7
6	〃	4,497	207.4	〃	3,337	153.9	〃	3,269	150.8	〃	1,812	83.6	〃	811	37.4
7	〃	4,731	217.7	脳血管疾患	3,781	174.0	心疾患	2,768	127.4	肺炎	1,302	59.9	不慮の事故	745	34.3
8	〃	4,898	224.9	〃	3,901	179.1	〃	2,781	127.7	〃	1,241	57.0	老衰	772	35.4
9	〃	5,012	229.7	〃	3,776	173.1	〃	2,784	127.6	〃	1,358	62.2	不慮の事故	819	37.5
10	〃	5,081	232.5	〃	3,596	164.6	〃	2,666	122.0	〃	1,423	65.1	〃	822	37.6
11	〃	5,172	236.5	〃	3,614	165.2	〃	2,845	130.1	〃	1,595	72.9	老衰	866	39.6
12	〃	5,305	243.1	〃	3,615	165.7	〃	2,877	131.9	〃	1,520	69.7	不慮の事故	796	36.5
13	〃	5,317	243.2	〃	3,568	163.2	〃	2,908	133.0	〃	1,457	66.7	〃	834	38.2
14	〃	5,495	251.8	〃	3,470	159.0	〃	2,995	137.3	〃	1,562	71.6	〃	847	38.8
15	〃	5,438	249.6	〃	3,402	156.1	〃	3,078	141.3	〃	1,625	74.6	〃	851	39.1
16	〃	5,786	266.0	〃	3,367	154.8	〃	3,214	147.8	〃	1,729	79.5	老衰	798	36.7
17	〃	5,787	267.8	〃	3,450	159.6	〃	3,275	151.5	〃	1,910	88.4	〃	922	42.7
18	〃	5,707	264.9	心疾患	3,384	157.1	脳血管疾患	3,215	149.3	〃	1,845	85.7	〃	962	44.7
19	〃	6,043	281.7	〃	3,360	156.6	〃	3,220	150.1	〃	1,915	89.3	〃	1,055	49.2
20	〃	6,136	287.4	〃	3,538	165.7	〃	3,377	158.2	〃	1,960	91.8	〃	1,189	55.7
21	〃	5,912	278.1	〃	3,456	162.6	〃	3,077	144.7	〃	1,918	90.2	〃	1,213	57.1
22	〃	6,071	286.0	〃	3,453	162.7	〃	3,231	152.2	〃	1,971	92.9	〃	1,373	64.7
23	〃	6,142	290.4	〃	3,725	176.1	〃	3,049	144.2	〃	2,125	100.5	〃	1,574	74.4
24	〃	6,270	297.7	〃	3,717	176.5	〃	3,191	151.5	〃	2,076	98.6	〃	1,611	76.5
25	〃	6,150	293.6	〃	3,780	180.4	〃	3,057	145.9	〃	2,034	97.1	〃	1,740	83.1
26	〃	6,285	301.7	〃	3,777	181.3	〃	2,908	139.6	老衰	2,020	97.0	肺炎	1,931	92.7
27	〃	6,219	300.1	〃	3,776	182.2	〃	2,705	130.5	〃	2,254	108.8	〃	1,835	88.6
28	〃	6,351	308.0	〃	3,747	181.9	〃	2,595	126.0	〃	2,366	114.9	〃	1,797	87.2

注）死亡率は人口10万対であり、率算出に用いた人口は、昭和41年までは総人口（長野県企画振興部情報政策課統計室）、昭和42年以降は日本人人口（総務省統計局）である。
資料：健康福祉政策課「人口動態統計」