

死亡野鳥等調査の実施区分

県実施要領

| 区分 | 目 | 科 | 種 | 通常時 | 国内発生時 (単発時) | 国内複数箇所 発生時 | 発生地周辺10km | | | | |
|------------------|-------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | | 対応レベル 1 | 近隣国発生時 対応レベル2 | 近隣国発生時 対応レベル3 | 野鳥重点監視区域 | | | | |
| 検査優先種 1 (18種) | カモ | カモ | シジュウカラガン | 同一場所で 3羽以上死亡 | | | 同一場所で 1羽以上死亡 | | | | |
| | | | マガン | | | | | | | | |
| | | | ヒシクイ | | | | | | | | |
| | | | コブハクチョウ | | | | | | | | |
| | | | オオハクチョウ | | | | | | | | |
| | | | コハクチョウ | | | | | | | | |
| | | | コクチョウ | | | | | | | | |
| | | | オシドリ | | | | | | | | |
| | | | ヒドリガモ | | | | | | | | |
| | | | キンクロハジロ | | | | | | | | |
| | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ カンムリカイツブリ | 同一場所で 1羽以上死亡 | | | | | | | |
| ツル | ツル | ナベツル | | | | | | | | | |
| | | マナツル | | | | | | | | | |
| チドリ | カモメ | ユリカモメ | | | | | | | | | |
| タカ | タカ | オオタカ | | | | | | | | | |
| | | ノスリ | | | | | | | | | |
| ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | | | | | | | | | |
| 検査優先種 2 (9種) | カモ | カモ | マガモ | | | | | 同一場所で 5羽以上死亡 | | | 同一場所で 1羽以上死亡 |
| | | | オナガガモ | | | | | | | | |
| | | | ホシハジロ | | | | | | | | |
| | | | スズガモ | | | | | | | | |
| | | | トモエガモ | | | | | | | | |
| | タカ | タカ | オジロワシ | 同一場所で 3羽以上死亡 | | | | | | | |
| オオワシ | | | | | | | | | | | |
| クマタカ | | | | | | | | | | | |
| フクロウ | フクロウ | フクロウ | 同一場所で 5羽以上死亡 | | | | | | | | |
| 検査優先種 3 | カモ | カモ | 全種(カルガモ等)※ | 同一場所で 10羽以上死亡 | | | 同一場所で 3羽以上死亡 | | | | |
| | カイツブリ | カイツブリ | 全種(ハシカイツブリ等)※ | | | | | | | | |
| | カツオドリ | ウ | カワウ | | | | | | | | |
| | ツル | サギ | アオサギ | | | | | | | | |
| | | ツル | 全種(タンチョウ等)※ | | | | | | | | |
| | クイナ | オオバン | | | | | | | | | |
| | チドリ | カモメ | 全種(ウミネコ等)※ | | | | | | | | |
| | タカ | ミサゴ | ミサゴ | | | | | | | | |
| | | タカ | 全種(トビ等)※ | | | | | | | | |
| フクロウ | フクロウ | 全種(コミミズク等)※ | | | | | | | | | |
| ハヤブサ | ハヤブサ | 全種(オウゴンホウ等)※ | | | | | | | | | |
| その他の種 | | | | 同一場所で 5羽以上死亡 | | | 同一場所で 3羽以上死亡 | | | | |

※ 検査優先種3の全種は、検査優先種1・2以外の全種
 ※ 同一場所で3日間合計羽数が表の数以上の死亡(衰弱)個体が発見(死因が明確な個体を除く)された場合検査を実施
 ※ 通常監視時(対応レベル1)における猛禽類以外の種については本県独自の調査羽数を設定
 ※ 重度の神経症状が見られる等、感染が強く疑われる場合には1羽でも検査を実施(監視重点監視区域で感染が疑われる場合も同様)