

家畜衛生広報



ながの

長野家畜保健衛生所
北信家畜畜産物衛生指導協会
〒380-0944 長野市安茂里米村1993
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665
E-mail: nagakachiku@pref.nagano.lg.jp

早めの暑熱対策を ~今年も暑いぜ~

今年も暑い夏が予想されています。

今から暑熱対策に先手を打ち、暑熱被害を最小に抑えましょう！



暑熱対策の基本



畜舎外から熱を入れない

- ・樹木や緑のカーテン、よしずを設置し、日光をシャ断する
- ・屋根への断熱材設置や石灰乳塗布、散水で屋根からの輻射熱を軽減する

畜舎内の温度を下げる

- ・換気扇や扇風機、ダクトを使い、家畜にしっかり風を当てる
- ・散水や細霧噴霧を行い、畜舎や畜体を冷やす

飲み水の工夫

- ・新鮮な冷たい水を十分に給与する
- ・給水器を清掃・点検し、きれいな水がたっぷり飲めるようにする

水が大切

飼料給与の工夫

- ・夜間などの涼しい時間帯に飼料を給与する
- ・嗜好性・栄養濃度の高い良質な飼料の給与で食欲と栄養を確保する

ちょっと一手間 よい涼しく！

- ✚ 防虫ネットなどは、週に1回程度ホコリを払いましょう。空気がとても通りやすくなります。外からの新鮮な空気は、涼しさ倍増です。
- ✚ 細霧噴霧は湿度 70%以下の時に効果的です。湿度 70%以上の時は直接家畜の体を冷やしましょう。
- ✚ 畜舎内の温度を測ってみましょう。家畜のいるところは意外と暑いかも。

消毒は伝染病予防の第一歩

まずは踏み込み消毒槽を畜舎に置きましょう



しあわせ
信州

信州ACE(エース)プロジェクト

Action [体を動かす]

Check [健診を受ける]

Eat [健康に食べる]

世界で一番(ACE)の健康長寿を目指しましょう

乳用牛の対策

【暑熱の影響】 乳用牛は最新の研究によると21℃を超えるとストレスを感じ、飼料摂取量の減少、乳量の低下、繁殖性の低下、周産期疾病の増加を招きます。

- 【対策】
- ・濃厚飼料 1 回あたりの給与量を減らし多回給与する。
 - ・嗜好性、消化性の良い良質な飼料を給与する
 - ・ミネラル給与量を1～2割増給する。
 - ・後軀から乳房にかけて毛刈り（体感温度が2-3℃低下）。
 - ・サイレージ等の変敗に注意。
 - ・TMRでは、エサの掃き寄せ回数を多くする。

肉用牛の対策

【暑熱の影響】 肉用牛では、採食量の低下による発育停滞、繁殖性の低下、飲水量増加による子牛の下痢、ビタミンA消耗による肥育牛の事故増加が懸念されます。

- 【対策】
- ・嗜好性の良い良質な粗飼料を切断して給与する。
 - ・ミネラル類、ビタミンAを通常より多く給与する。
 - ・子牛の給水バケツなどの衛生管理に注意する。

韓国で口蹄疫が継続発生しています 侵入防止に引き続きご注意ください

