

## 【りんご・なし生産者の皆様】

火傷病の疑いのある症状を見つけたら速やかに通報してください

- ・火傷病：りんご・なし生産に甚大な被害を及ぼす病害（右：火傷病による被害）
- ・国内未発生だが、世界的な物量の増加等により、侵入リスクが高まっている。
- ・火傷病菌に対する有効な防除方法は確立されておらず、まん延防止対策として感染樹の伐採が必要となる。



(提供：Syngenta United States)

## 開花期



(提供：農研機構)

花全体がしおれる様子

- ✓ 花全体がしおれて、褐色又は黒色になって枯れる。
- ✓ 温暖多湿条件下では、花柄に白色～褐色、黒色の細菌泥が見られる。

## 幼果期

- ✓ 幼果表面には、りんごでは白色～褐色、なしでは白色～黒色の細菌泥が見られることが多い。
- ✓ 果実は灰緑色、水浸状となり、やがて褐色又は黒色に枯れる。
- ✓ 枯れた幼果は、ミイラ果となって樹上に残る。



(提供：Syngenta United States)

幼果の腐敗（りんご）



(提供：三井物産株)

幼果のミイラ果症状（洋ナシ）

## 【通報先】

最寄りのJA又は県農業農村支援センター