






令和8年 市田柿熟度調査結果

市田柿ブランド推進協議会

調査地点: 高森町 標高500m台 3地点の平均

年	調査日	果重 (g)	果皮色(CC指数)			硬度(ポンド)			種子数	条紋	糖度(%)	
			果頂部	赤道部	肩部	果頂部	赤道部	肩部			果汁	タンニン除
R8	9月30日	120.4	3.3	2.6	1.7	9.4	12.3	13.5	0.5	2.1	17.2	16.6
	10月7日	123.6	4.4	3.3	3.1	8.8	10.3	11.8	0.1	2.6	18.7	14.9
	10月14日	129.0	4.7	4.2	3.4	6.6	8.0	9.2	0.1	3.2	19.3	16.2
	10月21日	136.6	5.0	4.3	3.7	6.7	7.7	8.6	0.2	3.1	21.2	17.7
	10月28日	138.8	5.9	5.5	4.9	5.4	6.0	7.7	0.1	4.0	20.9	18.7
	11月4日											
R7	10月1日	98	2.1	1.7	1.3	11.5	13.0	13.8	0.2	0.5	18.8	12.6
	10月8日	109	3.5	2.8	2.0	10.0	11.8	12.5	0.2	2.1	18.6	14.9
	10月15日	117	4.5	4.0	3.2	8.1	9.5	10.2	0.1	2.3	20.6	16.7
	10月22日	121	4.4	3.7	3.1	7.0	8.3	9.6	0.3	3.2	20.2	17.6
	10月29日	121	5.1	4.5	3.6	5.9	7.1	8.4	0.2	3.3	21.1	18.8
	11月5日	127	5.5	4.9	4.2	5.3	6.3	7.3	0.1	3.9	20.6	18.9
R6	9月25日	96	1.4	1.2	1.0	13.7	14.3	15.9	0.5	0.6	18.3	12.8
	10月2日	107	2.1	1.8	1.4	12.7	14.7	14.6	0.1	0.7	18.0	13.2
	10月9日	112	3.3	2.5	1.7	9.3	10.1	11.6	0.0	1.7	18.1	14.5
	10月16日	127	3.8	3.1	2.6	8.0	9.1	10.3	0.0	2.5	18.6	14.9
	10月23日	128	4.3	3.7	3.0	7.0	8.5	9.3	0.2	3.4	20.3	17.6



- * 調査果実: 10個(樹冠外周部の目通りの高さから採取)
- * 果皮色: 農水省カラーチャート(指数0~10)、着色の平均的的部位を測定
- * 果肉硬度: R7; ペネトロメーター5/16インチ(小)使用
~R6; マグネステーラー式硬度計5/16インチ(小)使用
- * 条紋: 0(無) 2(少) 4(中) 6(多)

市田柿収穫の目安

タンニン除去後の糖度: 18%以上(通常の果汁で20%以上)
果肉硬度: 5ポンド(5/16インチ頭針) 弾力が出てきたころ
果皮色: 果頂部赤み強く、ヘタ部橙黄色(指数4以上)
ヘタ: 青味が抜け黄色になりそり返る

コメント: 10月28日現在

- 収穫始まっている
- ・硬度低く、条紋多い
 - ・糖度高い
 - ・片部の着色は早い